

中华人民共和国农业行业标准

NY 5138—2002

无公害食品 蜜蜂饲养兽药使用准则

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：中国兽医药品监察所。

本标准主要起草人：冯忠武、万仁玲、高光、许正鼎、段文龙。

无公害食品 蜜蜂饲养兽药使用准则

1 范围

本标准规定了在生产无公害食品的蜜蜂饲养过程中允许使用的兽药种类及其使用准则。
本标准适用于无公害食品的蜜蜂饲养过程的生产、管理和认证。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

NY/T 5139 无公害食品 蜜蜂饲养管理准则

中华人民共和国兽药典（2000年版）

中华人民共和国兽药规范（1992）

兽药管理条例

进口兽药质量标准（1999）

食品动物禁用的兽药及其他化合物清单（中华人民共和国农业部公告第193号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

蜜蜂 honeybee

能泌蜡筑巢，供人类饲养，生产蜂蜜等蜜蜂产品的经济昆虫。

3.2

兽药 veterinary drug

用于预防、治疗和诊断畜禽等动物的疾病，有目的地调节其生理机能并规定作用、用途、用法、用量的物质（含饲料药物添加剂）。包括兽用生物制品、兽用药品（化学药品、中药、抗生素、生化药品、放射性药品）。

3.2.1

抗菌药 antibacterial drug

能够抑制或杀灭病原菌的药物，其中包括中药材、中成药、化学药品、抗生素及其制剂。

3.2.2

抗寄生虫药 antiparasitic drug

能够杀灭或驱除体内、体外寄生虫的药物，其中包括中药材、中成药、化学药品、抗生素及其制剂。

3.2.3

消毒药 disinfectant

用于杀灭环境中的病原微生物、防止疾病发生和传染的药物。

3.3

休药期 withdrawal period

蜜蜂从停止给药到其产品收获的间隔时间。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

4 使用准则

蜜蜂饲养者对蜜蜂的饲养应从加强管理入手,保证蜜蜂群有充足、富含营养物质的饲料,选择抗病的品种,采取各种措施以减少疾病,增强自身的抗病能力。养蜂场地应符合 NY/T 5139 的规定。蜜蜂疾病以综合防治为主,必要时用药物进行治疗和消毒,所用的药物必须符合《中华人民共和国兽药典》、《中华人民共和国兽药规范》、《进口兽药质量标准》等的相关规定,并必须来自具有《兽药生产许可证》和产品批准文号的生产企业,或者具有《进口兽药许可证》的供应商。所用药物的标签必须符合《兽药管理条例》的规定。

4.1 优先选用借日光、烘烤、灼烧、洗涤和铲除等机械的或物理的消毒方法,必要时使用消毒药物对饲养环境、蜂箱、巢脾和器具等进行消毒,但应符合 NY/T 5139 的规定。

4.2 允许使用《中华人民共和国兽药典》二部及《中华人民共和国兽药规范》二部收载的中药材、中药成方制剂,以防治蜜蜂的各种疾病。

4.3 允许使用附录 A 中的药物,应注意以下几点:

4.3.1 对蜜蜂疾病经诊断后,选择合适的一种药物,避免重复用药;同时考虑交替用药,尽可能降低耐药性的产生;使用时要严格遵守规定的用法与用量。

4.3.2 休药期应遵守附录 A 中的规定。

4.4 建立并保存全部用药的记录,治疗用药记录包括蜂群的编号、发病时间及症状、治疗用药物名称(商品名及有效成分)、用药方式、用药量、疗程、治疗时间等。

4.5 禁止使用未经国家畜牧兽医行政管理部门批准的兽药或已经淘汰的兽药。

4.6 严禁使用《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》中的药物及化合物。

附 录 A
(规范性附录)

无公害食品蜜蜂饲养允许使用的药物及使用规定

表 A.1 无公害食品蜜蜂饲养允许使用的药物及使用规定

名 称	作用与用途	用法与用量	休药期
双甲脒条(500 mg) (amitraz strip)	用于防治蜂螨	悬挂于蜂群空隙处,每群 1 条,点燃密闭熏烟 15min,每周 1 次,3 周为 1 个疗程	7 天
氟氯苯氰菊酯条 (flumethrin strip)	用于防治蜂螨	悬挂于蜂群内,每群 2 条,6 周为 1 个疗程	采蜜期禁用
氟胺氰菊酯条 (fluvalinate strip)	用于防治蜂螨	悬挂于蜂群内,每群 2 条,3 周为 1 个疗程	采蜜期禁用
甲酸溶液(甲酸 7mL 与乙醇 3mL) (formic acid solution)	用于治疗蜂螨,无蜂使用	熏蒸 临用前将二者混合,在 22℃ 以上气温下,密闭熏蒸 5 h~6 h,每 10 mL 在标准箱内熏蒸 7~8 张无蜂封盖子脾	
甲硝唑片 (metronidazole tablets)	用于防治蜂孢子虫病	饲喂 每升 50%糖水加本品 500 mg,隔 3 天 1 次,连用 7 次	采蜜期禁用
盐酸金刚烷胺粉(13%) (amantadine hydrochloride powder)	用于防治蜂囊状幼虫病	饲喂 每升 50%糖水加本品 2 g,每群 250 mL,3 天 1 次,连用 6 次	采蜜期停止使用
酞丁胺粉(4%) (etibamzone powder)	用于蜂麻痹病	饲喂 每升 50%糖水加本品 12 g,每群 250 mL,隔日 1 次,连用 5 次	采蜜期停止使用
盐酸土霉素可溶性粉 (oxytetracycline hydrochloride soluble powder)	用于防治细菌性疾病	饲喂 每群 200 mg(按有效成分计),与 1:1 糖浆适量混匀,隔 4 天~5 天 1 次,连用 3 次	采蜜前 6 周停止给药
制霉菌素 (nystatin)	用于防治真菌性疾病	饲喂 每升 50%糖水加本品 200 mg,隔 3 天 1 次,连用 5 次	采蜜期停止使用

中华人民共和国农业
行业标准
无公害食品 蜜蜂饲养兽药使用准则

NY 5138—2002

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷
印数 1—3 000

*

书号: 155066·2-14621 定价 8.00 元

网址 www.bzcb.com

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



NY 5138-2002