2013 全国硕士研究生入学考试

护理综合

考前冲刺全真模拟试卷

紧扣考试大纲 全真实战模拟
七套全真试题 提高备考效率

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

最新版

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

2013年全国硕士研究生入学考试(护理综合)考前冲刺全真模拟试卷/赵丽红主编.—太原：山西科学技术出版社,2012.9

ISBN 978-7-5377-4250-4

Ⅰ. ①2… Ⅱ. ①赵… Ⅲ. ①护理学—研究生—入学考试—习题集 Ⅳ. ①R47

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第195346号

2013年全国硕士研究生入学考试(护理综合)考前冲刺全真模拟试卷

主　编:赵丽红

出　版:山西出版集团·山西科学技术出版社
（太原建设南路21号　邮编:030012）
发　行:山西出版集团·山西科学技术出版社(电话:0351-4922121)
经　销:各地新华书店
印　刷:山西省建筑科学研究所印刷厂

开　本:　×　1/　印张:
字　数:　千字
版　次:2012年9月第1版
印　次:2012年9月太原第1次印刷

书　号:ISBN 978-7-5377-4250-4
定　价:　元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。

全国硕士研究生入学考试考前冲刺模拟试卷及答案Ⅰ

（护 理 综 合）

考生姓名：_____

准考证号：_____

一.单选题(180分,每题1.5分)

1. 我国首先开设护理本科专业的院校是
   A. 北京医学院
   B. 中山医学院
   C. 天津医学院
   D. 协和医科大学
   E. 大连医学院

2. 治疗性环境要求的适宜湿度是
   A. 40%～50%
   B. 45%～55%
   C. 50%～60%
   D. 55%～65%
   E. 60%～65%

3. 下列不属于自我概念成分的是
   A. 角色表现
   B. 自我特征
   C. 身体形象
   D. 自信
   E. 自尊

4. 系统论这一科学术语源自于
   A. 弗里德里希·冯·哈耶克
   B. 罗纳德·科斯
   C. 贝塔朗菲
   D. 莫里斯·阿莱斯
   E. 米尔顿·弗里德曼

5. 下列属弗洛伊德三大理论要点之一的是
   A. 意识层次理论
   B. 性蕾期理论
   C. 自我理论
   D. 潜意识理论
   E. 精神分析法

6. 肺炎伴胸痛病人适宜的体位是
   A. 俯卧位
   B. 仰卧位
   C. 健侧卧位
   D. 患侧卧位
   E. 半坐卧位

7. 关于肺炎链球菌肺炎的描述不正确的是
   A. 痰标本革兰染色可看见此菌
   B. 正常人带菌率高,发病少
   C. 多为外源性感染
   D. 致病力与荚膜有关
   E. 可注射疫苗预防其发病

8. 下列哪种药物不是目前临床上应用的主要抗凝治疗药物
   A. 普通肝素
   B. 低分子量肝素
   C. 华法林
   D. 阿司匹林
   E. 链激酶

9. 以下哪种情况最适于选用西地兰
   A. 心衰伴快速房颤
   B. 急性心衰
   C. 慢性心衰加重
   D. 快速房颤
   E. 室上速

10. 洋地黄中毒引起的快速性心律失常首选的抗心律失常药为
   A. 普罗帕酮
   B. 维拉帕米
   C. 胺碘酮
   D. 心得安

E. 苯妥英钠

11. 室性阵发性心动过速的首选药物是
A. 利多卡因
B. 苯妥英钠
C. 普罗帕酮
D. 胺碘酮
E. 维拉帕米

12. 我国现行的护理教育体系是
A. 中专、专升本、研究生
B. 中专、专科、本科
C. 专科、本科
D. 中专、专科、本科、研究生
E. 专科、本科、研究生

13. 以下关于心房颤动临床特点的描述，错误的是
A. 第一心音强弱不等
B. 心室律绝对不规则
C. 短绌脉
D. 奇脉
E. 心房内易形成血栓

14. 下面关于胃癌病人的饮食指导哪项内容不妥
A. 多食富含维生素 C 的蔬菜水果
B. 少食腌制和熏制食物
C. 不食霉变食物
D. 避免刺激性饮食及暴饮暴食
E. 避免高碳水化合物、高热量饮食

15. 以下哪项不属于门静脉高压的临床表现
A. 腹水
B. 食管下段和胃底静脉曲张
C. 脾肿大
D. 肝肿大
E. 腹壁静脉曲张

16. 在我国急性胰腺炎最常见的病因为
A. 酗酒
B. 暴饮暴食
C. 胰管结石
D. 胆道疾病
E. 外伤

17.《中华护理杂志》的前身是
A.《护士进修杂志》
B.《山西护理杂志》
C.《实用护理杂志》
D.《国际护理杂志》
E.《护理杂志》

18. 对病人首先应采取的护理措施是
A. 四肢保温
B. 吸氧
C. 静注血管加压素
D. 开通静脉通道
E. 准备三(四)腔二囊管插入

19. 尿毒症病人最早和最突出的临床表现是
A. 高血压
B. 高钠血症
C. 抽搐
D. 高钾或低钾血症
E. 厌食、恶心

20. 休克最基本的病理生理改变为
A. 有效循环血容量锐减和组织灌注不足
B. 有效循环血容量锐减和微循环障碍
C. 微循环障碍和代谢障碍
D. 组织灌注不足和细胞受损
E. 微循环障碍和组织灌注不足

需要全本请访问 www.ertongbook.com

21. 穿无菌衣和戴无菌手套后，必须保持无菌的部位是
A. 整个胸、腹、背部和双上肢
B. 整个颈、肩、胸、腹、背部
C. 腰部以上的前胸、后背和双上肢
D. 腰部以上的前胸和肩部
E. 腰部以上的前胸、侧胸和双上肢

22. 下列关于创伤后营养素代谢特点的描述正确的是
A. 糖原是饥饿状态下的主要能量来源
B. 创伤后氨的大量丢失与病人原先的营养状况无关
C. 脂肪是饥饿时主要的能量来源
D. 创伤后提供外源性脂肪可以完全抑制体内脂肪分解
E. 蛋白质是饥饿状态下的主要能量来源

23. 狂犬病病毒主要侵犯
A. 中枢神经系统
B. 肌
C. 周围神经
D. 皮肤
E. 内脏器官

24.《护士伦理国际法》中规定护士的唯一任务是帮助患者
A. 促进健康
B. 维持健康
C. 恢复健康
D. 减轻痛苦
E. 延长生命

25. 乳腺纤维瘤的发生与下列哪项因素有关
A. 雌激素水平过高
B. 雌激素水平过低
C. 黄体素分泌过多
D. 黄体素分泌过少
E. 雄性激素水平过高

26. 关于腹股沟直疝的叙述不正确的是
A. 容易嵌顿
B. 多见于老年男性，常双侧发生
C. 疝块呈半球形
D. 绝大多数为后天性
E. 疝囊从腹壁下动脉内侧腹股沟三角区突出

27. 诊断急性腹膜炎最可靠的体征是
A. 肠鸣音减弱或消失
B. 肝浊音界缩小或消失
C. 压痛、反跳痛和肌紧张
D. 腹胀
E. 移动性浊音

28. 医院白天病区较理想的噪声强度是
A. 25～35dB
B. 30～40dB
C. 35～45dB
D. 45～55dB
E. 55～65dB

29. 基本护理教育包括
A. 学校教育、毕业后继续教育
B. 专科、本科、研究生
C. 中专、专科、本科、继续教育
D. 中专、专科、本科、研究生
E. 中专、专科、本科

30. 科学的护理工作方法是
A. 整体护理
B. 护理程序

C. 功能制护理
D. 小组护理
E. 责任制护理

31. 护理学基本概念的核心是
A. 健康
B. 环境
C. 护理
D. 系统
E. 人

32. 对潜意识的正确理解是
A. 存在于前意识与意识之间
B. 指意识层次中较深的那一部分
C. 潜伏着的心理矛盾与障碍
D. 指人们深层的心理活动
E. 是人们没有意识到的深层的心理活动部分

33. 艾瑞克森理论在护理实践中运用的意义是
A. 针对病人相应发展阶段的心理社会危机给予相应的护理
B. 帮助病人改善认知,更好地适应生活
C. 协助病人发展健全的人格
D. 在护理实践中主动运用心理护理的方法
E. 完成整体护理的工作目标

34. 弗洛伊德理论在护理实践中应用的意义是
A. 评估病人不同发展阶段的心理社会危机
B. 了解健康人格形成过程中的心理需求
C. 鼓励个体自立自强和自己做决定
D. 协助病人发展健全人格
E. 有目的地影响和改变病人

35. 治疗婴幼儿流感嗜血杆菌感染,不可使用的药物是
A. 氨苄西林
B. 阿司匹林
C. 阿奇霉素
D. 2 代头孢菌素
E. 3 代头孢菌素

36. 慢性肺源性心脏病急性加重期病人应慎用
A. 镇静剂
B. 祛痰剂
C. 解痉平喘药
D. 呼吸兴奋剂
E. 抗感染药物

37. 给病人服用洋地黄类药物前应测量
A. 体温
B. 脉搏
C. 呼吸
D. 血压
E. 体重

38. 不符合肝硬化失代偿晚期的临床表现是
A. 肝肿大
B. 出血现象
C. 腹水
D. 黄疸
E. 消瘦

39. 引起快速性心律失常的最常见机制是
A. 自律性增高
B. 折返
C. 触发活动
D. 阻滞及干扰
E. 冲动形成异常

40. 诊断二尖瓣狭窄最可靠的检查方法是
A. 心电图
B. 超声心动图

C. 胸部平片
D. 核素心肌显像
E. 运动心电图

41. 导致上消化道大量出血最常见的病因是
A. 急性胃炎
B. 食管癌
C. 消化性溃疡
D. 肝硬化食管下段静脉曲张破裂
E. 胃癌

42. 某慢性肾衰竭病人入院治疗后出现抽搐，可能原因是
A. 心力衰竭
B. 低钙血症
C. 高钾血症
D. 血氨升高
E. 代谢性酸中毒

43. 以下哪项不是椎管内麻醉中恶心呕吐的主要原因
A. 麻醉平面过高致低血压引起脑缺氧
B. 迷走神经兴奋引起胃肠道蠕动增加
C. 病人对术中辅助用药较敏感
D. 局麻药误注入蛛网膜下腔
E. 手术牵拉腹腔内脏

44. 肿瘤根治性手术指
A. 肿瘤广泛切除术
B. 肿瘤局部切除术及区域淋巴结的清除术
C. 肿瘤整块切除术及区域淋巴结的清除术
D. 受累脏器整个切除及区域淋巴结的清除术
E. 肿瘤及其远处转移灶的广泛切除术及区域淋巴结的清除术

45. 腹膜炎引起的肠梗阻属于
A. 机械性绞窄性肠梗阻
B. 机械性单纯性肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻
D. 血运性肠梗阻
E. 痉挛性肠梗阻

46. 下列有关术后病人不适的原因和处理，叙述不正确的是
A. 应有效解除术后疼痛
B. 顽固性呃逆时应使用镇静剂控制
C. 如发热持续不退可能为并发症所致
D. 严重腹胀需及时处理
E. 术后尿潴留可引起泌尿系统感染

47. 口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是
A. 全身性感染
B. 发热
C. 呼吸困难、窒息
D. 吞咽困难
E. 化脓性海绵状静脉窦炎

48. 继发性腹膜炎的腹痛特点是
A. 阵发性绞痛
B. 逐渐加重的腹痛
C. 疼痛与体位无关
D. 先发热后腹痛
E. 持续性剧烈腹痛，以原发病灶部位为显著

49. 1992 年，首家开设护理学硕士研究生教育的医学院校是
A. 北京医科大学
B. 协和医科大学
C. 天津医科大学
D. 上海第二军医大学
E. 华西医科大学

50. 达到室内空气置换目的的通风时间一般为
A. 10 分钟
B. 20 分钟
C. 30 分钟
D. 45 分钟
E. 60 分钟

51. 系统论分类不包括
A. 按人类对系统是否施加影响分类
B. 按系统的运动状态分类
C. 按组成系统的内容和要素的性质分类
D. 按组成系统的要素独特结构和功能分类
E. 按系统与环境的关系分类

52. 肺炎球菌肺炎病人不可能出现的临床表现是
A. 寒战
B. 高热
C. 胸痛
D. 气急
E. 咳红棕色胶冻样痰

53. 根据弗洛伊德的性心理学说，口欲期固结会产生
A. 强迫性人格
B. 卫生习惯不良
C. 吸烟
D. 异食癖
E. 咬人

54. 下列哪项是使用经鼻气管插管持续气道正压通气的常见不良反应
A. 气道陷闭
B. 鼻出血
C. 嗜睡
D. 心率失常
E. 呼吸道感染

55. 成人结核病最常见的类型是
A. 原发型肺结核
B. 血行播散型肺结核
C. 继发型肺结核
D. 结核性胸
E. 肺外结核

56. 根本性解决风湿性心脏瓣膜病的手段是
A. 人工瓣膜置换术
B. 抗风湿治疗
C. 并发症治疗
D. 介入治疗
E. 抗凝治疗

57. 肠结核最好发于
A. 回盲部
B. 空肠
C. 升结肠
D. 乙状结肠
E. 十二指肠

58. 肝性脑病的饮食护理中最重要的是
A. 注意水电解质平衡
B. 增加糖类的供应，降低血氨
C. 供给足够的热量，减少蛋白质的分解
D. 暂停蛋白质供应，减少氨的形成
E. 每天饮水大于 2000ml 以增加排泄

59. 关于低血容量性休克，下列哪项叙述不正确
A. 病因包括失血、失液、剖伤等
B. 不一定伴有严重创伤
C. 创伤后疼痛严重者需适当给予镇痛剂
D. 治疗首先考虑输血以补充血容量
E. 治疗首先考虑静脉快速滴注平衡液

60. 急性淋巴管炎与蜂窝织炎的主要区别是
A. 肿胀疼痛
B. 局部红肿，界限清楚
C. 寒战、发热
D. 区域淋巴结肿大
E. 细菌从皮肤破损处侵入

61. 乳腺囊性增生病肿块的特点是
A. 肿块小，有时可在乳头下扪及
B. 肿块多为单发性，表面光滑，边缘清晰
C. 肿块质硬，表面不光滑，边界不清
D. 肿块呈结节状或片状，随月经周期而变化
E. 肿块质软，有波动感

62. 对甲状腺单发结节者，最应警惕甲状腺癌的年龄段为
A. 儿童
B. 年轻男性
C. 妊娠妇女
D. 40 岁以下妇女
E. 老年人

63. 急性化脓性腹膜炎非手术治疗措施不妥的是
A. 半卧位
B. 给予高热量、易消化的流质营养支持
C. 使用抗生素
D. 镇静药的使用
E. 止痛

64. 目前地高辛用于治疗心力衰竭最常用的给药方法是
A. 维持量法
B. 大剂量冲击疗法
C. 隔日疗法
D. 顿服法
E. 小剂量疗法

65. 引起肺结核最主要的传播途径是
A. 肺结核病人使用过的注射器
B. 带菌的飞沫通过呼吸道侵入
C. 经泌尿道侵入人体
D. 与肺结核病人同时进餐
E. 饮用消毒不彻底的牛奶

66. 皮亚杰认知发展学说前运算期指
A. 0～7 岁
B. 1～7 岁
C. 2～7 岁
D. 3～7 岁
E. 4～7 岁

67. 关于系统的整体性最佳的描述是
A. 系统整体功能等于系统各要素功能的总和
B. 系统整体功能大于系统各要素功能的总和
C. 系统整体功能优于各要素功能的总和
D. 系统整体功能是系统各要素功能的总和
E. 系统整体功能相当于各要素功能的总和

68. 保证病人有舒适的空间，同时也方便操作和护理，病床之间的距离不得少于
A. 0.5 米
B. 0.7 米
C. 1.0 米
D. 1.2 米
E. 1.5 米

69. 关于手术前后病人营养补充途径的选择不正确的是
A. 消化道功能正常者，以口服为主
B. 昏迷或不能进食的病人可用管饲
C. 结肠手术前准备病人可用要素饮食

D. 对口服或管饲有困难的营养不良的病人可采用 PN
E. 对手术后病人应提倡早期给予肠外营养支持

70. 下列术前准备内容中错误的是
A. 糖尿病病人控制血糖至正常范围
B. 纠正水电解质紊乱
C. 肝功能损害者,加强护肝治疗
D. 血压过高的病人术前应选用合适的降压药物
E. 纠正贫血和低蛋白血症

71. 临床上最常见的心律失常是
A. 心房颤动
B. 病窦综合征
C. 期前收缩
D. 房室传导阻滞
E. 室上性心动过速

72. 皮亚杰认知发展阶段学说在护理工作中被广泛应用于
A. 培养儿童的认知能力,正确对待疾病
B. 启发儿童摆脱自我为中心,配合治疗
C. 帮助儿童认识周围世界,熟悉病区环境
D. 避免抽象难懂的词句,增强与儿童的沟通
E. 提高儿童的逻辑思维能力,理解治疗意图

73. 护理的核心是
A. 照顾
B. 关怀
C. 看护
D. 爱心
E. 仁术

74. 洋地黄中毒最重要的不良反应是
A. 恶心、呕吐
B. 视物模糊、黄视
C. 心律失常
D. 血药浓度增高
E. 心力衰竭

75. 肝肾综合征的临床表现不包括
A. 少尿或无尿
B. 氮质血症
C. 低尿钠
D. 大量蛋白尿
E. 低钠血症

76. 有关溃疡型肠结核的描述,哪项不正确
A. 可有慢性穿孔
B. 结核中毒症状较明显
C. 以腹泻为主要表现
D. 粪便糊状,不含黏液或脓血
E. 常可扪及右下腹包块

77. 肾移植术后 24 小时内的正确卧位是
A. 去枕平卧,头偏向一侧
B. 半坐卧位,移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 10° ～15°
C. 侧卧位,移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 15° ～25°
D. 头低脚高位,移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 10° ～15°
E. 平卧位,移植肾侧下肢髋、膝关节屈曲 15° ～25°

78. 肺功能障碍病人的术前准备中不正确的一项是
A. 停止吸烟两周
B. 痰液黏稠者,给予雾化吸入
C. 急性呼吸系统感染时,若为择期手术应

需要全本请访问 www.ertongbook.com

推迟 1～2 周
D. 若为急症手术，宜选择吸入麻醉
E. 开胸手术者术前应作血气分析和肺功能检查

79. 护理学的基本概念包括
A. 预防、系统、环境和护理
B. 健康、系统、环境和护理
C. 人、健康、环境和护理
D. 病人、健康、环境和护理
E. 人、健康、环境、系统和护理

80. 系统的相关性表现为
A. 系统中作用弱的要素发生的功能或作用变化对系统整体无相关
B. 系统中作用强的要素发生的功能或作用变化对系统整体正相关
C. 系统中任何要素发生功能或作用的变化均引起其他要素乃至整体的相应变化
D. 系统中任何要素的功能与作用发生变化整体都可能产生相关反应
E. 系统中任何要素发生的功能或作用的变化都会引起其他要素的觉察与反应

81. 马斯洛需要层次论认为个体首要满足的需要是
A. 安全需要
B. 爱与归属的需要
C. 生理需要
D. 自我实现的需要
E. 自尊的需要

82. 下列哪项不符合 ARDS 的病理生理
A. 肺间质水肿
B. 肺泡萎陷
C. 肺内分流增加
D. 肺毛细血管通透性增加
E. 肺顺应性增加

83. 心绞痛发作时最重要的缓解方法是
A. 立即到医院就诊
B. 立即含服硝酸甘油
C. 减少饮食摄入量
D. 吸氧
E. 避免情绪激动

84. 经治疗可得到有效逆转的是
A. 超急性排斥反应
B. 急性排斥反应
C. 加速血管排斥反应
D. 慢性排斥反应
E. 亚息性排斥反应

85. 在下列致癌因素中，最重要的是
A. 遗传因素
B. 物理因素
C. 化学因素
D. 生物因素
E. 内分泌因素

86. 关于股疝叙述不正确的是
A. 多见于中年以上的妇女
B. 易发生嵌顿和绞窄
C. 透光试验不透光
D. 易发生嵌顿，不宜紧急手术
E. 腹腔内脏经股环、股管，从卵圆窝突出

87. Dunn(邓恩)于 1961 年提出
A. 适应模式
B. 护理程序
C. 整体护理
D. 最佳健康模式

E. 人际关系模式

88. 社会环境中危害健康的因素不包括
A. 文化教育落后
B. 医院设施配置不全
C. 医疗保障服务体系不完善
D. 人际关系紧张
E. 缺乏科学管理

89. 艾瑞克森理论与弗洛伊德理论的潜伏期相对应的部分被称为
A. 学龄前期
B. 学龄期
C. 青春期
D. 青年期
B. 幼儿期

90. 科赫(Koch)现象最主要的机制是
A. 人体首次感染结核菌后的免疫反应
B. 身体组织对结核菌及其代谢产物所产生的敏感反应
C. 机体对结核菌已经具有免疫力的结果
D. 人体对结核菌的自然免疫反应
E. 说明机体对结核菌无免疫力

91. 肝硬化病人全血细胞减少最主要的原因是
A. 慢性失血
B. 骨髓造血功能障碍
C. 营养障碍
D. 脾功能亢进
E. 慢性溶血

92. 下列有关肥皂刷手法步骤的描述,正确的一项是
A. 范围应从手指尖到肘上 5cm
B. 冲水时应将手指及肘均朝下
C. 浸泡 75%乙醇范围应到肘上 3cm
D. 浸泡在乙醇桶内的时间为 5 分钟
E. 浸泡乙醇后应擦干手臂

93. 毒蛇咬伤后为减慢毒素吸收应
A. 立即取坐位或卧位
B. 立即甩动肢体
C. 立即跑步到医院
D. 原地走动
E. 患肢抬高

94. 下列有关营养支持的叙述正确的是
A. 营养支持仅提供能量
B. 营养支持仅提供蛋白质
C. 营养支持仅提供能量和蛋白质
D. 营养支持仅涉及营养素的代谢调理、药理和免疫作用
E. 营养支持不仅满足和提供病人能量及蛋白质的需要,还涉及代谢支持、营养素的代谢调理、药理和免疫作用

95. 以下哪项不是循环系统疾病病人的常用检查
A. 心电图
B. 超声心动图
C. 动态心电图
D. 肺功能检查
E. X 线检查

96. 结核菌素试验结果的判断方法正确的是
A. 注射后 24h 测量皮肤局部红晕直径
B. 注射后 24h 测量皮肤局部硬块直径
C. 注射后 48h 测量皮肤局部红晕直径
D. 注射后 72h 测量皮肤局部红晕直径
E. 注射后 72h 测量皮肤局部硬块直径

97. 以下哪种心律失常病人听诊心律绝对规则
A. 室上性阵发性心动过速
B. 心房颤动
C. 心房扑动
D. 期前收缩
E. 二度Ⅰ型房室传导阻滞

98. 动脉粥样硬化最重要的危险因素是
A. 高血压
B. 血脂代谢异常
C. 年龄
D. 性别
E. 肥胖

99. 目前胃癌的主要治疗方法是
A. 手术治疗
B. 化学治疗
C. 支持治疗
D. 免疫治疗
E. 中医中药治疗

100. 腰麻后头痛的主要原因是
A. 脑脊液外漏致颅内压降低和颅内血管扩张
B. 脑脊液外漏致颅内压降低和颅内血管收缩
C. 脑脊液容量增加致颅内压增高和颅内血管扩张
D. 脑脊液容量增加致颅内压增高和颅内血管收缩
E. 脑膜受刺激致脑脊液分泌增加引起颅内压增高

101. 下列哪项不属于十二指肠引流术的适应证
A. 疑有胆道炎症、结石者
B. 疑有肝胆寄生虫病者
C. 疑有胆道肿瘤者
D. 急性胆囊炎、急性胰腺炎
E. 疑有胆道梗阻者

102. 代谢性酸中毒最突出的症状是
A. 呼吸深快,呼气时有酮味
B. 唇干舌燥,眼窝凹陷
C. 呼吸浅慢,呼气时有烂苹果气味
D. 心率加快,血压下降
E. 全身乏力,眩晕

103. 喉上神经内支损伤的临床表现为
A. 饮水呛咳
B. 音调降低
C. 声音嘶哑
D. 吞咽困难
E. 呼吸困难

104. 继发性腹膜炎的病因不包括
A. 急性阑尾炎
B. 胃穿孔
C. 急性胆囊炎
D. 胃肠吻合口瘘
E. 肝硬化腹水

105. 下列肺结核病人的护理措施中不正确的是
A. 接触痰液的手要用流动水清洗
B. 督促密切接触者去医院检查治疗
C. 病人咳嗽时应用餐巾纸遮住口鼻
D. 护理未进行规则化疗病人时戴口罩
E. 对各型肺结核病人都应进行严密隔离

106. 诊断成人肺结核最可靠的依据是
A. 血沉增快
B. 胸片有渗出性阴影
C. 结核菌素试验阳性

D. 痰涂片检查结核菌阳性
E. 低热、咳嗽、乏力、盗汗

107. 为避免术中呕吐物误吸，小儿择期手术前应
A. 禁食（奶）、禁饮 8～12h
B. 禁食（奶）、禁饮 4～8h
C. 禁食（奶）8h，禁饮 2～4h
D. 禁食（奶）4～8h，禁饮 2～4h
E. 禁食（奶）4～8h，禁饮 2～3h

108. 结肠造口术后，施行瘘口关闭术时，正确的手术区皮肤消毒的顺序是
A. 由手术区外周涂向瘘口周围
B. 由手术区中心部向四周涂擦
C. 由手术病人头侧涂向足侧
D. 由手术区一侧涂向对侧
E. 无需按一定的顺序，只要消毒彻底即可

109. 弗洛伊德人格结构理论中遵循唯实原则的部分是
A. 自我
B. 超我
C. 本我
D. 潜意识
E. 性心理

110. 心力衰竭病人使用利尿剂时应特别注意
A. 心率变化
B. 血压变化
C. 电解质变化
D. 肾功能变化
E. 肝功能变化

111. 以下护理诊断问题应优先考虑
A. 急性意识障碍
B. 潜在并发症：血容量不足
C. 组织灌注无效
D. 心输出量减少
E. 体液不足

112. 以下哪项符合休克代偿期临床表现的特点
A. 血压下降，脉压显著缩小，心率加快，尿量减少
B. 血压下降，脉压轻度缩小，心率加快，尿量减少
C. 血压正常，脉压无变化，心率加快，尿量正常
D. 血压轻度降低，脉压无变化，心率加快，尿量减少
E. 血压正常或稍升高，脉压缩小，心率加快，尿量正常或减少

113. 根据弗洛伊德性心理学说，生殖期阶段的特点是
A. 生殖器成为快感来源的中心
B. 精力集中在智力活动上
C. 与异性建立亲密关系
D. 建立起自己正确的道德观
E. 能量和精力逐步转向建立成熟的异性关系

114. 下列胃镜检查术前护理错误的描述是
A. 向病人介绍检查的目的、方法
B. 检测乙型、丙型肝炎病毒标志
C. 禁食 8h
D. 有幽门梗阻的病人禁食时间要更长
E. 遵医嘱给予地西泮、山莨菪碱或阿托品

115. 尿毒症病人下列哪项临床表现主要是由肾脏内分泌功能障碍所致
A. 胃肠道症状
B. 代谢性酸中毒

C. 氮质血症
D. 神经症状
E. 贫血

116. 艾瑞克森心理社会发展学说哪一时期的正性解决指标是学会相信别人
A. 婴儿期
B. 幼儿期
C. 学龄前期
D. 学龄期
E. 青春期

117. 艾瑞克森的学说被称为
A. 人格发展学说
B. 发展心理学说
C. 社会心理结构学说
D. 心理社会发展学说
E. 人类心理发展学说

118. 疖化脓后早期的处理可以选用
A. 挤出脓头
B. 切开引流
C. 应用抗生素
D. 热敷或理疗
E. 疖顶点涂石炭酸

119. 治疗性环境主要考虑的两个因素是
A. 舒适和安全
B. 舒适和安静
C. 舒适和照顾
D. 舒适和睡眠
E. 安全和照顾

120. 治疗性环境要求的适宜温度是
A. 16～20℃
B. 18～22℃
C. 22～24℃
D. 23～25℃
E. 25～27℃

二. 多选题(60 分,每题 2 分)

1. 人际关系的选择原则包括
A. 择善原则
B. 择优原则
C. 调衡原则
D. 文明原则
E. 理解原则

2. 特发性炎症性肌病包括
A. PM
B. DM
C. 包涵体肌炎
D. 重症肌无力
E. 肌营养不良症

3. 关于传染性非典型肺炎的治疗,下面哪些是不正确的
A. 强调休息,适当补充液体及维生素
B. 对呼吸困难者立即用呼吸机辅助通气
C. 早期抗病毒治疗
D. 高热者给予冰敷、酒精擦浴等物理降温
E. 全程使用糖皮质激素,重症者大剂量使用

4. 下列关于瞳孔的表述正确的是
A. 动眼神经麻痹可致瞳孔散大
B. 针尖样瞳孔常见于脑桥出血
C. 瞳孔光反射为光线刺激瞳孔引起的缩瞳反射
D. 两眼视力高度减退时瞳孔散大

E. 发生脑疝时患侧瞳孔散大

5. 关于张力性气胸的叙述正确的是
A. 最严重的气胸类型
B. 胸腔内压进行性增高
C. 有反常呼吸
D. 有局部血肿
E. 急救须立即在缩股中线第 2 肋间用粗针穿刺减压

6. 血栓闭塞性脉管炎的发病特点是
A. 发病年龄在 40 岁以下
B. 女性少见
C. 与长期吸烟有关
D. 与患肢受寒有关
E. 常对称波及两侧下肢

7. 肝功能严重受损时,下列哪些是引起出血的原因
A. 凝血因子合成减少
B. 弥散性血管内凝血导致凝血因子减少
C. 血小板功能下降
D. 脾功能亢进引起血小板减少
E. 重型肝炎出现应激性溃疡

8. 主动－被动型护患关系模式包括下列哪些特点
A. 单向性关系
B. 心理方位为显著差位
C. 护士在护患关系中占主导地位
D. 特征为护士为服务对象做什么
E. 以生物医学模式及疾病的护理为主导思想

9. 患病后可获得持久免疫力的传染病是
A. 麻疹
B. 阿米巴痢疾
C. 细菌性痢疾
D. 艾滋病
E. 伤寒

10. 急性脓胸的临床表现有
A. 高热
B. 呼吸困难
C. 纵隔向患侧移位
D. 胸痛
E. 叩诊浊音

11. 共同参与型护患关系模式包括下列哪些特点
A. 双向性关系
B. 心理方位为等位
C. 护士在护患关系中占主导地位
D. 特征为护士帮助服务对象自我恢复
E. 以生物医学－社会心理模式及健康为主导思想

12. 脑复苏中施行低温疗法的作用是
A. 避免发热
B. 制止寒战和抽搐
C. 降低脑组织耗氧量
D. 减轻脑水肿,降低颅内压
E. 终止脑组织缺氧性病变的法杖

13. 急性重症肝炎的临床特点包括
A. 肝脏明显缩小
B. 黄疸迅速加深
C. ALT>1000U/L
D. 肝性脑病
E. 起病急

14. 采集肠阿米巴病人粪便标本时应注意
A. 取新鲜脓血部分
B. 采集容器清洁

需要全本请访问 www.ertongbook.com