

張曉書醫話目次

產後	調經	瘡子	痢疾	暑證	濕病	傷寒
.....
一九	一九	一七	一三	一七	二	一

張晚香醫話精華

上海秦伯未編纂

普甯方公溥參校

傷寒

香粉術愈策兄十一月渠店夥屠越兄邀診。身熱舌黃。喉乾舌乾齒浮。脈浮大。患經五六日。予知爲陽明症。甫診畢。其家已延以傷寒名者至。爾時戚友趨擁入診。開小柴胡雜以消導。蓋此人祇有小柴胡達原小承氣。不論四時六氣。舌苔有無黃白皆此。其新人耳目者。枳壳枳實麻子仁大黃滾痰丸厚樸麝麴五穀蟲糞仁出入加減而已。予因言此屬陽明胃經。當用葛根湯。對曰。不特陽明。連太陽亦有於方末加葛根一錢五分。予不覺噴飯。次日則用糞仁桔壳。十二日病不去。乃邀予治。其陽明經仍在。不傳府。爲疏葛根湯。兩劑身即涼。會稽明府耿修翁乃弟。十一月水瀉痙厥。神呆不省人事。脈沉弦小。舌淨。

身不熱。已服過消導多多。予謂此直中太陰。未罷而傳厥陰。用理中合人參薤
菜萸湯。一劑水瀉止。瘧厥神呆如故。次日再診。脈浮弦小。身熱有微汗。自由厥
陰轉出少陽。當用小柴胡領邪外出。兩劑神清瘧去。大便暢解。正七日云。

□ 溫病

昌安街董。五月病溫。五六日舌鮮紅呃逆。脈沉小弦數。神昏口舌燥。不飲
水。予謂邪在血分。將發斑也。用玉女煎。石膏加至一兩。麥冬五錢。生根地一兩。
犀角一錢五分。磨沖。羚羊三錢。複大青以託斑。柿蒂以除呃。兩劑癰出神清。

府橋泥水匠鍾大成。舌鮮紅呃逆。脈洪數。面紅氣盛。是邪在心肺上焦。黃
芩湯加大力甘桔根生地一兩。生石膏二兩。麥冬五錢。犀角羚羊角柿蒂兩劑
呃除身涼。

營橋丁發頤大如馬刀。喉赤腫痛。舌黃厚。脈數大。說疫所謂疔瘡瘟也。病
經十餘日。由於失下。普濟消毒以人中黃易甘草。加製大黃五錢。不應。加至八

錢大園血而解。

教場沿高病溫多日。舌白薄。神昏迷。口不渴。脈伏小。予謂邪在上焦。將欲作汗。須領邪外出。黃芩湯加薄荷大力羚羊石膏甘桔一劑。次日大汗。大渴飲水無度。胸腹脹滿。小便不通。用白虎湯加瓜蒌皮一兩。帶皮茯苓一兩。一劑小便如注而解。

范可齋四月間上焦溫邪。用辛涼法。戰汗體冷如冰。人不能支。又可所謂體厥也。診脈靜小。余囑其家勿驚擾。疏沙參麥冬根生地花粉等滋肺而愈。蓋書以汗後脈如蛇者死。若沉部似有似無亦當死。又云脈不爲汗下減者死。上城隍廟道士溫邪。舌黃。脈沉小無力。予謂明日當戰汗。脈太弱恐戰而不得汗也。次日果作戰不汗而死。

大坊口趙患溫邪三日。其兩脚大痛。不能起立。予謂說疫中所云瓜瓢氣。乾痞瘋大頭瘟皆有方。又有極重者謂之軟脚瘟。患必死無方也。然予思總由

腎水之虛。肝家血分之熱。用張石頑先生下焦肝痛方。加炒小茴香一錢五分。川棟子三錢。酒延胡一錢五分。於黃芩湯中。三劑後足痛去。溫邪亦漸瘳。嗣後無論男婦。遇軟脚瘟。用此法俱效。

凡溫邪或暑濕。一見舌尖鮮紅。卽爲邪走心包。速須紫雪截其來路。如神。至昏瘧多用。亦難見效。宗滌翁郎似青。弱年時脈無神。予與劉友仙二兄深慮之。道光庚戌六月患溫。四五日辰刻診。予謂其戚王珠翁云。此症下午必入心包。紫雪香散恐不克當。不得已用人參湯送。遲則不救。予以原料紫雪付之。不卽服。黃昏瘧厥大汗。起立無常。脈虛小。予覆以不治。殊不知珠翁之夫人爲滌翁之妹。三月間患溫邪。予以紫雪治愈。是年溫邪犯心卽危。見機早用。或效。或問何以與又可法不同。予謂嘉慶年間所謂任大黃者。用又可大劑承氣得效。以天運交七赤八白。七赤屬大腸金。八白屬脾土。今則交九紫。火屬心。故邪亦走心包。卽肝厥肝痛之多且甚者。亦由心火盛。盜其母氣。肝虛易於致病。鴉片

烟之盛行。舒其肝鬱耳。明萬歷年間。閩人至京。售一粒金丹。所稱阿芙蓉。卽鴉粟漿也。惟任翁用又可法。大發財。名爲傷寒世家。其實真正傷寒。辨經別絡。恐難雪亮也。城鄉各鎮。尤而效之。不過達原一飲。承氣一湯。復以消導逐穢。不分四時百病。概謂傷寒。無論老幼強弱。均用此法。無論舌苔有無與黃白。無不攻消。於是人人知醫。個個插嘴。其術愈卑。其業愈賤。孔子云。小道必有可觀。今則小之欲無。觀之沒有。故有志者遁而之他。萬不習醫而醫。乃絕。

倉橋孔小山先生。乙丑冬季。年八十四。患風溫多日。身熱無汗。舌黑口齒燥甚。大便水瀉。脈洪大。是其本色。蓋高年未有脈不洪大爲六陽者也。閱所服是葶藶蘇子等瀉肺。雜以消導。致邪陷下焦。故不得汗。不得汗則身不得涼。今津液已潤。當救其陰。用黃芩湯。復以增液湯。瀉止。再以葶藶湯。得汗身涼。

治一孩三歲。二月間。辰刻身熱嗜臥。呼喚不醒。至黃昏。惟聞喉間痰聲壅塞。水漿不入。予以馬勃一兩。以病起勃然。故用勃然而興之藥。碎爲小塊。紗包

鐵物壓煎。又以箸掉。以手揉。緣輕浮之物。不易煎汁耳。煎數大。天灌一瓢。聞喉中聲。尤響。逾時向地傾之。又灌。又傾。二更後喉。天明不出汗。身涼。竟不服藥。又治世姪范定甫。甫週歲。三月患。氣絕。委諸地。尙溫。又抱之。予診脈。小數。虎口紋紫細。直透三關。囑毋開方。以逢藥。食必吐。絕食已一月。予問不食何以活。云見。耳。因思藥之如茶水者。必不吐。於是以病久氣虛。用燕窩一兩。以。羚角。竹葉。以代川連。黑櫓豆皮一兩。以代地黃。茯苓。通草。以通。味者。恣飲之。三日舌黑爲黃。洩通瀉。差。再三日竟愈。食粥飯。至。水溝營馮樸園姻兄。二月間在諸暨幕中。身熱咳喘。病如。風雨。至家則諸筋絡掣痛。失紅。脈數弦。舌黃薄。是肺衛心營皆。重。當先治其紅。用根生地一兩。麥冬。銀花。羚角。山茶花。絲瓜。絡。兩劑紅止。再以涼解衛分風熱。身涼而愈。

暑證

予六十九歲。七月十三日先嘔。腹響痛大瀉。瀉出如痰甚多。兩足麻木拘攣不能開。所貯來復丹霹靂散正氣丸。自覺於症不符。因記袁子才詩集患此。薛一瓢令服木瓜湯即愈。遂恣飲之漸愈。葉云扶虛進參附。張石頭先生云暑症誤藥皆有救法。誤服附子爲難解。曾見有下咽即死者。然予治會稽明府范公之封翁八月間轉筋。用大順散參附姜桂得效。大抵治病須辨別確切也。又表之汗不易徹。徹通也。曾見八月間患頭痛。頭如破。服各表藥無效。一轉大汗。即痙厥不治。是犯仲景之戒。蓋病屬伏暑上焦。當用薄荷絲瓜葉竹葉淡豆豉葱頭。以柴胡葛根羌活等殺之也。又見陰虛人。七月間服小柴胡三四劑。大汗如浴不救。城鄉醫者治暑無不以小柴胡湯。每至久纏不已。即用法諸恙悉解。而引入少陽之賊。反寒熱不去。予仍用柴胡截之。反致人詰。詎知即仲景附子瀉心湯治誤下結胸。內有大黃。喻氏治酒病仍用酒引。解鈴仍用繫鈴人也。予

治吳又軒在嘉興府內患上焦症。頭痛身熱。無汗口燥。海鹽廩生朱案云。用吳氏條辨法。辛涼微苦。字句書法均妙。而藥乃甜杏甘草秦朮。與案不符。歸家予用葉法。應候乃解。又攻之便易溏瀉。蓋遼河間法。至七八日自能溏瀉。爲濕邪自化。可接用通洩藥。爲開支河之法。予遇久患暑濕。六七十日。誤攻大便似痢非痢。用葉法即得暢解。譬如羣小成聚。一見君子漸散也。又過清則支冷嘔惡。邪未化火。烏得不以羚羊川連清之。當中病即止。過劑則支冷嘔惡洞瀉爲不治。予曾仿丹溪噤口痢法。以遼參入瀉心湯治嘔惡。以遼參入扶脾藥救洞瀉。往往無效。大抵遼參無真者耳。抑雖真亦不治耶。至誤服承氣。傷脾及胃作瀉。舌雪花不食。有用參朮炮薑得愈者。又治胡姓服承氣後大瀉。舌鮮紅脫液。口燥欲裂。爲腎陰之傷。仿甘露法。二地二冬肉桂茯苓生米仁滑石石斛。瀉止津回。又治富合盛伏暑。育醫誤下瀉水。舌鮮紅。脈弦小促。呃從小腹起。響而緩。爲傷及肝腎。覆以不治。其父下跪磕頭求救。予擬胡姓得效方。適育醫又至。被留

食商。彼診畢告予。謂食未淨。予曰。烏知其有食。曰。若食淨。身當涼。不涼。故知其未淨。予曰。子食飯必有食。何以身不熱。彼所病者。暑濕也。非食也。養人者。食也。殺人者。病也。子何以不治。殺人之暑濕。而治養人之食。彼不能說。以呃逆爲肝氣。開旋覆湯而散。嗚呼。醫若是。亦生人之大不幸也。然而臣門而如市也。則爲不可解之事。嗣病家又邀一醫。以犀角地黃湯下咽。卽死。亦一盲也。此二人若照醫門法律。當入無間地獄。又八月間。治松林老幕師薛朴堂先生之孫。盲醫先生已有方。予不知也。診脈數。舌黑燥。口渴作瀉。身熱有汗。予案云。此屬伏暑濕邪已化之候。而肺液胃津先涸。當增液通洩。若誤作挾熱下利。便非治暑濕法。程用根生地。生白芍。麥冬。生米仁。生穀芽。地骨皮。益元散。通草等藥。朴堂並不知醫。以與彼之青麟丸。萋仁。麻子。仁枳。壳。大異。因曰。天下醫祇一理。何冰炭若是。請問攻瀉何意。以彼之不會立案也。彼云。急下存津。緣不早攻。故致舌黑。今攻之。或可救也。又問。夫子何爲。予曰。予意在案。請觀案可也。彼云。能開方何

以不能說。予曰。子所言是傷寒論。此所患是暑濕症。丹溪先生云。暑濕從無大便攻瀉之理。譬如刑名。案情罪輕重不等。豈皆殺耶。傳曰。山有木。工則度之。賓有禮。主則擇之。主人擇之可耳。朴堂先生以予言爲長。服予方四五劑即愈。又治西郭嘉餘典內一婦。伏邪。誤服大黃致危。予以葉法多日治愈。身涼能食。或食後傾囊吐出。吐後仍食。間數日又吐。予用仲景炮薑甘草湯一劑即止。蓋炮薑三錢。炙甘四錢。以大黃之傷其胃也。又過燥則唇齒燥裂。燥藥以蒼朮爲最。厚樸半夏次之。川連苦以燥之。燥亦甚。米仁滑石茯苓雖燥不裂。上焦症易於化燥。患久須重用根生地兩許。多劑救其津液。方可得汗通洩。予治三財殿前朱石翁患伏暑。五六十日不汗不涼。不食不便。用根生地兩許。佐以麥冬元參。多劑始得汗得痞。且大解而身涼能食。若遇陰津素虧之人。舌淨光潔者。尤忌燥藥。蓋伏暑患在秋時。正當燥令。豈可過劑耶。又蒼朮本草謂其溶血。凡婦女經後。即遇水瀉。萬勿加用。用必液涸。雖大劑增液不可救。暑濕發痞者多。夾風

者亦發疹。須託疹。大力子蟬退晚蠶沙木防己等類。予曾於六月間遇發斑者。大便必瀉。往往不治。當時不過一二人。並非沿門合境。則非瘟疫可知。至今尙未解其何故。暑症最忌指尖怕冷。其人陽氣必虛。最易洞瀉。用藥不可不慎。暑濕有化脹者。當遼內經。脹起於上焦而甚於下焦者。當先治其下焦。而後治其上焦。治上焦麻黃湯。治下焦五苓散。然予試驗。當改云。須始治其上焦。而終治其下焦。若用麻黃必重用生石膏。爲大青龍越婢等法。以麻黃性溫。於暑未符也。此予之心得。治愈頗多。又治覆船山俞六十外年紀。伏暑化脹。已月餘不能行走。不能食用。張子和桂苓甘露飲二十餘劑愈。又富陽醫者馬姓。自述在軍營當差。受暑化脹年餘。自服金匱腎氣不效。慕名求治。予曰。金匱腎氣治腎脹。於病不符。暑脹在下焦。當用張子和桂苓甘露飲。所謂桂苓者。古法肉桂一錢五分。泡濃汁。滲入茯苓片六錢。晒乾入煎。爲君。每劑如是始效耳。乃揖謝曰。不差。不差。合好合好而去。未知其究竟愈否。第無論何脹。切須忌口。葷油麵食尤

忌鹹味可毋忌。然不可過鹹耳。又暑濕有夾瘡瘍者。治朱詠泉世姪。八月間患暑而濕邪尤重。瀉肛門患瘡。考金鑑云。名鶴口疽。但治其濕瘡。當先愈。用生茅朮生冬朮猪苓茯苓等。果瘡先結痂。而後身涼。伏暑有兩腿腫脹。浮大痠重。不便行走者。須用木防己石膏澤瀉炙桑皮。桑皮須自於桑根上掘取。藥舖皆身上剝皮。非下焦藥。故無效。又滿身患暑濕爛瘡。用根生地兩許。羚羊連翹川連地骨皮六一散茯苓皮晚蠶沙木防己澤瀉通草竹葉。不過十劑愈。余友某文理絕通。醫名亦有。其家中有患暑久而未愈。邀治。診脈合症。是上焦。予曰。治之。某日必愈。是逢每五日爲一候之期也。用葉法。果至期解。嘆以爲奇。殊不知渠確遵準繩治暑用六經法。葉案未經目也。故余集醫鍼一書。各病以一專長者爲主。以衆說彙之。如傷寒以仲景六經法。遵柯韻伯說。諸溫邪以河間法。遵張喻吳葉論及吳氏條辨。肝胃陽虛遵東垣。肝胃陰虛遵丹溪。暑濕風溫遵葉氏。諸疝遵張子和。儒門事親書。吐血遵繆氏廣筆記。古人各有專長。吾輩幸生

古人之後。當統觀而效法之。若坐井觀天。曰天在是。天豈盡於是哉。

痢疾

錦鱗橋毛婦患痢。舌黃口渴。痛在臍上下。用脾痢法。杏仁厚樸枳壳銀花炭香連丸陳皮。至第七日脈沉實。用製軍枳實攻之。詎病家申刻即睡。所議方每於次日始服。第八日服下藥。則小腹大痛。予謂是轉入肝經。藥在病後也。再以當歸黃芩湯合金鈴子散加柏子仁炒小茴香。又七日乃愈。是先脾後肝也。

山陰吏書陳步雲患痢多日。所服皆消導攻痢等藥。舌雪花。呃逆不食。脈兩尺獨大。餘弦小。此久痢傷及肝腎也。用熟地龜板歸芍阿膠補其肝腎。薑五味炙甘陳皮調其胃。以胃爲腎之關。仿胃關煎法也。複以刀豆除其呃。十餘劑愈。

予祖基本江南。遷紹二百餘年。即居此。與劉姓爲鄰。懷川世叔五六世交好也。患休息痢四載。日四五行。解出甚難。多轉矢氣。痢即隨出。如漿色紫。其休

時糞如筆管。商治於予。予謂須春分前後治之。至期診脈。弦滯大。予謂濕熱未淨。傷及氣分。用漢防己。焦茅朮。川連。茯苓。澤瀉。祛其濕熱。廣木。香縮砂。陳皮。利其氣。文黨參一兩。以升麻一錢煎濃汁。浸烘黨參。升補其氣。七帖其病如失。由是凡城鄉患休者。每約至春分。治愈頗多。又松林張年四十餘歲。患休息痢兩年。是傷及肝分者。用當歸。黃芩。湯合。香連丸。加製香附。縮砂。舒肝而愈。又松林薛四兄。作官江西。患休息痢已兩載。秋時歸里。求治於予。予以治須春分。現恐湯藥不能效。當用丸緩治之法。用川連一兩。台烏藥一兩五錢。焦茅朮三兩。廣木香一兩五錢。澤瀉一兩五錢。淡黃芩一兩五錢。研末米飲爲丸。每服五錢。服七兩餘。痢亦愈。緣渠痢中夾紅。爲濕之在肝者。

孕身患痢。治之極難。古人有五禁三審之法。三審者。審身之熱否。胎之動否。變之痛否。一禁檳榔。厚朴。破其氣。氣破胎下也。二禁製軍。破其血。血破胎下也。三禁滑石。通阜通。其穀穀通胎下也。四禁茯苓。澤瀉。利其水。利水必傷陰。胎

不保也。五禁人參升麻兜塞其氣。痢愈滯。胎撞心也。法當涼血利氣。雞頭山周七月孕身患痢。皋埠諸醫無效。邀予。予以前法二劑即愈。病家以方示諸醫。皆云非痢疾方。何以得愈。噫。正惟非痢疾方。乃所以治孕身之痢也。幼科周七香兄。其兩媳孕身。同時患痢。予以前法皆兩劑愈。予友朱穀堂寒士也。如君孕八個月患痢。雖不犯大黃檳榔。然皆厚朴枳殼萸仁麻仁通套藥。並非違古治孕痢法。黃昏邀余治。正在腰腹大痛。勢欲作產。穀堂手足無措。予診脈浮大而舌淨。今胎動一產。即母子皆傷。因憶景岳全書內有治孕痢欲產。用當歸補血法。用蜜炙糯米一兩。炒當歸三錢。炒糯米一合。幸藥鋪不遠。予爲之搗火速煎。下咽逾時痛止。再診關尺尙大。恐五更乃產。令再一劑。五更服之。次日午刻穀堂至。稱醫爲仙。五更果大痛。下咽痛止。以此方爲妙。又服一劑矣。予謂中病即止。過劑則屬兜塞。此痢胎前不能愈矣。果產後大作水瀉。又邀予。予以痢爲水瀉。爲將愈。毋須診。授以五苓散即愈。