

广西科学技术出版社



黄雙才 / 主編

实用 (二) 中草药原色图谱

SHIYONG ZHONGCAOYAO YUANSE TUPU



101507

实用中草药原色图谱
(二)

黄燮之 主编

广西科学技术出版社

(桂)新登字06号

实用中草药原色图谱 (二)

黄燮才 主编

广西科学技术出版社出版

(南宁市东葛路东段 邮政编码: 530022)

广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印制

邮政编码: 518031

*

开本 787·1092 1/32 印张 17 字数 190 000

1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷

印 数: 1-10 000册

ISBN 7-80619-272-7 定价: 85.00 元
R·32

此书如有倒装缺页, 请与工厂调换。

《实用中草药原色图谱》(二)

编 著 者

- | | |
|-----|-----------------|
| 黄燮才 | 广西药品检验所 |
| 黄贤忠 | 广西中医药研究所 |
| 李宇汉 | 香港中国医学研究所 |
| 毕培曦 | 香港中文大学中药研究中心 |
| 刘启文 | 香港中国医学研究所 |
| 郑汉臣 | 上海第二军医大学 |
| 高士贤 | 长春中医学院 |
| 韦家福 | 广西药品检验所 |
| 刘玉琇 | 中国医学科学院 药用植物研究所 |
| 严仲钊 | 吉林省中医中药研究院 |
| 邬家林 | 四川省医药学校 |
| 张效杰 | 吉林省中医中药研究院 |
| 吴光弟 | 四川省医药学校 |
| 仇良栋 | 广州市药品检验所 |
| 黄镇才 | 广西壮族自治区卫生厅 |
| 李延辉 | 中国科学院昆明植物研究所 |
| 赵素云 | 四川省中药研究所 |
| 林云仙 | 广西妇幼保健院 |
| 刘雪琼 | 南宁市中医院 |
| 白云鹏 | 吉林省中医中药研究院 |
| 戴 斌 | 广西民族医药研究所 |
| 陈祖强 | 广西河池地区药品检验所 |

前 言

中草药(包括民族药)是中华民族几千年来与疾病作斗争的经验总结。它不但为中华民族的繁衍昌盛做出了巨大贡献,而且开始走向世界,为许多国家人民的健康服务。

中国地域广大,自然条件复杂,中草药资源比较丰富。据统计,目前有中草药9000种左右,其中植物药约占8000种。为了继承和发掘祖国医药学遗产,更好地发挥中草药在防治疾病和增强人民健康方面的重要作用,我们选择了全国各地经营的或已批准在成药中使用的中草药品种,在野外进行实地拍摄,并参考有关文献资料,编著成这本图谱。图谱收载中草药250种,精选治疗多种常见病的有效处方1857条。本书的主要特点详见编写说明。

本书适合城乡医药卫生人员和具有初中以上文化的广大群众参考使用。也可供从事中药生产、采收和经营的有关人员参考。

在当前国际上流行的“人类要回归大自然”和“中草药热”的思潮影响下,天然药物重新受到了重视。尤

其是来源于大自然的中草药,由于疗效可靠,副作用小,格外受到青睐。人们热切盼望有一本临床实用的中草药彩色图谱问世。广西科学技术出版社为了满足广大读者的需要,及时组织编写和出版本书。希望本书能在普及中草药学知识和交流中草药防治疾病以及保障人民健康等方面产生积极作用。由于编著者水平所限和客观条件的不足,书中难免存在选择不当和叙述不周等缺点,敬请读者指正。

黄燮才

1995年11月于南宁

编写说明

1. 品种：本书收载临床实用中草药 250 种，按照科属的顺序编目。每种中草药均按名称、来源、形态、分布（置于图片下）、采收、性能、应用、选方和附注等项编写。全书还选载疗效较好的中草药处方 1857 条，分别见于每种中草药的选方项内。

2. 照片：每种中草药均有一帧形态逼真的彩色照片图。但是，由于野外拍摄时碰到一些技术困难，例如在拍摄木本、藤本和大型草本时，若全株拍摄，由于距离较远，则照片中的花、果、枝、叶太小，读者难于分辨，所以书中大部分中草药照片只拍摄有代表性的局部，用局部的花、果、枝、叶去表现全体；在拍摄细小的植株时，要用微距镜头，主体虽然清晰，但看起来却比原植株为大。因此，在看图时，应对照形态特征的描述。

3. 名称：中药原则上采用《中国药典》、《卫生部标准》或《地方标准》所用的名称，草药一般采用多数地区习用名称，以求药名逐步统一。

4. 学名：每种中草药在来源项只选一个国际通用的学名（拉丁学名）。

5. 分布：分布项置于图片下。广布的中草药只列至大区，如长江以南或华东、华南、西南、东北、华北、华中等；分布地区狭窄的则写至省、自治区。

6. 性能：根据中医使用中草药的传统经验，以五性（寒、热、温、凉、平）、五味（酸、苦、甘、辛、咸）加以阐述。在使用时应参照中医的四诊（望、闻、问、切）、八纲（阴、阳、表、里、寒、热、虚、实），辨证施治，以期收到理想的效果。

7. 选方：基本上是根据效用较好而又容易掌握的原则选取。主要来源于《中药大辞典》和《全国中草药汇编》等文献，部分为参加本书编写的名老中医的临床经验方。中西医病名均予采用。所列使用分量，可供参考，使用时可根据药物的性能和患者的体质强弱、病情轻重、年龄大小等具体情况进行加减。水煎服，是指用水煎药，煎好后滤出药液再加水煎。2次药液混合，日分2—3次服。每条选方中所列的中草药都可以从本书和已出版的《实用中草药原色图谱（一）》、《中国民间生草药原色图谱》以及将要出版的《实用中草药原色图谱（二）》和《实用中草药原色图谱（四）》中查到。

8. 计量：以传统中药药制为准，1斤=16两，1两=30g。选方的用量，除儿科疾病外，均为成人量，儿童用时应酌减；凡药名前冠有“鲜”字的，是指新鲜的药物，其他均为干燥的药物。外用适量，即指根据药物的性能和病情等不同情况，灵活决定。

9. 附注：一种植物有几个部位都可药用，并有各自的药名，则以主药见目，其他则在附注项说明。

10. 附录：书后附有中文名索引和拉丁名索引，以便检索。

目 录

1. 金顶蘑	(2)	25. 回回蒜	(50)
2. 猪苓	(4)	26. 猫爪草	(52)
3. 卷柏	(6)	27. 天葵子	(54)
4. 木贼草	(8)	28. 烟锅草	(56)
5. 阴地蕨	(10)	29. 功劳木	(58)
6. 石黄皮	(12)	30. 木通	(60)
7. 白毛蛇	(14)	31. 预知子	(62)
8. 骨碎补	(16)	32. 血散薯	(64)
9. 有柄石韦	(18)	33. 黄叶地不容	(66)
10. 白果	(20)	34. 马兜铃	(68)
11. 油松	(22)	35. 青木香	(70)
12. 侧柏	(24)	36. 广防己	(72)
13. 麻黄	(26)	37. 通城虎	(74)
14. 八角茴香	(28)	38. 细辛	(76)
15. 鸡爪风	(30)	39. 胡椒	(78)
16. 肉桂	(32)	40. 岩黄连	(80)
17. 乌药	(34)	41. 马槟榔	(82)
18. 黑吹凤	(36)	42. 芥子	(84)
19. 川乌	(38)	43. 紫花地丁	(86)
20. 类叶升麻	(40)	44. 大金不换	(88)
21. 升麻	(42)	45. 远志	(90)
22. 威灵仙	(44)	46. 五味藤	(92)
23. 黄连	(46)	47. 石竹	(94)
24. 白芍	(48)	48. 瞿麦	(96)

- | | | | |
|----------------|--------|-----------------|-------|
| 49. 王不留行 | (98) | 76. 胖大海 | (152) |
| 50. 土人參 | (100) | 77. 凤眼果 | (154) |
| 51. 竹节蓼 | (102) | 78. 苘麻子 | (156) |
| 52. 蒴藋 | (104) | 79. 扶桑 | (158) |
| 53. 虎杖 | (106) | 80. 玫瑰茄 | (160) |
| 54. 何首乌 | (108) | 81. 冬葵 | (162) |
| 55. 桃叶蓼 | (110) | 82. 地桃花 | (164) |
| 56. 牛膝 | (112) | 83. 红背山麻杆 | (166) |
| 57. 蓮子草 | (114) | 84. 巴豆 | (168) |
| 58. 鸡冠花 | (116) | 85. 乳浆草 | (170) |
| 59. 九层风 | (118) | 86. 泽漆 | (172) |
| 60. 千日红 | (120) | 87. 千金子 | (174) |
| 61. 亚麻子 | (122) | 88. 大戟 | (176) |
| 62. 蒺藜 | (124) | 89. 红鱼眼 | (178) |
| 63. 酢浆草 | (126) | 90. 山乌柏 | (180) |
| 64. 沉香 | (128) | 91. 牛耳枫 | (182) |
| 65. 满山香 | (130) | 92. 常山 | (184) |
| 66. 西河柳 | (132) | 93. 仙鹤草 | (186) |
| 67. 丝瓜络 | (134) | 94. 桃仁 | (188) |
| 68. 木鳖子 | (136) | 95. 乌梅 | (190) |
| 69. 马交儿 | (138) | 96. 光皮木瓜 | (192) |
| 70. 羊奶子 | (140) | 97. 木瓜 | (194) |
| 71. 大叶桉叶 | (142) | 98. 云枳 | (196) |
| 72. 横经席 | (144) | 99. 地榆 | (198) |
| 73. 黄麻 | (146) | 100. 梳藤 | (200) |
| 74. 紫葳 | (148) | 101. 南蛇勒 | (202) |
| 75. 假苹婆 | (150) | 102. 皂角刺 | (204) |

- | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|
| 103. 鸡骨草 | (206) | 130. 胡颓子 | (260) |
| 104. 肝炎藤 | (208) | 131. 藤茶 | (262) |
| 105. 刀豆 | (210) | 132. 六方藤 | (264) |
| 106. 响铃草 | (212) | 133. 香橼 | (266) |
| 107. 甘草 | (214) | 134. 佛手 | (268) |
| 108. 铁扫帚 | (216) | 135. 白藓皮 | (270) |
| 109. 黑血藤 | (218) | 136. 枸橼 | (272) |
| 110. 苦参 | (220) | 137. 花椒 | (274) |
| 111. 槐花 | (222) | 138. 五倍子 | (276) |
| 112. 鸡血藤 | (224) | 139. 核桃 | (278) |
| 113. 通草树 | (226) | 140. 五加皮 | (280) |
| 114. 路路通 | (228) | 141. 枫荷桂 | (282) |
| 115. 穿破石 | (230) | 142. 七叶莲 | (284) |
| 116. 无花果 | (232) | 143. 白芷 | (286) |
| 117. 小牛奶木根 | (234) | 144. 柴胡 | (288) |
| 118. 五指毛桃 | (236) | 145. 明党参 | (290) |
| 119. 山牛奶 | (238) | 146. 蛇床子 | (292) |
| 120. 桑叶 | (240) | 147. 茺菘子 | (294) |
| 121. 大叶苘麻 | (242) | 148. 小茴香 | (296) |
| 122. 苘麻根 | (244) | 149. 川芎 | (298) |
| 123. 火麻 | (246) | 150. 防风 | (300) |
| 124. 枸骨叶 | (248) | 151. 罗伞树 | (302) |
| 125. 槲寄生 | (250) | 152. 断肠草 | (304) |
| 126. 绿珊瑚 | (252) | 153. 连翘 | (306) |
| 127. 锁阳 | (254) | 154. 秦皮 | (308) |
| 128. 铁包金 | (256) | 155. 鸡蛋花 | (310) |
| 129. 大枣 | (258) | 156. 络石藤 | (312) |

-
- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 157. 白薇 | (314) | 184. 山柳菊 | (368) |
| 158. 白前 | (316) | 185. 旋覆花 | (370) |
| 159. 天星藤 | (318) | 186. 全叶马兰 | (372) |
| 160. 球兰 | (320) | 187. 千里光 | (374) |
| 161. 石萝摩 | (322) | 188. 亚洲蒲公英 ... | (376) |
| 162. 梔子 | (324) | 189. 蒲公英 | (378) |
| 163. 牛白藤 | (326) | 190. 苍耳子 | (380) |
| 164. 穿根藤 | (328) | 191. 黄鹤菜 | (382) |
| 165. 毛钩藤 | (330) | 192. 龙胆 | (384) |
| 166. 大叶钩藤 | (332) | 193. 金钱草 | (386) |
| 167. 山银花 | (334) | 194. 车前子 | (388) |
| 168. 火柴树 | (336) | 195. 沙参 | (390) |
| 169. 败酱草 | (338) | 196. 南沙参 | (392) |
| 170. 墓头回 | (340) | 197. 土党参 | (394) |
| 171. 续断 | (342) | 198. 蒙古鹤虱 | (396) |
| 172. 蒙古山萝卜 ... | (344) | 199. 洋金花 | (398) |
| 173. 牛蒡子 | (346) | 200. 地骨皮 | (400) |
| 174. 蚊烟草 | (348) | 201. 千年不烂心 ... | (402) |
| 175. 紫菀 | (350) | 202. 牵牛子 | (404) |
| 176. 苍术 | (352) | 203. 水茴香 | (406) |
| 177. 白术 | (354) | 204. 通泉草 | (408) |
| 178. 东风草 | (356) | 205. 穗花马先蒿 ... | (410) |
| 179. 红花 | (358) | 206. 苦玄参 | (412) |
| 180. 大蓟 | (360) | 207. 地黄 | (414) |
| 181. 烟管蓟 | (362) | 208. 石吊兰 | (416) |
| 182. 还阳参 | (364) | 209. 爵床 | (418) |
| 183. 菊花 | (366) | 210. 兰香草 | (420) |

211. 广防风	(422)	233. 土茯苓	(466)
212. 泽兰	(424)	234. 金钱蒲	(468)
213. 薄荷	(426)	235. 一把伞南星 ...	(470)
214. 紫苏	(428)	236. 天南星	(472)
215. 广藿香	(430)	237. 西红花	(474)
216. 丹参	(432)	238. 山药	(476)
217. 荆芥	(434)	239. 广山药	(478)
218. 泽泻	(436)	240. 朱蕉	(480)
219. 野慈菇	(438)	241. 槟榔	(482)
220. 慈菇	(440)	242. 白及	(484)
221. 谷精草	(442)	243. 马鞭石斛	(486)
222. 红豆蔻	(444)	244. 天麻	(488)
223. 草豆蔻	(446)	245. 盘龙参	(490)
224. 高良姜	(448)	246. 灯心草	(492)
225. 益智	(450)	247. 薏苡仁	(494)
226. 姜黄	(452)	248. 牛筋草	(496)
227. 知母	(454)	249. 白茅根	(498)
228. 平贝母	(456)	250. 淡竹叶	(500)
229. 萱草根	(458)		
230. 百合	(460)	中文名索引.....	(502)
231. 玉竹	(462)	拉丁名索引.....	(518)
232. 土太片	(464)		

中药十八反歌诀

本草明言十八反， 半蒺贝藜及攻乌，
藻戟遂芫俱战草， 诸参辛芍叛藜芦。

注释：乌头(川乌、草乌、附子)反半夏、瓜蒌(瓜蒌皮、瓜蒌仁、花粉)、贝母(川贝、浙贝、伊贝)、白蔹、白及；甘草反大戟、芫花、甘遂、海藻；藜芦反人参、党参、苦参、升参、南沙参、北沙参、细辛、赤芍、白芍。

中药十九畏歌诀

硫黄原是火中精， 朴硝一见便相争，
水银莫与砒霜见， 狼毒最怕密陀僧，
巴豆性烈最为上， 偏与牵牛不顺情，
丁香莫与郁金见， 牙硝难合荆三棱，
川乌草乌不顺犀， 人参最怕五灵脂，
官桂善能调冷气， 若逢石脂便相欺，
大凡修合看顺逆， 炮熅炙煨莫相依。

注释：硫黄畏朴硝(芒硝)；水银畏砒霜；狼毒畏密陀僧；巴豆畏牵牛；丁香畏郁金；牙硝(芒硝)畏三棱；川乌、草乌畏犀角；人参畏五灵脂；官桂(肉桂、桂枝)畏石脂。

1. 金顶蘑(金顶侧耳、榆蘑)

来源 侧耳科植物金顶蘑 *Pleurotus citrinopileatus* Sing. 的子实体。

形态 子实体丛生。菌盖柠檬黄至草黄色,漏斗形,光滑,宽3~10cm。菌柄偏生,白色,长2~10cm,粗0.5~1.5cm,往往基部相连。菌肉白色,肉质,具香味。菌褶白色,稍延生,不分叉,狭窄至稍宽。孢子圆柱形,无色,光滑。

采收 秋季采,晒干。

性能 甘,温。滋补强壮,益气和血,止痢。

应用 用于身体虚弱萎症,肾炎,胃寒痛,慢性气管炎,肺气肿,痢疾。用量5~10g。

选方 1. 身体虚弱萎症(肌萎):金顶蘑500g,用黄酒浸泡9天,蒸9次,晒干,小火炒至黄色,研末,每服3g。另取金顶蘑30g,用黄酒和水同煎。取药液和药渣一起送服金顶蘑粉,每天1次,连服10天。

2. 痢疾:金顶蘑10g,焙干研末,开水冲服,每次5g,日2次。

3. 肺气肿:金顶蘑10~15g,水煎服。

4. 肾炎:金顶蘑6g,白公鸡1只(去毛及内脏)。把金顶蘑用纱布包好,放鸡肚内,用砂锅煮熟服。

5. 久病体虚:①金顶蘑6~10g,水煎服。②金顶蘑10g,党参、黄芪各15g,山药30g,水煎服。

6. 虚寒胃痛:①金顶蘑6g,小毛茛10g,水煎服。②金顶蘑6g,胡椒10g,共研粉,开水冲服。

7. 慢性支气管炎:金顶蘑15g,水煎服。



1. 金顶蘑(金顶侧耳、栓蕈)

生于栎树、橡树等阔叶树的树干或腐木上。分布于吉林、湖北、福建、广西、四川、贵州、云南、广西。

2. 猪 苓

来源 多孔菌科植物猪苓 *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fries 的菌核。

形态 菌核埋生于地下,呈不规则块状,表面凹凸不平,黑褐或棕褐色,有油漆光泽,有许多瘤状突起和皱纹,里面白色或淡黄色,干后变硬,半木质化。子实体由菌核上生长,伸出地面,柄多次分枝,每枝顶端有一肉质菌盖。孢子卵形。

采收 春秋季挖取菌核,晒干。

性能 甘,淡,平。利水渗湿。

应用 用于水肿,小便不利,尿路感染,夏季中暑水泻,淋浊带下。用量 6~12g。

选方 1. 水肿,小便不利:猪苓、茯苓、泽泻、滑石粉各 10g,水煎服。

2. 夏季中暑水泻:猪苓、茯苓、白术、扁豆、篇蓄各 10g,水煎服。

3. 尿路感染:猪苓、黄柏各 10g,海金沙藤 30g,水煎服;或猪苓、木通各 6g,篇蓄、车前子各 10g,水煎服。

4. 急性肾炎,全身浮肿,口渴,小便不利:猪苓 15g,水煎服。

5. 肝硬化:猪苓、茯苓各 15g,泽泻、白术各 30g,肉桂 10g,水煎服。

6. 急性肾盂肾炎:猪苓、黄芩、泽泻各 12g,柴胡、连翘、车前子、忍冬藤、蒲公英各 30g,水煎服。

7. 急性膀胱炎,见有尿痛尿血:猪苓、茯苓、泽泻、滑石、阿胶(烊化)各 10g,水煎服。