

婴童百问

下



中医古籍善本丛刊

62-54



明·鲁伯嗣著

婴童百问 下

中医古籍善本丛刊

上海书店出版

嬰 童 百 問

明·魯伯綱著

上 海 書 店 出 版

(上海福州路401号)

新华书店上海发行所发行

宝山东方红印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/16 印张30 插页2

1985年6月第一版 1985年6月第一次印刷

印数 1-10000

G47 全二册 定 价 4.40元

嬰童百問卷之六

傷寒正受傷寒夾驚

第五十一問

小兒傷寒初得。渾身發熱無汗。多啼笑。看眼急。有如驚風。但用發散退熱。莫令發渴。如渴便欲飲水。不歇當發散。羌活散。三黃散。柴胡散。抱龍丸。或虛煩可用竹葉湯。如嫩小兒。當服洗心散。薄荷散。紅綿散。四肢發汗。自然精神喜悅。感傷寒之重者。當依仲景之法治之。又有傷寒夾驚。先要發散。其乃退熱。化痰截驚。乳下嬰兒。抱龍丸。羌活散。加荊芥防風。三黃散。微利。

痰熱次用柴胡黃芩藥調理管取向安葱白湯亦可服

羌活散

治傷寒風驚熱或中風體硬可加麻黃乾葛薏苡仁

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

白茯苓

桔梗

枳殼

人參

地骨皮

天麻

各等分

甘草

減半

右判散生薑薄荷煎加蟬蛻治驚熱

柴胡散

治小兒傷寒無汗有表症壯熱頭疼身體痛口乾煩渴小便赤大便秘澀夾驚腮腫。

石膏

黃芩

甘草

赤芍藥

葛根

各二錢半

麻黃

去節

柴胡

半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一盞生薑少許葱

白三寸豆豉一撮煎至七分不拘時溫服

三黃散

解傷風熱症

白朮

大黃

蒸

赤芍藥

半兩

黃芩

三錢

麻黃

去節 一錢

桂枝

二錢

右咬咀。生薑一片。棗二枚。水一盞。煎七分。溫服。

抱龍丸

治傷風溫疫身熱。氣粗痰實壅嗽。常服安神鎮

驚。亦治疹痘壯熱。小兒宜時與服。

膽星

一兩

天竺黃

二錢

雄黃

二錢

辰砂

二錢

麝香

少許

氣喘有痰加杏仁

右爲末。煮甘草汁。丸嬰桃大。陰乾。薄荷湯吞下。

竹葉石膏湯

治傷寒表裏俱虛。徧身胸煩悶。或得汗已解。內
無津液。虛羸少氣。氣逆欲吐。及諸虛煩。傷寒解
後。傷寒未解。切不可服。

石膏

四兩

半夏

六錢

人參

半兩

甘草

半兩

麥門冬

去心
一兩

右咬咀。每服三錢。生薑一片。粳米五十粒。煎米
熟爲度。去滓溫服。嘔者加生薑三片。竹葉數片。
洗心散

治風壅壯熱。頭目昏痛。痰涎壅滯。涕唾稠粘。心

神不寧。眼澀睛疼。及鼻塞聲重。咽乾多渴。五心煩熱。小便黃赤。大便秘澀。並宜服之。

白朮

一錢半

甘草

炙六錢

當歸

六錢

麻黃

不去節六錢

荊芥穗

六錢

芍藥

六錢

大黃

麩裏煨去麩切焙六錢

右剉散。每服四錢。生薑薄切。煎去滓。乳母服。或兒服。加前胡。生地黃。辰砂。名辰砂七寶散。爲末。治小兒口瘡。積熱夾驚。傷寒。生薑薄切。泡湯調下一錢。二十問內有七寶洗心散。可兼看參用。辰砂七寶散。

治小兒壯熱傷風壅熱。治夾驚傷寒。解諸般熱。亦治疹痘熱。治驚風。定搐搦。

麻黃

去節半兩

白朮

炒半兩

當歸

半兩酒洗

赤芍藥

半兩

大黃

生半兩

荊芥

穗半兩

前胡

半兩去芦

生地黃

酒洗半兩

甘草

生半兩

急驚加辰砂薄芎調下。

右爲末。每服三錢。傷風發散。用生薄芎泡湯下。

薄芎散

治乳下嬰兒鼻塞不通。及治夾驚傷寒。變蒸熱。

薄芎葉

半兩

羌活

一錢半

全蝎

一錢半

甘艸

一錢半

麻黃

一錢去節

殭蠶

炒一錢半

天竺黃

一錢

白附子

半錢

右爲末。每服三。薄荷湯下。熱極生風。加竹瀝

少許與服。一方有柴胡。台芩。桔梗。茯苓。無全蝎

殭蠶。天竺黃。白附子。

紅綿散

治傷風咳嗽鼻塞。或流清涕。

全蝎

五个去毒

麻黃

去節二錢

殭蠶

炒二錢

白芷

二錢

川芎

二錢

天麻

二錢

甘草

一錢

蘇木

一錢

右剉。綿少許煎服。有熱加荊芥。一方有大黃。

葱白湯

治頭疼不止身疼渴發熱小便赤黃脉浮數無汗。

葛根

半兩

芍藥

半兩

知母

半兩

川芎

一兩

右咬咀每服二錢水一小盞生薑二片葱白三枚煎至七分去滓熱服出汗如有汗溫服加甘草治小兒夾驚傷風并治發瘧頭疼加石膏服嘔者加半夏半兩。

羌活湯

解利邪氣傷風

羌活 一錢 人參 一錢 防風 一錢 川芎 一錢

右剉一劑。生薑三片。薄荷七葉。水一盞。煎至七分。不拘時服。加芍藥甘草。

小兒傷寒與時氣同異

第五十二問

夫小兒傷寒得之與大人無異。所異治者。兼驚而已。又有因夾驚食而得。治法與大人一同。但小其分劑。使藥性稍差耳。仲景云。春氣溫和。夏氣炎熱。秋氣清涼。冬氣冷冽。此則四時正氣之序也。冬時嚴寒。觸冒之者。乃名傷寒。耳。其傷于四時之氣。皆能爲病。冬受寒毒之氣。其卽時而病者。頭痛身疼。肌膚熱而惡寒。名曰傷寒。其不卽時病者。寒毒藏于肌膚之間。至春夏陽氣發生。則寒毒與陽氣相搏于榮衛之間。其病

與冬時卽病無異。但因春而發。名曰溫病。至夏而發。名曰熱病。陽熱未盛。爲寒。所制病。名爲溫。陽熱已盛。寒不能制。病名爲熱。故太醫均謂之傷寒也。然熱病傷寒。溫病時氣。傳變無異也。凡時氣者。四時之間。有不二之氣也。爲春應煖而反寒。夏應熱而反冷。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。非其時而有其氣。氣之中人。則頭疼壯熱。咳嗽氣粗。煩渴心躁。恍忽驚悸。傳變與傷寒無異。故一歲之中。病無長少。率相似者。此則時行之氣。俗謂之天行是也。治法三四月或有暴寒。

其時陽氣尚弱。爲寒所折。病熱猶輕。升麻湯解肌湯主之。五六月陽氣已盛。爲寒所折。病熱則重。七八月陽氣已衰。爲寒所折。病熱亦微。調中湯射干湯半夏桂甘湯。可選用也。秋溫冬溫。治溼則利小便。治冬溫亦宜解利。其利小便也。則以五苓散輩。其解利冬溫宜葳蕤湯。蓋冬溫者。感溫氣而作。寒疫者。暴寒折人。非觸冒之過。其治法不同。所施寒熱溫涼之劑亦異。不可拘以日數。發汗吐下。隨症施行。要之治熱以寒。溫而行之。治溫以清。冷而行之。治寒以熱。涼而行之。

身重耳閉
治清以溫熱而行之。以平爲期。不可以過。此爲大法。
湯氏有七寶散加減服之。併與乳母尤好。有熱者加
升麻湯加柴胡黃芩等劑治之。柴胡石膏湯極效。

升麻湯

治小兒時行瘟疫。頭痛發熱。肢體煩疼。及瘡疹
已發未發。疑似之間。治傷寒中風憎寒壯熱。肢
體疼痛。鼻乾不得睡。兼治寒暄不時。人多疾疫
乍煖脫着。及暑熱之忽變陰寒。身體疼痛。頭重
如石者。亦可加柴胡。無汗加麻黃。