

藝縣通志

第三

240.51
42
2/3 = 18

博物志

甲編
植物 動物
地質 雜產

乙編
工藝製造
品

𡵓

𡵓

𡵓

𡵓

第三 博物志

甲編 植物 動物 地質

雜產

乙編 工藝製造品

鄞縣通志第三

博物志敘目

方志甄采物產最爲不易蓋與吾人共據大地上者無論生物非生物皆具特殊效用自有記載之價值然見物輒錄漫無棄取則此沈沈夥頤何異夫中華博物大字典方志之體制果爾爾乎若欲損多裒寡稍加區別於其間則一方見以爲利爲有用亦可於一方見以爲害爲不足存于此欲求其所采無漏無費安所準則哉鄞之爲縣地褊廣矣海陸交會旅生實繁以視他縣甄采之難什伯焉茲所纂述不敢執一以繩百或依主用分類或依類表其情況要各敝其輕重而質的之編第如左

甲編

一、植物之部 二、動物之部 三、地質之部 四、雜產之部

乙編

工藝製造品之部

鄞縣通志

博物志



博物志甲編

一、植物之部

生物之有繫于人生尙已而生物中之植物尤爲吾人資生之原衣也食也居室也無一不資乎是卽供人類主要需用之獸類苟無流植散材爲其飼料亦不足全其生體以充給吾人之供養故志博物當以植物爲先鄞志歷來記載物產大都襲本草羣芳譜之舊未嘗實地徵采非特名實不符且有遠地方物而譌爲縣產者冗雜錯亂不可僂指識者病焉是志爲矯蹈虛之弊開局伊始卽由吳生蘊道鍾生國儀徧歷境內山野采製鄞產植物標本二年以還往復凡八次有用草木略盡其類然後依據形態考定品種科屬名稱不厭其詳產地用途亦存其略一表之成稿凡四五易削繁擷要頗費究討蓋植物之分類定名貴屑極矣雖目前常見之物徒得其形似未可以爲據必自幼植至成長開花結子一一實物考驗乃克確立其種名左表原稿本並詳生態以行列過繁難免纏綿爲易於

鄞縣通志

博物志

二

寫刊計不如刪落較爲明簡至列表以主用分類意在顯草木之效用示吾甬之趨舍與供學理上之研究不同本擬別列有毒植物一表用促民間避忌嗣案是項毒植入藥者不少因削之增爲藥用植物他如汎植庶類有其物而絕少效用者此屬於專門研究之用茲不概收其有效用而非本縣土質所宜者雖偶有栽培時見時絕亦不予收載蓋所以重材用而昭方物也表目如左

食用植物列表

分九類(一)禾類(二)菽類(三)根菜類(四)葉菜類附地上莖(五)瓜類(六)香辛類(七)果類(八)飼料類(九)其他

工藝植物列表

分四類(一)纖維類(二)油蠟脂液類(三)嗜好品類(四)染料類

藥用植物列表

園林植物列表

觀賞植物列表

右諸表所列其遂盡有用植物之縣產乎未可也夫植物之分布苟無特殊習性氣化關係何地不可生存一二人之足跡有限安能於短短數月中徧踏全縣山野而歷求之失采漏列勢所不免卽就余躬遇者言之廿年前有人在太白山淺水許采得肉食植物二種一時以爲異學者聞而踵求年有其人顧絕無所得數年前有鄉人就山麓造墳起土數尺下見有物如塊莖者數枚大如笠小如蒜惟全體潤滑無地上莖及鬚根不能識別其種名竊奇其狀於翌日急往購取至則其物已煮以喂豬無有殘存此何物耶豈所謂塊菌者類乎抑變態之塊根而爲他菌類所寄生者乎至今猶未忘於心也澤農常謂有艸能生蚊初以爲此必蚊母樹之屬也及見其所采則爲鳳仙花科葉腋間有小贅體破之見一飛蟲略似蚊者蟄焉其產蚊艸乎抑食蟲植物之一種乎未可知也據他農言生蚊艸不止此種凡莖嫩者葉軟者多能產蚊則此寄生體似亦廣矣而植物學

鄞縣通志

博物志

三

者汔未之遇又如白樺與移楊曾見於城南某氏廢墅城北佑聖觀側地上亦見有著艸遺植謂此爲縣產乎而他處無有也江北岸英領事館附屬之圃不少歐種植物而尋常民間無有也近年除蟲菊亦間有栽培然以繁殖不得法越歲卽失其種凡此諸類終不可遂指爲縣產故右列諸表不能盡縣產之什一祇可云有用植物之汎普者而已總之生物進化無論天然或人工植物較雜於動物其蕃殖方法又不如動物之簡單故變種新種錯出不窮此尤賴於學者繼續不斷之研究非一人一時所能盡也至如藥用植物一門漏遺自屬不少單方所用之藥出諸山農之口山農射利故作神奇隱祕妄指在所不免俗所謂專方郎中者就症采藥不以全植示人碎採粉擣塗絕眼目然其效用往往立見曩歲里婦患乳癰西醫經深密之診斷謂非割去患肉不可而賣土藥者僅以艸藥擣爛敷之一宿痛止再易再敷三四宿脫然無患如此奇效之藥並不采自深山據云尋常林麓皆有之而其方祕終不肯傳殊可惜也有女面患鼠繡

攢列數十星西醫欲施手術則痛苦難忍有素識采藥山夫告以用胡麻葉搗汁洗之三洗即除如法行之果大效不獨無痛苦且絕少疤痕此皆眼見身歷之事然貢之於今所謂醫博士者則曰此偶耳此盲說也曾不肯小用其心於此有效之土植尤可痛惜此志所以多載藥用植物者實欲喚起邑人之注意對此藥物加以培養并希望藥學學者少分其心以研討之庶有補於民生疾苦云

人生衣食住三要素之原料略備於右諸表但近年農事以農村經濟衰落故致不能及時施工於作物農家曆幾等廢紙茲附錄農事月令圖說除螟月令圖說於後亦農村復興運動之意爾

食用植物列表

凡可供給吾人日常之食料及家畜家禽家蟲等之飼料者皆屬之分九類

一、禾類 本類植物皆屬禾本科惟蕎麥為蓼科以其用途與本類

鄞縣通志

博物志

四

相似故附列入之本類除蕎麥為雙子葉植物一年生草本外餘均為單子葉植物一年生或越年生草本其供吾人利用之主要部分則為種實種實所含主要成分為蛋白質脂肪質及澱粉等吾人食物中幾占百分之八十以上如飯糕糰(稻)饅頭麵包(麥)等皆從本類種實所製成者也

種名及別稱	科	屬	學	名	品	種	用	途	產	地	備	註
稻	禾本科	稻屬	Oryza sativa, L.		一、梗稻 粘性 分早中晚三種 甲、早熟種 有黃大連白 尖黃巖火稻 細桿六十日 等種別 乙、中熟種 有白湖仙紅 嘴甲大桿洋 尖額白廣和 淮白等種別	(實)除充主要之 食糧外可製各種 食餌粘者又可釀 酒 (稻即稻草)用為 燃料飼料及造紙 編物蓋等其灰 可供肥料 (米糠)充飼料又 其內含維他命成 分頗多可治或種 之腳氣病	凡本縣有水田之 處皆栽培之惟因 全縣山地面積占 二分之一以上故 各山中亦有闢為 水田者然為數不 多尙不足以抵全 縣住屋園地等所 占之面積故水田 之總面積不過占 全縣面積之半數 而已其中又須除	本縣稻類于播種前 先行浸種促進其發 芽播期則隨地段及 品種而異略有先後 大約普通早熟種 清明前後下種 立夏前後播秧插 後約六十日至九 十日即可收割中 熟種清明至穀雨 期間播種立夏至 小滿播秧下種起 至收穫日止其間 約百五六十日左 右晚熟種及糯稻				

			丙、晚熟種 有晚青早紅 遲紅荔支蔓 野稻等種別 二、糯稻 粘性 有早糯遲糯席 草糯黃穀糯等 種別 此外尚有矮脚黃 紅脚骨烏穗稻早 稻等種皆為粘性	(稈即薯蕷)供燃 料及洗滌器具之 用	去河流通路灌漑 池等所占之面積 再因風土及居民 環境關係若東西 鄉一帶之栽種具 母及蔴草于水田 面積中又須除去 若干因此其產額 在豐年全縣尚不 克自給遇風蟲水 旱等災害更須仰 給于外埠惟較之 舊寧屬其他各縣 則已多矣	約穀雨前後播種芒種 前後插秧秧後百二三 十日至百五六十日收 穫 肥料須依地質及品種 略有差異然本縣一般 皆用紫雲英(草仔)首 稻(黃花草仔)為前作 物(冬作)于翌年三四 月將花時犁入土中或 用牛骨豆餅等為基肥 再佐以人糞尿河泥草 木灰炮粉等為補肥
--	--	--	---	-----------------------------------	---	--

大麥	禾本科 大麥屬	<i>Hordeum sativum</i>, Jess.	通常分普通大麥 與裸大麥二種內 有二荳四荳六荳 等名稱	(實)食料飼料釀 造麥酒酒精醬油 及製造麥精糖麵 精(麩)等用 (稈)燃料編物造 紙等用	為地作物及稻田 之前作物(冬作) 各地皆有種植惟 栽培面積不及稻 五十分之一	大麥所須養分與稻相 類為稻田之前作物極 不相宜
小麥	禾本科 小麥屬	<i>Triticum sativum</i>, Lam.	分有芒無芒兩種	(實)食料飼料釀 造醬油及製麵麵 包食餌等用	同大麥	同大麥

鄞縣通志

博物志

玉蜀黍 (俗呼陸穀)	禾本科 玉蜀黍屬	<i>Zea sativum</i>, L.	有早稻陸穀淮白 陸穀糯稻陸穀之 別	(實)食料飼料及 製造燒酒澱粉等 用 (稈)燃料	各地略有栽植近 山水田少居民多 種之以作副糧	除瘠薄之沙土及卑溼 之粘土外皆可栽培
蘆稌 係蜀黍 之一種	禾本科 蜀黍屬	<i>Andropogon sorghum</i>, Brot.	有糯米蘆稌糯米 蘆稌兩種	(實)飼料食料釀 造燒酒製作餅餌 等 (稈)燃料及製束 帚拭等用	栽植甚少	
粟即黃黍 (俗呼粟米)	禾本科 粟屬	<i>Setaria italica</i>, Beauvois.	分梗糯兩種	(實)炊飯煮粥釀 酒外尚可為鳥類 之飼料 (稈)燃料	因耐旱力甚強近 山居民有種植者	
薏苡即米仁	禾本科 薏苡屬	<i>Coix lacryma</i>, Jobi, L.	野生者曰川薏與 本種同屬異種	(實)除食用外可 供利尿劑及強壯 劑之藥用 (稈)燃料	近山居民間有種 植者為數甚少	
燕麥 (一名雀麥或 曰夜麥)	禾本科 燕麥屬	<i>Avena sativa</i>, L.		(實)食料飼料 (稈)燃料飼料	本縣絕少種植間 有野生于麥田或 雜草間	

稗即稗 (俗呼叛草)	禾本科 稗屬	<i>Panicum frumentaceum, Roxb.</i>	屬野生亦有稗糯 之別	(實)亦可供食料 及釀造燒酒之用 農民以其為禾田 之害草無利用之 者	稗水旱無不易熟甚害 禾在交通未便時以此 為救荒植物之一種
黍及稷	禾本科 稷屬	<i>Panicum miliaceum, L.</i>	黍與稷同科同屬 形性相若所差者 不過稷(稷)糯(黍) 之別莖葉似 粟而穗形大異多 歧出狀不與中軸 相接	(實)食料飼料 (稗)燃料	近山居民或小有 種植之者
政即蕎麥	蓼科 蕎麥屬	<i>Fagopyrum esculentum, Moench.</i>	有春蕎麥與秋蕎 麥之別各有紅梗 與青梗兩種	(實)食料飼料 (花)飼養蜜蜂最 良好	各地有栽培之者 均為秋蕎麥數量 不多
					秋種不論青紅均在白 露前後播種霜降前後 收穫

二、菽類 本類均屬豆科多數為一年生草本間有越年生者種子具二枚子葉胚乳含子葉中其所含成分多蛋白質及脂肪質供吾人之食料及家畜之飼料最為適宜若吾人常食本類以代乳肉雖終年素食艱縣通志 博物志 六

於營養無大礙也再本類植物恆於根之周圍發生根瘤(係菌類寄生)能吸收空中之遊離氮儲於土中因此凡種禾穀類均可利用本類為前作物

種名及別稱	科屬學	名品	種用	途產	地備	注
大豆即黃豆 (俗呼毛豆)	豆科 大豆屬	<i>Glycin max, Merrill.</i>	有早黃豆蠟黃豆 小黃豆油豆青豆 料豆等種別	(實)食料飼料及 製造豆汁(豆腐 漿)豆腐皮豆腐 醬油豆油豆酥豆 芽等用 (莖)燃料其灰富 鹼質可充製鹼之 原料用作肥料亦 適合 (豆粕)肥料 (根)讀根生根瘤 能吸收空中氮儲 于土中有益于農 田及後作物	各地均有栽培	芒種後播種約十月中 收穫 鄉間為經濟土地計常 有栽植于田邊或路之 兩側

蠶豆 (俗呼倭豆)	豆科 蠶豆屬	<i>Vicia Faba, L.</i>	有牛蹄扁與本地 豆兩種前者較大 而性硬味劣後者 較小而性柔味美	(實)食料飼料及 造醬油芽豆等用 (莖及葉)與大豆 莖之用途同	各地皆有栽培為 稻田之冬作物或 地作物	舊以本種成熟見倭 寇故俗呼倭豆除吾 外皆稱蠶豆以成熟在 青蠶節內也
豌豆 (俗呼蠶豆)	豆科 豌豆屬	<i>Pisum sativum, L.</i>	有白赤兩種白者 亦稱羅漢豆	(實)食用或製豆 酥 (莖)飼料肥料 (葉)初生之嫩葉 (即豆苗)作饌味 甚美	各地均種植之為 稻田之前作物極 宜	豌豆易罹癘病每年 宜易地而種
扁豆 (俗呼沿色豆 或布日豆)	豆科 扁豆屬	<i>Dolichos Lablab, L.</i>	有赤白二種	(實)嫩時連莢作 饌 (莖及葉)充飼料 及肥料	種于籬邊故名沿 色豆	鵲豆亦係本種之別名
菜豆 即梅豆 (或稱蠶豆)	豆科 菜豆屬	<i>Phaseolus vulgaris, L.</i>		(實)連莢作饌 (莖葉)飼料肥料	種于平地	黃梅前後結實故有梅 豆之名
豇豆 即帶豆 (俗呼蠶豆)	豆科 豇豆屬	<i>Dolichos sesquipedalis, L.</i>	分赤白黑三種內 有烏豇豆白玉豇 豆綠豇豆秋豇豆七 月豇等名稱	(實)嫩時連莢作 饌成熟後去莢作 豆泥供糕粿等用 豆泥亦稱豆沙	各地均有種植近 山尤多	此豆種植于塘畔廢地 間最宜蔓性宜編籬笆 或植竹竿以供攀援

鄞縣通志

博物志

七

小豆 綠豆赤 豆之總名	豆科 菜豆屬	<i>Phaseolus radiatus, L.</i>	有赤豆綠豆兩種	(實)綠豆可和米 煮粥及製豆糕豆 芽磨粉可作饌粉 (即粉乾)粉皮等 之食品赤豆可製 豆沙與糖拌和可 為各種餡食之餡 亦可和米煮粥以 供常食	地作物	
刀豆	豆科 刀豆屬	<i>Canavalia ensiformis, D.C.</i>	有紅花與白花兩 種	(實)嫩時連莢供 食用	栽種者極少	舊志稱刀鞘豆
落花生 (或稱長生果)	豆科 落花生 屬	<i>Arachis hypogaea, L.</i>	有大粒種(洋生) 與小粒種(土生) 兩種	種子供食用及榨 油油亦食用並燃 燈用其渣粕供飼 料及肥料	地作物	一年生蔓性草本

三、根菜類 凡利用地下部分(根或莖)以供食用而栽培者均列入本類本類植物科屬互異非若一二兩種之同屬一科然其共通之性質均係所需地下部分欲期地下部分之發達土質務須鬆軟故宜時行

耕勸保持其鬆軟之程度此外尤須施肥料方能增加其產量因此本類有施肥植物或中耕植物等名稱

種名及別稱	科屬	學名	名品	種用	途產	地備	注
甘藷 (或稱番薯)	旋花科 甘藷屬	<i>Ipomea batatas</i> , Lam.	有紅白兩種	(塊根)可蒸食 食又可生食及飼 絲和米煮飯山民 用以補充糧食之 不足此外可供飼 料及製造澱粉燒 酒等用 (莖及葉)飼料	各地均有栽培山 地尤合	蕃殖用塊根剪成苗 待新莖長成剪插	
馬鈴薯 (俗呼洋芋 或洋番薯)	茄科 馬鈴薯屬	<i>Solanum tuberosum</i> , L.		(塊莖)供人之副 食及家畜之飼料 外尚可製造澱粉 及釀造酒精等用 但本縣僅供蔬菜	鄭本無是種近由 外埠輸入種者極 多		
芋 (俗呼芋艿)	天南星科 芋屬	<i>Colocasia antiquorum</i> , Schott.	有水芋旱芋二種 又有烏脚雞黃干 香芋芋青干紅頂 芋等種別	(根莖)食用 (葉莖)可供飼料 鹽醃或乾曬可常 備儲食用	旱芋各地均有種 植水芋較少	蕃殖用發育完全之子 芋	

鄭縣通志

博物志

八

蘿蔔 即萊菔 (或稱蘆菔)	十字花科 萊菔屬	<i>Rhaphanus Sativus</i> , L.	有圓長兩種走馬 塘附近尚有夏生 蘿蔔一種	(根)食用生食醃 藏均佳 (葉)飼料醃食亦 可	各地皆產以東錢 湖相近橫街一帶 產出者為佳種	輕鬆之沙質壤土最為 適宜	
蕪菁 (俗呼大頭菜 舊志稱蔓菁)	十字花科 蕪菁屬	<i>Brassica campestris</i> , L.		用途同蘿蔔	栽培區域較萊菔 少因販賣便利故 城區附近及東錢 湖一帶多栽培之		
胡蘿蔔 (俗呼紅蘿蔔)	繖形科 胡蘿蔔屬	<i>Daucus Carota</i> , L.		(根)食料飼料 (葉)飼料	本種由外埠輸入 種者極少		
薯蕷 即野山 藥	薯蕷科 薯蕷屬	<i>Dioscorea Japonica</i> , Thunb.		(根)食用又可製 造澱粉(俗稱山 藥泥)	野生者居多山民 偶有栽植者		
菊芋	菊科 菊芋屬	<i>Helianthus tuberosus</i> , Lin.		(根)食用藥用	本縣均係野生		
黃獨 即土芋	薯蕷科 薯蕷屬	<i>Dioscorea sativa</i> , L.		(根)食用藥用	同薯蕷		

牛蒡	菊科 牛蒡屬	Arctium Lappa, L.	(根)食用藥用	本縣均為野生無栽培者
蒟蒻 (舊志稱藕)	天南星科 蒟蒻屬	Hydrosme Rivieri, Engl.	地下肥大球部供食用或製為粉末可作極佳之糊料	隱隱地野生
蕨 (又名蕨)	水龍骨科 蕨屬	Pteridium aquilinum. Kuhn.	(地下莖)可製造澱粉(即山粉)供食用及糊料搗碎後又可作繩索(葉)嫩者可作饌	
藕、蓮、荷 (舊志作荷)	睡蓮科 蓮屬	Nelumbo nucifera. Gaertn.	有紅花白花兩種(地下莖即藕)供食用及製造澱粉(即藕粉)	各地池塘栽培 藉地下莖蕃殖
葛	豆科 葛屬	Pueraria Thunbergiana. Benth	(根)自根採取之澱粉可供食用及糊料(莖)作纖維料用	山野自生 藤本
慈姑	澤瀉科 慈姑屬	Sagittaria, sagittifolia, L.	青白兩種(地下莖)食用藥用	溼地野生間有栽培于水田淺塘等處者
百合 (俗稱喇叭花)	百合科 百合屬	Lilium sp.	有花百合食用百合白百合紅百合及卷丹山丹等種別	山野自生宿根草本間有栽培供觀賞及食用者
荸薺 即烏芋 (俗呼地栗)	莎草科 烏芋屬	Heleocharis plantaginea, R. Br.	(地下莖)供食用及製造澱粉	栽培水田 藉地下莖蕃殖
草石薺 (俗呼螺螄菜)	唇形科 草石薺屬	Stachys sieboldi, Miq.	(地下莖)連球狀供食用醬漬最佳	野生間有栽培于田園者

鄞縣通志

博物志

四、葉菜類(附地上莖) 本類植物多以莖葉為主要食用部分含葉綠素富維他命民間日常作饌不可或缺縣境以內栽培甚為普遍多人糞尿豆餅等氮素肥料本類植物大部屬十字花科多為一二年生草本依根出葉大都藉種子蕃殖

種名及別稱	科	屬	學名	品名	種用	途	產	地	備	注
蕓薹 即胡菜 (俗稱油菜)	十字花科	蕓薹屬	Brassica campestris, L.		(葉)食用 (種子)榨油供食		栽培于田園冬作		越年生草本用種子蕃殖	

苤菜 雪裏蕻 雜菜皆屬之	十字花科 蕪菁屬	Brassica sinensis, L. var.	有白菜青菜小白 菜黃矮菜(即黃 芽菜)等種別	(葉)食用及醃藏 (油粕)飼料肥料	各地均有栽培以 城區附近及東錢 湖一帶栽培最多	一二年生草本由種子 繁殖
莧菜	莧科 莧屬	Amarantus mangostanus, L.	有普通芥菜九頭 芥及雪裏蕻等種 別雜菜亦係本種 之一變種	(葉)食用兼作鹽 (實)研末調味用 (莖)羹食及醃漬 均可	農田栽培	醃漬雪裏蕻(俗稱鹹 蕻)為本縣大宗出產 之一
芹菜 (水芹)	繖形科 水芹屬	Oenanthe stolonifera, D.C.	青紅兩種青者稱 打莧又刺莧野生	(嫩莖及葉)均供 食用	園地栽培	一年生草本由種子繁殖
茼蒿 (俗稱蒿菜)	菊科 茼蒿屬	Chrysanthemum coronarium, L.		(莖葉)均可作饌 (莖葉)食用	園地栽培	一二年生草本
筍 即竹之地 下莖	禾本科 苦竹屬	Phyllostachys sp.	品種甚多可供食 用者為毛竹烏竹 黃秆竹龍鬚竹金 筍淡竹筍及以上 各種之地下莖鞭 筍等	鮮食醃食均可	山地栽培	籍地下莖為之繁殖詳 見森林植物竹下

鄞縣通志

博物志

一〇

菠薐菜	蕪菁科 菠薐菜屬	Spinacia oleracea, L.	葉連根食用	農田副作物	由種子繁殖
蔣即菰 (俗呼茭白)	禾本科 菰屬	Zizania aquatica, L.	(莖)作饌野生者 莖細亦可食	栽培于水田邊或 池塘中	用舊根分植
薤菜 (俗稱空心菜)	旋花科 甘藷屬	Ipomoea aquatica, Forsk.	(嫩莖及葉)均供 食用	園地栽培	一年生蔓性草本
薇	薇科 薇屬	Osmunda regalis var. Japonica, Milde.	(嫩葉)供食用	自生于山野阜溼 地	多年生草本
若蓴 即蓴菜 (俗呼女菜)	蕪菁科 蓴菜屬	Beta vulgaris, L. var. cicla.	(葉)食用	園地栽培	一二年生草本種子繁殖 俗謂甜
蓴 (字亦作純)	睡蓮科 蓴屬	Brasenia purpurea, Casp.	(嫩葉)食用		多年生池沼自生草本
萵苣	菊科 萵苣屬	Lactuca sativa, L.	(嫩莖)食用 (葉)飼料	園地栽培	一二年生草本

薺	十字花科 薺屬	<i>Capsella Bursa</i> <i>pastoris</i> , Moench.	(葉)食用	野生隨地有之亦 有播于沙地者	可為棉地副作物
馬蘭	菊科 翠菊屬	<i>Aster</i> <i>trinervius</i> Roxb. var. <i>genuinus</i> . Max.	(莖葉)食用	山野自生	多年生草本
艾 (俗呼艾青)	菊科 艾蒿屬	<i>Artemisia</i> <i>vulgaris</i> , L.	以紫莖而葉背有 白毛者為佳通常 之調味及著色用 味苦	山野自生	多年生草本
鼠麴草	菊科 鼠麴草屬	<i>Gnaphalium</i> <i>multiceps</i> , Wall.	同艾	同艾	同艾

五、瓜類 本類植物縣境內多栽培之供饌生食及作副糧之用依植物分類學言則大部分係屬葫蘆科一年生草本夏季栽培蔓性草本志因分類便利計茄與菱雖屬異科以其供食之部分相似故亦列入本類栽培本類植物之土質以輕鬆而排水良好者為宜葫蘆科植物其花除少數為白色外餘多為黃色單性雌雄同株異花蓋係蟲媒果實成熟後特別發達此部份即供食用者果實內含種子甚夥蕃殖惟此是賴本縣以東吳少白一帶產額最富品質亦佳

鄞縣通志

博物志

二

種名及別稱	科屬	學名	名品	種用	途產	地備	注
胡瓜 (又名黃瓜)	葫蘆科 胡瓜屬	<i>Cucumis</i> <i>sativus</i> , L.		(果實)可生食或 鹽醋為蔬或出其 瓢藏肉屑煮之	園圃栽培		按胡瓜因避石勒諱改 為黃瓜與月令王瓜異
甜瓜	葫蘆科 胡瓜屬	<i>Cucumis melo</i> , L.	有水晶瓜與黃金 瓜二種黃金瓜亦 曰洋瓜	(果實)生食	同右		
越瓜 即栳瓜 (或稱瓠瓜)	葫蘆科 胡瓜屬	<i>Cucumis melo</i> , L. var.		(果實)生食或醬 漬均可	同右		
南瓜 (或稱飯瓜)	葫蘆科 南瓜屬	<i>Cucurbita</i> <i>maxima</i> , Duch.	有長圓兩種	(果實)煮食 (種子)炒食	同右		
西瓜	葫蘆科 西瓜屬	<i>Citrullus</i> <i>vulgaris</i> , Schrad.	有紅心黃心及本 地瓜馬鈴瓜等種	(果實)生食 (果皮)鹽漬或風 乾藥用 (種子)食用	園圃栽培以少白 產為佳		

冬瓜	葫蘆科 冬瓜屬	<i>Benincasa cerifera, Savi.</i>	(果實)供饌或用 鹽漬糖浸可久藏 (種子)藥用			按葫蘆屬之習見者有 三種果實兩端大而中 細者曰壺蘆細長者曰 瓠即詩所謂樛櫨瓠葉 及齒如瓠犀也扁圓者 曰瓠即詩所謂瓠有苦 葉也
扁蒲 即葫蘆	葫蘆科 葫蘆屬	<i>Lagenaria vulgaris, Ser.</i>	分瓠 夜開花(瓠) 壺蘆三種 (瓠實)老時乾之 剖而為二可以貯 水 (瓠實)煮食	植園園中		
絲瓜 (俗呼天蘿)	葫蘆科 絲瓜屬	<i>Lufia cylindrica, Roem.</i>	(果實)嫩時供食 老時瓢內生纖維 是謂天蘿絮又稱 絲瓜絲供藥用及 工料	園圃栽培		
苦瓜	葫蘆科 苦瓜屬	<i>Momordica charantia, L.</i>	(果實)味苦不可 食惟種子附近之 果肉味甜有生食 之者	同右		
茄	茄科 茄屬	<i>Solanum melongena, L.</i>	有圓筒形與卵形 兩種 (果實)煮食或醃 食或風乾而醃之 稱為茄醬	同右		
菱	菱科 菱屬	<i>Trapa bispinosa, Roxb.</i>	有青菱紅菱兩種 (果實)生食或供 饌用	池塘野生栽培甚 少		

鄞縣通志

博物志

六、香辛料類 本類植物富刺激性食之使人興奮民間作饌恆稍
用之以助長滋味又有供釀酒及香料用者

種名或別稱	科	屬	學名	品	種用	用途	產地	備	注
薑 (或稱老姜)	薑荷科 薑荷屬	<i>Zingiber officinale, Rosc.</i>			(根莖)調羹及藥 用嫩時切片和紫 蘇謂之紅薑	園圃栽培			
蓼即辣蓼	蓼科 蓼屬	<i>Polygonum sp.</i>		有青莖紅莖之別 釀酒恆用紅莖	(葉)乾之研末和 米粉作白藥又和 麥作麴皆可為釀 酒之料	野生池旁或溪邊			
胡椒	胡椒科 胡椒屬	<i>Piper nigrum, L.</i>			(種子)調羹及藥 用	山野自生			蔓性植物
小茴香 即蘘 (俗稱藳香)	繖形科 茴香屬	<i>Foeniculum officinale, All.</i>			(種子)調味及藥 用	園圃栽培			一年生草本

蕃椒 即辣茄	茄科	Capsicum longun, L.	有青紅圓長等種	(實)調味用	同右	
薤 即薤子	百合科	Allium bakeri, Regel.		(地下莖)調味用或鹽漬作饌	同右	俗誤作蒜頭
蔥 (一名扎)	百合科	Allium ascalonicum, L.	變種甚多	(莖)調味用下部白色者亦入藥	同右	多年生草本
蒜 (俗呼大蒜)	百合科	Allium scorodoprasum, L.	有山蒜澤蒜石蒜三種皆野生形較小稱小蒜其圃地培植者即此三種人工化之變種形較大故稱大蒜	(莖莖及葉)作饌用亦入藥	同右	本多年生草本農家以鱗莖分析繁殖于田園每年更植一次則無異一年生矣
韭	百合科	Allium odorum, L.	又有韭牙者則以人工覺化而成作饌味香美	(莖葉)作饌用(種子)入藥	同右	多年生草本

七、果類 果物爲日常需要食物之一於生理上有助消化之功栽培之土壤以沙質壤土爲佳施用肥料幼樹(即生長期)以氮素肥料(若人糞尿豆粕等)爲主壯樹(結果期)應補以磷質及鉀質(若骨粉骨炭等)性肥料然均以不過量爲要通常若牛泥豬泥(即廐肥)等亦多用之均須依果樹之年齡氣節及其他環境而增減其施量方可得良好之效果

鄞縣通志

博物志

一三

種名或別稱	科	屬	學	名	品	種	用	途	產	地	備	注
梨	薔薇科	梨屬	Pyrus sinensis, Lindl.	縣產以沙梨爲夥野生亦有之	(果實)食用又可黃膠爲止咳劑				山野自生或栽培		亦爲觀賞用植物	
桃	薔薇科	櫻桃屬	Prunus persica, S. et Z. var.	水蜜桃盤桃油桃毛桃夏白桃	(果實)生食(花)觀賞用				田園栽培間有野生者		南鄉橫溪一帶產最多核內之仁亦可食	
杏	薔薇科	櫻桃屬	Prunus Armeniaca, L. var. Ansu, Maxim.	有甜杏苦杏之別仁入藥者係苦杏	果實生食其仁入藥亦可食(花)觀賞用				園地栽培		產量不多	
梅	薔薇科	櫻桃屬	Prunus mume, S. et Z.		(果實)生食或糖醃爲青梅或糖漬爲梅醬				同右山野間亦有自生者		產量較多于杏	
櫻桃	薔薇科	櫻桃屬	Prunus pseudocerasus, Lindl. var. spontanea, Maxim.		(果實)生食(花)觀賞用				同右無野生者		產量不多核可治小兒瘡疹	

李	薔薇科 櫻桃屬	<i>Prunus communis</i> , Huds.	(果實)生食 (花)觀賞用	同右	產量次于梅
郁李	薔薇科 櫻桃屬	<i>Prunus japonica</i> , Thunb.	多為觀賞而栽植 果亦可食		
枇杷	薔薇科 枇杷屬	<i>Eriobotrya japonica</i> , Lindl.	(果實)食用 (葉花)藥用	園地栽培	產量尚多
山楂	薔薇科 山楂屬	<i>Mespilus cuneata</i> , Koch.	(果實)食用	野生	
橘	芸香科 柑屬	<i>Citrus nobilis</i> , Lour.	有厚皮薄皮黃蘗 橘等種	山地或園圃栽培	產量不多
金橘 即金柑	芸香科 柑屬	<i>Citrus Aurantium</i> , L.	曰金彈者種最良	山地栽培	產量不多
柚	芸香科 柑屬	<i>Citrus Aurantium</i> , L. var.	僅香柚一種	庭園栽培	
楊梅	楊梅科 楊梅屬	<i>Myrica carolinensis</i> , Mill.	分紫白二種紫者 以慈路亭薔種最 佳近亦有移植者	山地栽培野生者 味較劣	鄭南蟠松一帶多產之

鄭縣通志

博物志

石榴 (俗呼金龍)	石榴科 石榴屬	<i>Punica Granatum</i> , L.	(果實)食用	栽植于庭園	
柿	柿樹科 柿樹屬	<i>Diospyros Kaki</i> , L. F.	(果實)食用	多山野自生栽培者少	
葡萄	葡萄科 葡萄屬	<i>Vitis vinifera</i> , L.	(果實)食用	栽植庭園	
栗	殼斗科 栗屬	<i>Castanea vulgaris</i> , Lam.	有板栗茅栗錐栗等種別	山野自生栽培者少	錐栗俗誤為子栗形小圓而尖首者是
榧	紅豆杉科 紅豆杉屬	<i>Torreya nucifera</i> , S. et Z.	(種子)食用或榨油	同右	
杜松	松柏科 松屬	<i>Juniperus communis</i> , L.	(種子)食用 (木材)建築用	同右	
銀杏 即白果 (又稱公孫樹)	銀杏科 銀杏屬	<i>Ginkgo biloba</i> , L.	(種子)仁供食用 (木材)建築及雕刻材料	野生或栽培庭園	

八、飼料類 凡可供家畜家禽家蟲(蠶)等之飼料者均列入本類

種名或別稱	科屬	學名	名品	種用	途產	地備	注
狗尾草	禾本科 狗尾草屬	<i>Setaria viridis</i> , Beauv.		畜類飼料	隨地野生	宿根草本	
苜蓿 (俗稱黃花草仔)	豆科 苜蓿屬	<i>Medicago denticulata</i> , Willd.		畜類之飼料嫩時亦可供饌及農田之肥料等用	冬作物咸祥大嵩一帶水田內多栽培之	越年生草本 冬作物主旨在肥料是 項肥料稱青肥或綠肥	
紫雲英 (俗稱片花)	豆科 紫雲英屬	<i>Astragalus sinicus</i> , L.		飼料肥料食用味 遜苜蓿	稻田之冬作物	同右	
野豌豆	豆科 山豌豆屬	<i>Lathyrus maritimus</i> , Bigel. var. <i>Thunbergianus</i> , Miq.		飼料(豬牛羊)	沙地自生	一年生草本	
馬齒莧 (俗稱瓜子菜)	馬齒莧科 馬齒莧屬	<i>Portulaca oleracea</i> , L.		豬之飼料(熟食)	田野自生	一年生草本	
魚腥草 (一日義菜)	三白草科 蕺菜屬	<i>Houttuynia cordata</i> , Thunb.		豬之飼料(熟食)	自生于野塘麥隴間	俗于五日五日采魚腥草及舊蒲煎湯飲謂可拔除瘡毒及疫癘	

鄞縣通志

博物志

一五

大巢菜	豆科 蠶豆屬	<i>Vicia angustifolia</i> , Benth.	實紫雲英之別種	畜類之飼料 救荒	自生于田野	秋日生苗	
小巢菜	豆科 蠶豆屬	<i>Vicia hirsuta</i> , Koch.	形同大巢而較小	同右	山野自生	蔓性越年生草本	
桑	桑科 桑屬	<i>Morus alba</i> , L.	有普通桑接桑等種接桑以潮桑移接者爲佳山地中又有條桑一種摘葉不剪條半齡愈高出量愈多然本縣植者甚少	(葉)蠶之飼料及冬葉枯可飼羊又入藥 (根皮)造紙 (果實)食用及製酒 (木材)供造器具用	栽培于田園以近水地爲適野生者謂之草桑葉粗不潤滑初芽尚可飼蠶	落葉灌木或喬木此弱枝不剪枝之故天生多喬木	
奴柘 (柘又作柞)	桑科 奴柘屬	<i>Cudrania triloba</i> , Hce.		(葉)飼蠶用 (木材)薪炭用	山野自生	落葉喬木	

九、其他 食用植物之不屬上列八類者均列此

種名或別稱	科屬	學名	名品	種用	途產	地備	注
向日葵 (俗稱朝日頭花)	菊科 向日葵屬	<i>Helianthus annuus</i> , L.		(種子)食用	田園栽培	一年生草本	