

衛生家寶產科備要



宋 朱端章編

衛生家寶產科備要

人民衛生出版社影印

衛生家寶產科備要

開本：850×1168/32

印張：3½

宋朱端章編

人民衛生出版社影印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

·北京崇文區旗子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書號：14048·0934

1956年10月第1版—第1次印刷

定 價： 0·48 元

(北京版) 印數： 1—7,000

內容簡介

本書是宋、朱端章所編，書成於宋、淳熙十一年（公元一一八四年）。今据作者原刊南康郡齋本影印，实为我国产科学上一部珍貴的文献。

全書共分八卷，集有宋以前有关产科的各家論著，並忠实地标明引用資料的來源，其中重要的有晉、「肘后方」，隋、「諸病源候論」，以及唐宋名著如「千金」、「外台」、「惠聖方」、「聖濟總錄」等；至於产科專書，則引用更多，如「產育寶慶集」、「备产济用方」等名著，几乎全部收录於本書之內；此外有关兒科方面的專書，如「万全小兒集驗方」、「小兒納証直訣」等，也多摘要录入。因此本書內容不但包括妊娠、临产、产后等問題，还附有新生兒的护理和治疗方法，由於本書是各家學說的彙集，故可称为我国宋以前有关产科医疗的一种經驗綜合，是目前中西医学習和研究祖国医学产科成就的重要参考書。同时又因本書引列的資料，有的原書已不易看到，以保存古代文献來說，也有它一定的历史意义。

衛生家寶產科方目錄

袖羅

懷胎

卷之三

雄雞湯

菊花湯

雌神湯

調中湯

卷一

產圖

入月安產圖

麥門冬湯

安中湯

體聖祖御名子借地法

阿膠湯

柴胡湯

禁草法

芍藥湯

葵子湯

禁水法

葱白湯

杏仁湯

產前將護法

丹參膏

甘草散

產後將護法

千金圓

蒸大黃圓

逐月安產藏衣并十三神行遊法

滑胎令易產方

催生符

符貼式

保生圓

當歸圓

當歸建中湯

竹茹湯

初姪娠

卷二

孫真人養胎論

保安散

神妙千金圓

徐之才逐月養胎方

論欲產并產後

琥珀散

烏雌雞湯

補胎湯

地黃圓

阿膠散

艾葉湯

黃連湯

七寶散

崔生通靈散

牡丹飲子

卷三

論

初姪娠

竹茹湯

人參散

地黃圓

阿膠散

崔生通靈散

神妙千金圓

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

單方黑神散 芳藥湯

累用經効方

定痛散 四順理中圓

大聖澤蘭散 奪命褐散子

玉露散

地榆降血飲子 大安胎飲子

卷四

二十一論并增入十八論

郭緒中附方

黑神散 蒲黃黑神散

催生并死胎方 難產方

奪命丹 勝金散

吳白木散 滑胎榆白皮方

清魂散 見現圓

妊娠煩悶胎熱方

增損四物湯 調經散

妊娠傷墜胎動方

七珍散

調中湯

橫生逆生方四道

趨痛散

麻仁圓

胎動口噤唇青方

巨勝湯

固經圓

胎動下血心腹脹方

小續命湯

大巖蜜湯

產後血暈方四道

論臨月將息

產後中風方

論新生小兒

并小兒方肆道

產科雜方

注唇膏

豆蔻散

產前傷寒方

蝎梢散

治齁喘

卷五

罩胎散

二聖散

催生如聖散 救生散

卷活散

黃金散

川芎散

枳殼湯

薑粉散

香連散

蟹瓜湯

又方

地黃散

香脂散

人參圓

血竭散

五積散

十八論中治產前產後諸疾黑

保生圓

順元散

神散功效

催生神効聖功散

又方

續添產前產後十八論烏金散功效

催生安胎救命散

又方

宣經圓

烏金散

神効催生丹

催生如聖圓

產前所忌藥物

產後諸方

又方

虞氏備產濟用方

勝金湯

又方

妊娠

入月

燒鹽法

瀆小便方

臨產

產後

又方

產後諸證用藥例

烏金散

百草霜散

黑散子

難產逆產橫產

胎衣不下

麒麟竭散

千金散

妊娠食忌

入月借地法

地黃散

牡礪散

十二月產臥藏衣吉凶圖

桃仁散

川芎散

當歸散

產前諸方

人參散 四神散

卷七

香桂散

當歸散

胎孕方

陳梅散

荆芥散

人參白朮散

千金半夏茯苓湯

難產方十二道

枳殼散

陳逍遙水酒散

橫產方六道

檳榔散

治胎動已死未死方

胎衣不下方七道

治胎動已死未死方

治產前產後痢疾方

千金蟹爪湯

又方

許學士產科方

葱白湯

白朮散

滑胎枳殼散

內補圓

治姪娠傷寒大熱胎不安方

木香圓

白朮散

治姪娠傷寒大熱令胎不落方

紫蘇飲

下死胎方

治姪娠小便卒不通方

琥珀散

佛手散

又方

愈風散

交加散

產前方

蒲黃散

護胎方

榆皮滑胎散

黑神散

又方

麻仁蘇子粥

鹿角湯

治婦人死胎下方

治難產或橫倒胎死方

治難產胎衣不下方

又方

又方

易產方

小琥珀散

下死胎方

下鬼胎方

治草蓆或產後血暈五絕中

治產後惡露不絕方

風方

治產後下痢赤白膿血方

產後方

治產後洞泄惡物方

牛膝湯

當歸建中湯

聖功川芎湯

琥珀黑神散

通宣圓

八味黑神散

烏金散

劉寄奴飲

當歸一味散

荊芥一味散

秤槌酒

豆淋紫酒

產婦忽患寒熱方

治產後傷寒惡露不行方

傷寒產後惡露爲熱搏不行

宜服抵當湯桃仁承氣湯

桂心牡礪湯

增損柴胡湯

人參散

治吹姪或兒絕姪後乳腫疼方

產後傷食宜服食藥感應圓

治吹姪腫硬方

治產後下痢赤白膿血方

追命散

通用四物湯

萬金散

卷八

形初保育

小兒初生將護法

擇乳母法

乳兒法

浴兒法

拭兒口法

斷臍法

灸臍法

裹臍法

甘草法

黃連法

豬乳法

藏衣法 剃頭法

禳謝法 初生不作聲

初生不喫奶 初生吐不止

初生有懸癰病

初生有重舌

葛氏肘後治卒重舌方

初生着噤

翰醫學秦南康里駿酒張求校勘

衛生家寶產科方目錄



衛生家寶產科備要卷第一

產圖



入月安產圖

凡產於入月一日貼在卧間內正北

壁上

凡安產藏衣方位並於卧間內分布

凡逐月安產藏衣避忌神煞方位並

隨節氣更換候交得次月節即換次

月產圖

凡產訖棄發穢污不淨之水並隨藏

衣之方所向不拘遠近棄之切忌向

閉肚之方也

體聖祖
御名子借地法

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

穢汚或有東海神王或有西海神王

招搖天狗

青龍白虎

日遊月殺

朱雀玄武

五士將軍

軒轅女妖

急如律令勒

禁草法鋪草及氈褥訖即呪曰

銅一言得之鐵母子相生俱篋鐵急

急如律令

禁水法欲產時貯水呪曰

南無三寶水

水在河中爲河水水在器中爲淨水

水在法中爲真水自知非真莫當真水
以淨持濁以正治邪

天吞地呑 隸戶閉肚

六甲禁諱 十二神王

土符伏神 各安所在

不得動靜 不得忌干

若有動靜 若有忌干

施以神呪 當攝汝形

阿法尼阿毗羅莫多梨娑地梨沙訶

產前將護法

按諸家產論云凡婦人妊娠入月不可沐頭濕冷流于足太陽之經多令

子橫逆不順誠之誠之又切忌飲酒

恐產時心神昏亂臨產之時不可令

傍人喧擾大小倉忙慮致驚動產母

極可令熟事產婆及穩審謹卓老成

親密三兩人扶侍產母初覺腹痛且

宜任意坐卧勉強飲食恐致臨產氣

力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可按節次漸服滑胎榆白皮散壹貳服

服藥之法切勿太早湏得其時又傍

人不得逼迫且湏令人扶策徐徐而

行若行步稍難即凭物而立湏臾扶

策再行直至腹痛連腰相引作陣痛

頻時即服催生丹壹服更且勉強扶

行陣痛轉甚難以行立認是產時將

至即服催生符畢然後安詳上草上

草之時切勿傷早若太早則子在腹

中難以轉側又湏子細體候直待兒

逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不

得傾斜則兒得順其理自然易產也

又有卧產者亦待卧定背平着席體

不偃曲則子不失其道苟或不能依

此節適必致產難縱或幸免必湏憂

生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產湏憂至於產後大湏將護勿以產時無他乃縱心

恣意無所不犯犯時微若秋毫感病
重於嵩岱且才得分免切忌問是男
是女看血下多少隨證服壓血運藥
良久喫粥服四順理中圓

方見卷末

便

令人從心下按至臍腹日伍染次若
有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻
服餌且閉目而坐背後倚物左右看
承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚
覺過一伏時方得上床亦須立膝高
櫈床頭厚鋪裯褥遮圍四向空塞孔
隙以禦賊風一臍之內常聞醋煙以
防運悶一臍之後漸加滋味或以羊
肉及雌鷄煮取濃汁作糜粥直至百
晬常服當歸圓當歸建中湯四順理
中圓日各壹兩服以養藏氣補血脉
兩臍之後方得食糜爛肉食滿月之
內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜
怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及

始得氣血和調腑臟平復設不依此
即致產後餘疾

逐月安產藏衣并十三神行遊法


東


大軒時池天壘狗陰
小寅時轍公招福
辰巳時轍時轍
吳咸時池天壘


北

壬子正午丙寅
癸丑正午丁未
甲子正午乙未
乙丑正午丙午
丙寅正午丁未
丁卯正午戊未
戊辰正午己未
己巳正午庚未
庚午正午辛未
辛未正午壬未
壬申正午癸未
癸酉正午甲未

南







胎阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成

胎或受妊不能固養痿燥不長過年不

產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨

產節適乖宜驚動太早產時未至惡露

先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛

極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷

口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運

悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疼

痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面

黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞

入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易

產產後常服滋養血氣和調陰陽益腰

理實腑臟治風虛除痼冷

甘草

赤蜜微炮剉

乾薑

去皮火炮剉

桂

不見火去根

石斛

去根

粳米

大豆黃卷各壹分

當歸半兩去薑頭酒浸壹宿剉碎微炒

麻子仁壹兩

右拾貳味爲末煉蜜爲圓如彈子大每服壹圓溫酒或棗湯化下嚼亦得

空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒

積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸去薑頭酒浸壹宿剉碎微炒

乾薑洗剉碎微炒

甘草微炙去精

阿膠剉碎蛤粉炒令泡起鍋去蛤粉用

續斷根洗去

白芷剉去粗皮

附子炮去皮鹽烈去

白芍藥各貳兩