

談談子宮出血

TANTAN ZIGONG CHUXUE

胡乐业 編著

上海衛生出版社

內 容 提 要

子宮出血的原因是多种多样的。除了月經是正常的子宮出血以外,它的发生,不管在成熟期、生育期或經絕期,都是不正常的,給妇女带来了或多或少的痛苦和危險。虽然它的原因复杂,但是本書却能用淺出深入的笔法,写出引起子宮出血的各种疾病,并对这些病的及时診斷、正确处理,也作了扼要的介紹。因此,可以作为中級医务干部临床实用上的一本参考書;也可为广大妇女或病員对各种子宮出血的原因有一概念,以便早期发现,及时治疗。

談 談 子 宮 出 血

胡乐业 編著

*

上海 衛生出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市書刊出版业营业許可証出 080 号

上海新华印刷厂印刷 新华書店上海发行所总經售

*

开本 787×1092 1/32 印張 1 9/16 字数 35,000

1958年8月第1版 1958年8月第1次印刷

印數 1—10,000

統一書号 T14120·466

定价(5) 0.12 元

目 次

一、子宫出血的一般介紹	1
1. 什么是“子宫”？	1
2. 什么是“出血”？	3
3. 什么是“子宫出血”？	3
(一)生理性的子宫出血——月經	4
(二)病理性的子宫出血	6
二、哪些疾病可以引起子宫出血？	8
1. 全身性疾病	8
2. 妇女生殖器官的腫瘤	10
(一)良性的子宫腫瘤	11
(1)息肉 (2)肌瘤 (3)肌腺病	
(二)恶性的子宫腫瘤	13
(1)子宫頸癌 (2)子宫体癌 (3)子宫的其他 恶性腫瘤	
3. 生殖器官的炎症	16
(一)子宫炎	17
(二)子宫內膜炎	17
(三)子宫附件炎	19
4. 妊娠的并发症	19
(一)流产	19
(二)子宫外孕	22
(三)葡萄胎	23
(四)絨毛膜上皮癌	24
(五)前置胎盤	25

(六)胎盤早期剝離.....	27
(七)子宮破裂.....	28
(八)產後出血.....	29
5. 功能性子宮出血.....	30
6. 其他的疾病.....	30
三、怎樣診斷引起子宮出血的疾病?.....	31
1. 我們為什麼要了解“診斷”?.....	31
2. 診斷有什麼作用?.....	31
3. 醫師進行診斷, 根據哪些東西?.....	31
4. 怎樣得到引起子宮出血疾病的正確診斷?.....	33
(一)從子宮出血的各種情況來進行診斷.....	33
(二)各種引起子宮出血疾病的特殊診斷.....	34
四、如遇子宮出血, 應該怎麼辦?.....	39
1. 我們應該怎樣看待子宮出血?.....	39
2. 醫師怎樣處理引起子宮出血的疾病?.....	41

一、子宫出血的一般介绍

当我们了解“什么是子宫出血”这个问题以前，首先必须弄清楚什么是“子宫”？子宫是什么形状？什么构造？它在妇女身体里面的位置怎样？它有什么功用？其次，也需要知道什么是“出血”？血液在人体里面主要有些什么作用？各种不同程度的出血会引起怎样的后果？现在我们先按步就班的来谈谈：

1. 什么是“子宫”？

子宫是妇女生殖系统中最重要的器官之一。它和输卵管、卵巢合称为“内生殖器官”；因为它们都是隐藏在骨盆里面的，说得更通俗些，也就是隐藏在肚子里面的。至于在外面可以看到的部分，如大阴唇、小阴唇和阴蒂等器官，就叫做“外生殖器官”。

子宫的形状很象一个没有柄的梨。长约7.5厘米，尖端向下（稍偏后），叫做子宫颈，它的一部分伸入阴道的顶部，有一个开口和阴道相通；底部向上（稍偏前），叫做子宫底；输卵管就是开口在它上方的左右两边，经过输卵管，子宫又和腹腔相通，这是和男人两样的。子宫颈和子宫底中间的部分就叫做子宫体，它的位置是在骨盆中央，稍微倾向前方，但也可以随着周围的压力而有些改变（图1,2）。

子宫是由三层组织构成的：最外面的一层是浆膜层，叫做“子宫外膜”；最里面的一层是粘膜，叫做“子宫内膜”，里面有一种分泌腺，叫做“子宫腺”；这两层中间是一层较厚的肌肉，叫做“子宫肌层”。

子宫有些什么功用，我们从“子宫”这一个名词上也不难




图1 妇女生殖器官的縱切面

因为人体的絕大多数器官都是隐藏在体内的，还有很多疾病的病理变化都是发生在器官的内部；所以只有用解剖的方法，把由手术切除的或尸体上的有关器官，用刀剖切开来，才能清晰的看到。我們所采用的，絕大多数是从人体鼻子的中綫，由前到后切开的繪图，好比切一只梨子从梨柄的垂直方向一刀切下去，那么里面的切面，便叫做縱切面。




图2 子宫和它的附屬器官

子宫、阴道及整个图的左面部分，都是从左到右的垂直切面；右面的輸卵管和卵巢沒有切开。

了解，它是胎兒生長發育和居住的地方，它完全是為着下一代服務的，如：子宮內膜有周期性的變化，每個月排出月經；接受并種植和精蟲結合了的卵子；供給胎兒的營養，保護胎兒；當分娩的時候，由於子宮肌層的收縮而娩出胎兒，以及在妊娠時，胎盤供給母親各種重要的內分泌素等等。

2. 什麼是“出血”？

血液是在我們身體里面循環着的一種極端重要的液體，它和人體的任何一部分都有着密切的關係，同時因為它里面含有細胞——血球和各種細胞要素，所以它是全身各個器官活動的主要源泉。如果沒有它，各個器官就會坏死，如果缺少它，人體也無法維持正常生理的功能；因此，血液是我們保持生命必不可少的東西。

血液雖然在我們身體里面每一個地方都有，但並不是象洪水一樣到處泛濫，它只是很有秩序的在血管里運行，如果流出了血管，就叫做“出血”。在婦女除了周期性的月經以外，任何組織的出血，都是不正常的現象，也就是一種病理的現象。我們通常可以按照出血的快慢和多少，將出血分為“急性出血”和“慢性出血”兩種。如果在較短的時間里流出很多的血，就叫做“急性出血”。如在繼續不斷地小量出血的，就叫做“慢性出血”。出血程度較輕的，就按比例產生貧血的現象；程度嚴重的，如不及時救治，就有致命的危險。出血的多少和快慢，對人的生命與健康都有很大的影響；因此，不管它是哪一種出血，都應該引起我們的警惕。

3. 什麼是“子宮出血”？

一般地說，婦女生殖器官出血的疾病，依照它們的位置可以分做三大類：第一大類是外陰部出血，第二大類是子宮出

血，第三大类是腹腔出血，也就是肚子里面出血。子宫出血在这三大类里面要占着很大的一部分；同时，它的表现也是多种多样。由于它，丰富了妇产科学的内容；但也由于它，给妇产科医生带来了不少的难题；当然，更是由于它，给妇女们在生命过程中增添了许多的痛苦和危险。象上述这样的分类，只能作为我们叙述的方便，而在实际上或者在临床上，我们不可能立刻从阴部流血这一现象，一下子便作出正确的诊断，并根据这个诊断，把它们适当地归在哪一个大类里头。

女性的一生，按照正常的生长发育的过程，可以分做五个时期。就是：儿童期，成熟期，生育期，经绝期和老年期。从出生到月经开始是儿童期。月经开始时期，约在十三到十五岁这个阶段是成熟期，又叫“青春发育期”。成熟期以后一直到月经停止，这一段时期里如果结婚，便可以生育子女，因此叫做生育期。再后月经停止的时期叫做经绝期，约在四十九岁左右。接着，一切生殖器官都逐渐衰退，从此便进入老年期。

特别是在当中的这三个时期里，如果子宫发生了除月经以外的出血，都是不正常的，叫做“异常出血”；这都表示生殖器官有了毛病，也就是说生殖器官的异常出血，是生殖器官疾病或者生殖器官不正常的一种重要症状。因为它已经给我们下了警告，如果再不引起我们的注意，那就会产生严重的后果。

在进一步地了解子宫的异常出血以前；我们有必要先了解一下所谓生理性的子宫出血：

(一)生理性的子宫出血

月经：月经是一种周期性的(约四星期左右一次)、任何健康状况正常的妇女所必有的生理现象。它虽然也是一种子宫出血，但我们不能把它放在我们以下要讨论的病理性子宫出血的范围以内，而称它为子宫出血，却是按照它一月左右发

生一次出血的特点，称它为月經。同时由于它的发生是有周期性的，所以又称为“月經周期”。

其实，月經所代表的意义还远不止于一个月一次的“子宫出血”，它实际上说明了子宫除去妊娠及授乳期以外的整个变化；也就是说，在子宫出血前前后后，子宫还有其他的变化。至于子宫的附属器官如卵巢的变化，也是这样。这种变化的意义，前面也曾提到过，就是准备迎接“受孕”的来临。可是如果没有受孕，那么在下个月又重新有月經出现。如果受了孕，子宫的这种每月一次的周期性变化——月經周期，便停止下来，于是生殖器官转向培育胎儿的方面发展，也就是进入了妊娠期。

月經周期，通常講是每月一次，比較正确的講全期約 28 天，但也要有多到 35 天或少到 25 天，这仍屬正常的。所謂“周期”，就说明了这是周而复始、循环不息的；但为了叙述的方便，我們不妨將发生月經的第一天算是月經周期的第一天，將下个月发生月經的前一天，算是月經周期的最后一天，整个周期就暫定为 28 天。

由于子宮內膜变化的不同，一般可以把月經周期再分成三个时期：

(1) 增生期：这一时期里，卵巢內的卵泡正是成熟期間，子宮內膜不断的加厚，內膜里的腺体——子宮腺，也不断的变長。这一期的時間約有七天到十天，也就是所謂的排卵前期。

(2) 分泌期：卵巢排卵以后，子宮內膜的腺体变大，最后便发生扭曲，組織也变得疏松、充血及水腫，并且开始分泌分泌物。到了这期末了的时候，子宮內膜的厚度可以达到 6 毫米。这样的子宮內膜好象滋潤的土壤一样，也就非常适宜于受精后的卵子的种植了。这一期的時間約有 (12—14) 天，也就是所謂的排卵后期。

(3)月經期：如果卵子沒有得到受精和種植，于是便開始了月經期，約四到五天。這時子宮內膜發生出血，并坏死脫落，隨同血液一起流出子宮，經過陰道而流出體外。這就是“月經”。每次行經期間的出血量約十到一百毫升。

子宮內膜為什麼會有這些變化呢？主要的是因為人們的大腦底部有一個叫“腦垂體”的小腺體（它又分前葉和后葉兩部分，和子宮內膜發生關係的主要是它的前葉），它和卵巢產生好幾種內分泌素（一般習慣上稱做“荷爾蒙”），對子宮內膜發生作用的原故。這好象是我們用的無線電收音機的收音，腦垂體和卵巢好比廣播電台，中間通過電波（內分泌素）的作用，我們的收音機才可以收到電台所播送的節目。這從一些偶然的事實和動物試驗中都可以得到証實。如有的婦女因了兩側的卵巢生病，不得不施行手術把它們割去，雖然子宮沒有病也沒有割掉，但是月經沒有了。同樣，如果將試驗動物的腦垂體前葉割去，結果也沒有了月經。這已經用不着再多加說明，因為沒有了廣播節目的電台，收音機怎麼會收到什麼“廣播節目”呢？現在接着就可以來談談我們所需要進一步了解的主題。

(二)病理性的子宮出血

我們既然懂得了生理性子宮出血——月經的大概情況；那麼月經的異常，主要的指月經過多以及月經中間期的出血，那就是病理性的子宮出血。怎樣的情況才是月經過多呢？象在月經期中，出血量比過去的顯著增多，或者月經期比過去的顯著延長，這實際上也就是月經期中的出血量增多了，這些情況，我們便不能認為它是正常的，也就不能再稱它為“月經”，而需要實事求是地稱它為子宮出血。當然，有些婦女的月經周期本來就很亂，我們無法看出月經期的出血量是不是增多或者月經期是不是延長，在這種情況下，那就不必考究這些問

而要注意追查的是出血的原因和真正疾病的所在。因为这两种看起来不大相同的情况,都可能由同样的疾病所引起。因此我們也可以認識到子宮这一个器官,除了月經的所謂生理性出血以外,也很容易由于它本身局部的或其他有关器官的病变而引起病理性子宮出血。

此外,因为人是一个整体,人体上任何一个器官归根結底由于腦和神經的支配与联絡,相互之間都具有着密切的关系。女性的生殖器官也不例外,它們也往往会受到身体其他部分的不好的影响而发生疾病,子宮出血也就是人体上某些疾病的一种症狀。那么究竟有哪些全身性的疾病会引起子宮出血呢?象妇女身体的健康不够好,外在环境如气候的特別炎热,急性或慢性的傳染病,酒精中毒(急性的就是飲酒过量,喝得大醉;慢性的就是日常有飲酒的嗜好),心臟血管以及血液的疾病;还有神經系統方面的疾病,其中包括精神病,等等,都可以引起子宮出血。

除了由于这些全身性疾病所引起的子宮出血以外,其他原因所引起的子宮出血和病員的各个生長发育时期,都有着密切的关系。如在前面曾提到的成熟期的子宮出血,多数是功能性子宮出血。这类疾病的发生,大都是暂时性的,一般不大会碰到比較严重的情况。在生育期中,妇女的生殖器官由于性交或者生育的原故而加重了負担,以致多数的子宮出血都是由于生殖器官先有了疾病。到了經絕期和老年期中,如果有子宮出血发生,十之八九是腫瘤所引起的,而其中又有一大半是惡性腫瘤。

在生育期中,我們已經知道有不少的子宮出血情况是由于所謂“器質性疾病”(即生殖器官本身的疾病)所引起的;其中由于妊娠的并发病所引起的子宮出血,要占很大的一部分。因此我們也可以將子宮出血分为:由妊娠所引起的子宮出血

和由于妊娠以外的生殖器官疾病所引起的子宫出血两大类。可是也有一些例外，如妊娠期的子宫出血，有的时候就可能和妊娠没有关系，即使妇女的生殖器官有了某种疾病，如盆腔肿瘤、良性的子宫颈病变、恶性的子宫颈癌和绒毛膜上皮癌等，却仍然可以怀孕。至于妊娠以外的其他生殖器官疾病，如，属于子宫的有：损伤、良性的子宫颈病变、产后的子宫变位和子宫复旧不全、息肉、肌腺病、肌瘤、癌瘤、肉瘤、绒毛膜上皮癌、炎症、内膜炎等，其中的子宫变位及复旧不全，则又和生产（也就是间接的，如妊娠）有密切的关系。至于属于盆腔中其他生殖器官的有子宫附属器官的肿瘤和炎症，这些疾病所引起的子宫出血，大多数都是比较轻微的。关于上述的一些疾病以及其他许多和子宫出血有关的疾病，在下一章中将逐一地加以比较简明的介绍。

二、哪些疾病可以引起子宫出血？

前面我们已经简略地介绍过子宫出血的一般情况以及在哪些情况下会产生子宫出血。现在就比较详细地谈谈引起子宫出血的各种疾病，并且按照它们的类别，逐一地加以叙述。因为弄清楚了这些，对于各种子宫出血性疾病便可以得到一个概略的了解；这在我们实际上来识别子宫出血这一现象可能是什么病和它的严重的程度，是会有些帮助的。

1. 全身性疾病

通常我们只知道有一些妇科的疾病可以引起大量的子宫出血，象流产，子宫的癌瘤和粘膜下肌瘤等都是，因为这些都是子宫本身的疾病；此外如一些卵巢功能发生障碍的疾病，也往往可以引起子宫的大量出血；因为这些疾病都是和子宫有

着直接的关系的。可是有时某些全身性疾病也会引起非常严重的子宫出血，或者是出血过多，或者是出血的时间过长。在这种情况下，如果医生没有及时采取断然的处置——把出血的子宫切除，那就会危害到病员的生命。

象全身的出血性疾病中的紫癜，假血友病，各种贫血；营养方面的疾病如维生素缺乏症和营养不良症，都可以引起子宫的大量出血。此外，如心脏的慢性瓣膜疾病；酒精、磷、铅等化学药品的慢性中毒，可以引起月经过多；属于急性传染病的伤寒、肺炎和感冒，有的时候也可以有月经过多的现象发生。肝硬化和高血压病，也常常可以引起异常的子宫出血。还有，象恐惧、紧张、环境的改变等神经和精神的因素，也常常会引起子宫突然发生不规则的出血。

紫癜是出血性疾病的一种，引起这个病的原因很多，症状也不一致，但是有一个重要的症状是共有的，就是病员在皮下、粘膜、内脏（其中也包括子宫）或其他的组织里面都有出血的现象。至于病员血液里面的变化，有的很显著，有的并没有什么改变。

假血友病也是一种出血性疾病，但是在临床上，医生们并不把它列为一个独立的疾病；因为它并不是真的血友病，只是在某些出血的症状方面有点象血友病而已。血友病是一种有遗传性的，终身有出血倾向，只表现在男性病员，以及血液凝固时间延长的一种疾病。而假血友病则仅发生在妇女因肝脏疾病所产生的血液凝固时间的延长。

贫血，只是一种症状，实际上它包括了許多引起贫血的疾病；其中一小部分，也是急性或慢性出血的结果。前面所说的维生素缺乏，感染，及化学药品中毒等，也可以是引起贫血的原因。

2. 妇女生殖器官的腫瘤

妇女生殖器官和人体的其他器官一样，都可以发生腫瘤。不問是什么組織或一样細胞，只要它是不遵守全身生長的規律，和正常的細胞脫节，盲目地自动生長的，就叫做腫瘤。

腫瘤的种类很多，总起来說，按照它对人們危害性的大小，可以分作兩大类：一类是良性腫瘤，一类是惡性腫瘤。良性腫瘤的外面有层包膜，生長得慢，至多只会挤压别的組織或器官，一般都不会发生严重的后果。而惡性腫瘤，多数沒有包膜，你不过問它，它就会很快地发展，在一定的时期内就可以象树根一样的侵潤到别的和它鄰近的器官里，或者通过血液或淋巴的循环，跑到較远的器官里面（这在医学上叫做“轉移”）；不管别的器官和母体——人的死活，一味的拼命的生長发育，結果弄得器官被破坏了，也就丧失了正常的功能，这时病員的全身营养不良，消瘦不堪，以至死亡。但良性腫瘤有时也可能轉变为惡性腫瘤，或者它生長在一个重要器官的里面或旁边，如生在腦壳里。我們知道人的头顱骨是硬的，絕不能象肚皮一样的有彈性，可以脹大縮小；因此头顱骨腔內除了腦及它附屬的組織以外，可以說几乎没有什么空隙能够騰讓出来。那么一个一天天逐漸長大的腫瘤，也可以由于它压迫了腦組織而引起各种严重的后果。不过在妇女生殖器官方面所生的良性腫瘤，如果得到及时的診治，它的結果总归是不坏的。至于惡性腫瘤，有时即使用外科手术加以切除，也往往容易复发。

子宮出血是妇女生殖器官腫瘤的主要症狀，不管它是良性的还是惡性的。在子宮腫瘤方面，屬於良性的有息肉、肌瘤和肌腺病；屬於惡性的有癌腫、肉瘤和絨毛膜上皮癌等；此外，在子宮附件腫瘤方面，有良性的和惡性的卵巢腫瘤等等。現

在將有关这些疾病的主要症狀和特点，按照良性和惡性的分类，在下面作一些介紹：

(一)良性的子宮腫瘤

(1)息肉：在子宮上生長的息肉，按照它生長部位的不同，普通分为子宮頸息肉和子宮內膜息肉兩種：

子宮頸息肉(图3)：一般地講，它是生長在子宮頸內膜上的小型腫瘤。有的只長一个，有的可以長几个。大多数的息肉都有个較細的柄和子宮頸的內膜相連，这个柄，我們称为“蒂”。息肉的表面很光滑，紅色或淡紅色。当医生作阴道檢查时，摸到它，它是和內膜下的肌肉組織沒有粘連的，也可以說是能够移动的。但碰到它的时候，卻很容易出血。它为什么会发生的呢？很多医学家們認為：大都是由于慢性的子宮頸炎所引起的。它是一种完全良性的子宮腫瘤，很少会变成惡性的。




图3 子宮頸息肉
圓形的东西是从正面看的突出阴道里的子宮頸，上面的一只小囊狀的东西就是息肉。

它所引起的主要症狀是常有不規則的少量出血，經過阴道流到外面来；特別是在性交时，大便时，或用力劳动以后，会发现这样的情况。如果息肉生得比較大，或者在息肉上由于某些細菌的感染而发生潰爛的时候，也可能发生大量的出血。除了出血以外，同时阴道里的分泌物也会增多。

子宮內膜息肉：情况大体上和子宮頸息肉差不多，可以是單独一个，也可以同时有好几个；但有时更可能和其他的惡性腫瘤同时存在。它的顏色和大小，也和子宮頸息肉相仿。

它有时并不发生什么症狀，但比較大的或几个并成一个的，常常会产生月經过多的現象。至于較大的有蒂息肉，也可以和某些子宮頸息肉一样，从子宮頸口脫到子宮的外面，也就

是突出到阴道里面来；这种情况的息肉很容易发生潰爛，也可以引起很厉害的大出血。

另外还有一种很少見的子宫息肉，它不是从子宫内膜形成的，而是从胎盤組織形成的。这种息肉大都发生在流产或者正常生产以后的几年里。它的主要症狀也是子宫出血。

(2) 肌瘤：子宫肌瘤是从子宫肌层发生的一种腫瘤，也是子宫腫瘤中最为常見的一种。大多数是在妇女 30—50 岁的时候发生。它的生長和一种內泌素(荷尔蒙)——雌性素有关系。因为在經絕期后，这种內泌素便不再产生，既然失去了这种內泌素，肌瘤便会自动的萎縮起来。肌瘤大都是好几个同时发生的，有大有小；它的顏色是淺紅而有点泛白，迎着阳光看，由于反光的关系，便可看到一种閃光；它的質地也較坚硬。

按照肌瘤生長的位置，我們可以把它分成三种(图4)：




图4 子宫肌瘤

1. 漿膜下肌瘤
2. 肌肉肌瘤
3. 粘膜下肌瘤

漿膜下肌瘤：这种肌瘤发生在子宫漿膜层的下面；

肌肉肌瘤：这种肌瘤发生在子宫肌层的当中；

粘膜下肌瘤：这种肌瘤发生在子宫粘膜层的下面。

子宫肌瘤的主要症狀就是子宫出血，但它表現的方式却是多种多样的：有的是月經量增多，有的是月經期延長，有的是連續出血，少数的如有蒂的粘膜下肌瘤，由于有充血、坏死和潰爛，有时也有大量出血的可能。除了

大量出血的情况相当严重外，其他的出血都可以或早或迟的引起貧血。此外，还有疼痛、白帶多以及不能生育等症狀和后果。如若在妊娠的时期生了粘膜下肌瘤，它还可以阻塞子宫腔，压迫胎儿，也能阻碍胎儿的出生。如果肌瘤長得很大，便会压迫子宫附近的器官，如直腸受到它的压迫，便会引起大便困难和便秘等。又如膀胱如果受到它的压迫，便会产生老是要小便，或是小便困难的情形。

(3)肌腺病：所謂肌腺病，是許多疾病的一个总称。本来子宫內膜只應該生長在子宫的內部，如果生長到其他的器官或組織里的时候，这在医学上便叫做“子宫內膜异位病”。这种病，我們肉眼所看到的組織变化有三种，就是：子宫肌腺病，子宫內膜瘤和腺肌瘤。它們实际上还是一种良性的腫瘤，因為它們虽然有显著的浸潤附近組織的特性，但它們沒有一般惡性腫瘤轉移的特性；同时，到現在为止，在医学上还不能够証明它們会变成惡性的腫瘤。可是它們所牽涉的范围却很广，它們不仅可以发生在子宫本身，也可以发生在腹股溝部的圓韌帶，直腸和阴道的中隔，臍部，膀胱和骨盆，甚至在做过剖腹取胎或子宫的手术后剖腹的疤痕上，也可以发生。

这个病多数发生在30—40岁的妇女。它的主要症狀是在經期里腹痛，这和月經有关，叫做“痛經”。这种痛經和其他原因所引起的痛經不同，情况不是一直沒有变化，而是会愈来愈严重。同时，由于子宫壁腺体的增加和子宫的充血等原因，便产生月經的过量或月經期的延長，或者两种情况都有。

子宫肌腺病通常和子宫內膜息肉，盆腔子宫內膜异位病以及卵巢出血性囊腫等疾病同时存在，因此也就常常給医生在診斷这个疾病上帶來一些困难。

(二)惡性的子宫腫瘤

(1)子宫頸癌：在妇女的惡性腫瘤中，以子宫頸癌最为