

鷄峰普濟方

古子題



四

雞峯普濟方卷第十

中醫師馬翊賈秉重校定

血

小便
善本書

千金要論曰稟上云吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃
內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液
出還流入胃中或如豆羹汁或如切蠟血凝停胃中因即
滿悶便出或出數斛至于一石者是也

得之於勞倦飲食過常所爲也肺疽者或飲酒之後毒滿
悶吐之時血從吐後出或一合半升是也傷胃者因飲食
大飽之後胃中冷物不能消化便煩悶強嘔吐之所食之
物與氣共上衝臍因傷裂胃口吐血色鮮赤腸絞痛自汗
出其脉緊而數者爲難治也

問曰病胃腸支滿妨於食病至則先聞腥臊臭此清液先
唾血四肢清瘦目眩時時前後失血病名為何何以治之
對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血醉以入房中
氣竭而肝傷女子則月事衰少不來也

涼血散治先因吐血止而後嗽中血出如線引脇下時痛
日漸羸瘦此由悲憂傷肺肺主氣而血隨氣傷則血無所
主故始則暴去後隨病而上下脉緩小可治細數加急者
不治宜此藥并黃老最散

活鱉魚

壹箇重半斤者以河水養伍日用童子小便法
酒各伍升烏梅伍箇槌碎桃柳枝各剉壹合共

用新綿包子燉火同煮令鱉死候減耗壹半取
出綿包子將鱉去甲腸肚細切研爛再熬約得
至半碗珀蓋盛將甲骨
炙令焦黃色入後藥

人參 琥珀 木香 柴胡 枳實

杏仁 黃耆 恒山 安息香 附子

當歸 桂 羌活 知母 茯苓

烏梅肉

右件等分爲細末將蠶蚶膏加杵千下元如桐子大溫酒下三十元食前臨卧服更有使胡黃連三稜亦等分

木香元 治無氣及一切積聚敗血爲病

人參 木香 茯苓 去皮水煮如麵者研 沒藥

青橘皮 菴間子 各壹兩 檳榔

白豆蔻仁 各伍箇 水銀 肆兩水煮壹伏時同棗肉研星盡

當歸 別兩 金牙石 麒麟竭 各半兩 薄荷

荆介穗各半兩

大膽拾肆 不艸皂角壹挺

右為細末分一半別入燈上燎者巴豆杏仁各二十一箇同用麵糊為元如梧桐子大治乾血氣積血氣有巴豆杏仁者名大藥無巴豆杏仁者名小藥治產後及血氣疰悶不下食血暈大効一半藥末只煉蜜為劑迴面向東杵一千下喫時旋元小豆大每服五七元看病大小用之湯使臨時

白頭翁湯 治下血連月不羗

厚朴貳分

阿膠

黃連

秦皮

附子

黃蘗

各壹兩

龍骨

參兩

茯苓

白頭翁

芍藥

各貳兩

乾薑

當歸

赤石脂

甘草

各參兩

右為細末每服二錢入棗一枚擘破以硬米飲煎至七分和滓溫服不以時

血竭散 治婦人血氣產後渴燥一切血邪亂語眼如血袋及血上衝口鼻血出

硃砂 血竭 沒藥 桂 木香

朱砂 各壹分 海馬 壹對 乾漆 壹兩 蜜虫 壹分 龍腦 壹錢

水蛭 拾肆個 當歸 鵬砂 阿魏 各壹大錢

右研為細末每服一錢冷水調下如產後血上衝口鼻血出用童子小便調服三服必効

人參黃耆散 治勞嗽嘔咯血出

黃耆 貳兩 紫苑 款冬花 知母 芍藥

人參

阿膠各壹兩

食茱萸

桂各半兩

糯米升

伏龍肝

壹雞子大

紫甲壹个

右為細末水一盞煎三錢食後臨卧熱服盜汗入竹三

葉同煎咽痛入乾薑皂大困乏入葱二寸薑七片棗二

箇嗽甚入杏仁七箇驚悸入茯神半錢煩渴入烏梅二

箇礎碎氣逆入橘皮二錢頭目痛入生甘草二寸咯血

紅花少許同煎

傷風主傷中肺氣不足脇下疼痛上氣咳嗽唾有膿血

不欲食惡風目視眩眩足脛腫痛

小麦壹升

熟地黄

柔白皮

紫苑

各壹兩

麻仁

壹兩

阿膠兩半

人參

桂

甘草

各壹兩

黃芩

兩半

右為鹿末每服二錢水一盞生薑三片錫一棗大煎至六分去滓溫服

伏龍肝散 治衄血

伏龍肝

貳个如雞子大

生地黄

陸兩

芍藥

乾薑

吳茱萸 甘草

白芷

桂

各參兩

芎

壹兩

細辛

陸銖

右為細末每服二錢水三分酒七分煎至七分去滓溫服不以時

附子地黄散

治虛勞吐血下血衄血崩血漏血

附子

乾薑

桂

黃耆

龍骨

烏魚骨

白朮

牡蠣

生乾地黄

各貳兩

白芍藥壹兩

右為細末每服三錢空心米飲調下

竹茹湯治婦人汗血衄血尿血下血

竹茹貳升 乾地黄肆兩

人參 芍藥

桔梗 當歸 甘草 芎 桂各壹兩

右為細末每服一錢水一盞煎至七分食後去滓溫服

栢葉膏治咳嗽唾血久不較

人參 黃耆去皮畧各壹兩 桑寄生 當歸

沉香 荊芥穗各貳錢 麥門冬兩半

黃連每枚用蜜炙焦煙起為度壹分半 槐實片切炒色轉壹錢

右為細末每服二錢匕用新汲水八分化破栢葉膏少

原书缺页

原书缺页

右爲鹿末每服五錢水二盞入青竹茹半雞子大同煎至一盞去滓溫服

小伏龍肝散

治五臟經熱鼻衄心胃煩悶

伏龍肝

赤芍藥

當歸

黃耆

犀角屑

刺藺

各壹兩

生地黄

叁兩

右爲鹿末每服五錢水二盞竹茹一雞子大煎至一盞去滓溫服

黑玉丹

治吐血先聞腥臊臭出清液胃脇支滿妨於食目

眩時時前後失血此由素經大失血若醉入房中氣竭傷肝女子則月事衰少不來病名血枯宜烏賊魚骨元

槐花

枳殼

地榆

黃耆

芎各貳兩

五靈脂

五倍子各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元空心米飲下

人參栢葉湯

治宮藏虛弱下血不止

人參

栢葉仁

芍藥

熟地黃

當歸

阿膠各半兩

右為鹿末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服裏急虛寒脉凝欲絕者宜加乾薑附子桂等分

麝香綿灰煎治咯血

麝香半錢

綿灰

乳香各壹錢

防已叁分

阿膠

甘草各半兩

右為細末煉蜜和元如雞頭大每服一元含化嚥津

生地黄湯 治鼻衄面無顏色

生乾地黄兩半

赤芍藥 赤茯苓各參分

栝菜壹兩

阿膠 當歸各半兩

右為細末煎黃耆湯調下二錢及搐向鼻內先含水一口閉目搐入然後吐出水即止神妙

蒲黃散 治大便秘血及口鼻皆出血血上冒心氣急此是

勞熱所致

生地黄兩

蒲黃壹升 地骨皮伍兩

黃芩

芍藥 生竹茹各參兩

右為細末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後溫服

阿膠散 治鼻衄不止此是陽毒傷肺

阿膠

伏龍肝 黃芩

地骨皮

葱白連鬚鬚

豉壹合

重校定此方內四味死分兩其衛生秘方內有黃土湯與此方治療藥味相類阿膠等各用貳錢半

右剉令勻以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黃汁二合攪勻分溫三服非時

鹿角膠 治血少氣多躄熱羸瘦

鹿角膠兩壹

乳汁壹升 酥

蜜

薑汁各壹兩

右先下乳煎即下鹿角膠銷即下酥等緩火煎七八沸
坳器中凝以竹刀割服之熱水下半匙食後臨卧

柴脾湯主脾氣不足下焦虛冷胃膈滿塞汗出脇下支滿吐血下血

熟地黄兩

黃耆

桂

芍藥

甘草

各壹兩

右為鹿末每服二錢水酒少許煎至六分去滓溫服

槐花元治腸風下血

槐花壹兩

蒲黃

地榆

卷柏

各半兩

乾薑

壹兩

右為細末每服一錢水一盞煎數沸不以時候服

阿膠元治久新百疾諸病失血寒熱往來不知痛處或

驚悸恍惚昏昏似醉膚身斑駁失心顛狂面腫心悶尸注復連夢想顛倒身軀瘦損乍起乍卧咽中噎塞疳墮下利下部腫痛中惡疰忤臍下堅疼心腹脹滿氣急奔衝上下

紫檀

如無用青木香

茜根

鬱金

黃蘗

胡椒

各壹兩

右為細末水煮麵糊和元如梧子大每服一元米飲下
不以時

百草霜散治金瘡止血

石灰壹斤

刺薊陸兩

馬齒貳兩

韭肆兩

百草霜壹斤

右先將草藥四味同搗爛漸漸入石灰再搗勻捏作餅
子陰乾為末乾摻之

大犀角散治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止心中壅悶

犀角屑

梔子仁

地骨皮

子芩

川大黃

各半兩

麥門冬

叁分

甘草

茯神

川升麻

茅根

蘆根

各半兩

生熟地黃

壹兩