

• YING XIANG XUE YINGSHI XITI JI

• QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

影像学 应试习题集

YING XIANG XUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】



中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试

影像学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

影像学应试习题集/路大鹏, 刘玉山主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2004.3

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2907-5

I. 影… II. ①路…②刘… III. 影像—诊断学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R445-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 019605 号

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm¹/₁₆

印张: 18³/₄

字数: 440 千字

印数: 1-6000

版次: 2004 年 4 月第 1 版

印次: 2004 年 4 月第 1 次

印刷: 北京友谊印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN7-5067-2907-5/G·0359

定价: 34.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择出一个最佳答案(A_1 、 A_2 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的A、B、C、D、E五个被选答案中选择一个最佳答案(A_3 、 A_4 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案(B_1 、 B_2 型题)。④题型四:两道试题共用A、B、C、D四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择(C型题)。⑤题型五:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案(X型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会

2004年1月6日

目 录

影像解剖.....	(1)
放射医学.....	(22)
X 线计算机体层成像 (CT)	(91)
超声医学.....	(144)
磁共振成像 (MRI)	(193)
核医学.....	(209)

影像解剖

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 颅盖骨是何种化骨
 - A 膜内成骨
 - B 软骨成骨
 - C 混合成骨
 - D 直接成骨
 - E 间接成骨
2. 颅底是何种化骨
 - A 膜内成骨
 - B 软骨成骨
 - C 混合成骨
 - D 直接成骨
 - E 间接成骨
3. 下列不属于脑颅骨的是
 - A 额骨
 - B 颞骨
 - C 下颌骨
 - D 筛骨
 - E 上颌骨
4. 下列不属于面颅骨的是
 - A 上颌骨
 - B 下颌骨
 - C 鼻骨
 - D 额骨
 - E 眶骨
5. 头颅指数是指
 - A 头颅最大横径与前后径的百分比
 - B 头颅最大内横径与内前后径的百分比
 - C 头颅最大横径与高径的百分比
 - D 头颅最大前后径与高径的百分比
 - E 头颅最大内前后径与内高径的百分比
6. 囟随年龄增大而封闭，后囟于生后几个月闭合
 - A 3 个月
 - B 2 个月
 - C 4 个月
 - D 6 个月
 - E 2 岁
7. 颅骨缝约在几岁开始闭合
 - A 18 岁
 - B 23 岁
 - C 30 岁
 - D 35 岁
 - E 38 岁
8. 颅骨缝闭合的顺序是
 - A 矢状缝、冠状缝、人字缝
 - B 矢状缝、人字缝、冠状缝
 - C 人字缝、矢状缝、冠状缝
 - D 人字缝、冠状缝、矢状缝
 - E 冠状缝、人字缝、矢状缝
9. 颅骨缝闭合时发生的顺序
 - A 板障、内板、外板
 - B 内板、板障、外板
 - C 内板、外板、板障
 - D 外板、板障、内板
 - E 外板、内板、板障
10. 在颅骨侧位片上可见从颅中窝迂曲上

2 影像解剖

行,在冠状缝后分为两大直支的血管压迹是

- A 脑膜中静脉沟
- B 板障静脉沟
- C 导静脉沟
- D 脑膜中动脉沟
- E 板障动脉沟

11. 既参与颅盖构成,又参与颅底构成的是

- A 枕骨
- B 颞骨
- C 额骨
- D 蝶骨
- E 眶骨

12. 位于蝶骨大翼后外部,其间有三叉神经的第3支和脑膜副动脉通过的孔是

- A 棘孔
- B 卵圆孔
- C 圆孔
- D 破裂孔
- E 以上都不是

13. 以下各项中不属于蝶鞍构成的是

- A 鞍结节
- B 鞍背
- C 斜坡
- D 鞍底
- E 前床突

14. 蝶鞍侧位片上可测量其前后径及深径,它们的平均值分别为

- A 10.5 cm, 9.5 cm
- B 11.7 cm, 9.5 cm
- C 12 cm, 10 cm
- D 5 cm, 10 cm
- E 10 cm, 20 cm

15. 成人视神经孔的孔径大约是

- A 4.6~5.6mm
- B 4.8~5.3mm
- C 3.6~4.8mm
- D 4.9~5.3mm
- E 4.9~5.8cm

16. 最常见的颅内生理性钙化是

- A 侧脑室脉络丛钙化
- B 基底节钙化
- C 大脑镰钙化
- D 小脑幕钙化
- E 松果体钙化

17. 新生儿枕骨由几部分组成

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5
- E 6

18. 新生儿蝶骨由几部分组成

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5
- E 6

19. 下列不参与眼眶构成的是

- A 筛骨
- B 蝶骨
- C 腭骨
- D 颞骨
- E 上颌骨

20. 大部分由蝶骨构成的眶骨是

- A 眼眶顶壁
- B 眼眶外侧壁
- C 眼眶内侧壁
- D 眼眶后壁

E 眼眶下壁

21. 在正常情况下, Water 位 X 线片上颌窦密度与眼眶密度相比

- A 上颌窦密度大于眼眶密度
- B 上颌窦密度小于眼眶密度
- C 上颌窦密度等于眼眶密度
- D 上颌窦密度小于或等于眼眶密度
- E 因个体差异, 无法相比

22. 成人下颌角的正常值为

- A 110°
- B 115°
- C 120°
- D 125°
- E 130°

23. 下颌关节间隙正常值为

- A 1.5mm
- B 1.8mm
- C 2.0mm
- D 2.5mm
- E 3.0mm

24. 下列各项中对颈椎椎体的描述不正确的是

- A 第1颈椎没有棘突和关节突
- B 第2~7颈椎棘突末端分叉
- C 第2颈椎有齿突
- D 第7颈椎棘突最长
- E 第7颈椎棘突末端不分叉

25. 齿突顶端超过腭枕线多少可诊断为颅底凹陷症

- A 2mm
- B 2.5mm
- C 3mm
- D 4mm
- E 5mm

26. 下列叙述正确的是

- A 颈椎前凸线的弧距小于6mm为颈椎强直
- B 颈椎侧位片上, 第4、5颈椎椎体前部可稍扁窄, 轻度楔形变
- C 颈左后斜位检查颈椎左侧椎间孔, 颈椎右后斜位检查颈椎右侧椎间孔
- D 颈椎侧位片上椎间隙宽度约为邻近椎体高度的 $1/3 \sim 1/2$
- E 正常情况下, 第5椎间孔最小

27. 腰椎两旁的腰大肌影起于

- A 第12胸椎两旁
- B 第12胸椎下缘两旁
- C 第12胸椎与第1腰椎之间两旁
- D 第1腰椎椎体两旁
- E 第1腰椎与第2腰椎之间两旁

28. 下列叙述不正确的是

- A 腰1横突最长
- B 腰4横突最小, 呈尖刀状
- C 腰5横突宽大, 可骶化
- D 腰3棘突最长
- E 腰椎两侧横突一般对称

29. 关于寰枢关节叙述正确的是

- A 可使头部作前俯、后仰和侧屈运动
- B 两侧关节间隙常不对称
- C 可使头部作旋转运动
- D 属于联合关节
- E 由寰椎两侧的下关节面与枢椎的上关节面构成

30. 腰椎椎管狭窄时, 腰椎椎体前后径应小于

- A 10mm
- B 12mm
- C 13mm
- D 15mm

4 影像解剖

E 16mm

31. 腰椎椎管椎体比例超过多少为椎管狭窄

- A 1:3
- B 1:4
- C 1:4.5
- D 1:5
- E 1:5.5

32. 腰椎在斜位 X 线片上显像似一只狗的样子, 下列叙述不正确的是

- A 横突为狗嘴
- B 主要观察椎弓峡部
- C 下关节突为狗前腿
- D 对侧横突为狗后腿
- E 椎弓根为狗眼

33. 有关黄韧带的断面解剖不正确的叙述是

- A 呈尖端向后的 V 形线条影
- B 宽度不超过 6mm
- C 黄韧带后缘紧贴椎管内缘
- D 黄韧带位于关节突关节和椎板的内侧缘
- E 前方与硬膜囊之间隔以低密度的脂肪组织

34. 尾骨是由几块椎骨组成

- A 3 块
- B 4 块
- C 5 块
- D 6 块
- E 4 节退化椎骨融合成 1 块

35. 人体共由多少块骨组成

- A 204 块
- B 205 块
- C 206 块
- D 207 块
- E 208 块

36. 人体骨数最多的时期为

- A 新生儿期
- B 婴幼儿期
- C 青春期
- D 青春期到骨发育成熟期前
- E 骨发育成熟期

37. 下列均为同一类骨的是

- A 肱骨、尺骨、胸骨
- B 三角骨、手舟骨、月骨
- C 颅骨、肋骨、锁骨
- D 椎骨、下颌骨、跟骨
- E 舟骨、椎骨、上颌骨

38. 肩关节脱位常见的方向为

- A 前下方
- B 前上方
- C 后下方
- D 后上方
- E 后方

39. 肩间隙正常宽约

- A 2 mm
- B 3 mm
- C 4 mm
- D 5 mm
- E 6 mm

40. 桡骨小头半脱位是由于

- A 尺侧副韧带松弛
- B 桡侧副韧带松弛
- C 桡骨环状韧带松弛
- D 尺骨环状韧带松弛
- E 以上均不是

41. 肱骨外上髁骨骺出现在

- A 1 岁
- B 5 岁
- C 6 岁

- D 11 岁
E 12 岁
42. 月骨骨化年龄为
A 3 岁
B 4 岁
C 5 岁
D 6 岁
E 7 岁
43. 腕骨中最后骨化的是
A 头状骨
B 舟骨
C 大、小多角骨
D 豌豆骨
E 月骨
44. 关于桡腕关节的描述正确的是
A 由桡骨下端的腕关节面构成关节窝
B 属椭圆关节
C 由近侧副腕骨构成关节头
D 伸的屈度大于屈，外展的幅度大于内收
E 舟骨、月骨、三角骨、钩状骨均参与构成
45. Shenton 线是指
A 髂前下棘下方髂骨外缘与股骨颈外缘的连线
B 闭孔上缘与股骨颈内缘的连线
C 自股骨大转子顶端向股骨干线引的垂线
D 自髌白顶外端向“Y”形软骨连线引的垂线
E 闭孔上缘与股骨颈外缘的连线
46. 关于膝关节叙述正确的是
A 有人体 X 线片上最大的关节间隙
B 股骨和胫骨不在一条轴线上
C 腓骨小头位于腓肠肌内侧头肌腱内
D 成人膝关节间隙为 6~8mm
E 以上都不正确
47. 关于踝关节叙述正确的是
A 关节间隙约为 4~5mm
B 两侧踝关节轴线，应与踝关节横轴线在侧方构成 75°
C 距骨属于骨性半月板
D 距骨上关节面前后长度等于胫骨下关面
E 其各关节面可以不平行
48. 正位胸片上
A 女性乳头投影于第 4 肋
B 男性乳头投影于第 4 前肋间
C 第 7~10 肋软骨依次连接上位肋软骨
D 第 10~12 为浮肋
E 胸骨角向后平于第 4 胸椎体
49. 侧位胸片上，胸骨柄后上方可见宽基底面向后的弧状致密影，这是
A 上腔静脉
B 胸膜病变
C 第 1 肋骨伴随影
D 第 1 肋软骨和无名动脉加上向后膨隆的前胸膜外线
E 前上纵隔占位性病变
50. 不属于后纵隔的结构是
A 食管
B 胸导管中下段
C 半奇静脉
D 内脏大神经
E 迷走神经
51. 后前位胸片于右主支气管角部可见小椭圆形致密影，这是

6 影像解剖

- A 气管旁淋巴结
 - B 无名静脉
 - C 奇静脉
 - D 钙化灶
 - E 半奇静脉
52. 气管隆突是指气管
- A 分叉处下方
 - B 分叉部左壁
 - C 分叉部上壁
 - D 分叉部右壁
 - E 分叉部下壁
53. 正常气管隆突的分叉角度约为
- A $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$
 - B $55^{\circ} \sim 85^{\circ}$
 - C $65^{\circ} \sim 90^{\circ}$
 - D $60^{\circ} \sim 85^{\circ}$
 - E $60^{\circ} \sim 75^{\circ}$
54. 右主支气管与正中矢状面成多少度角
- A $15^{\circ} \sim 25^{\circ}$
 - B $20^{\circ} \sim 35^{\circ}$
 - C $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$
 - D $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
 - E $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$
55. 左肺下叶分为四段, 与右肺下叶不同的是
- A 前外基底段
 - B 外后基底段
 - C 外内基底段
 - D 内前段基底段
 - E 以上都不是
56. 中肺野是指上肺野以下至
- A 第4肋骨下缘的水平线以上
 - B 第4肋骨前端下缘水平线
 - C 第4肋骨下缘的最低点水平线
 - D 第4肋骨前端下缘的最低点
 - E 第4肋骨前端下缘的最低点水平线
57. 小儿胸腺影像不正确的是
- A 位于前上纵隔
 - B 上缘界限不清
 - C 随呼吸改变形状
 - D 随体位改变形状
 - E 船帆征为病理征象
58. 膈肌食管裂孔位于第几胸椎水平
- A 第8
 - B 第9
 - C 第10
 - D 第11
 - E 第12
59. 左侧膈肌低于右侧膈肌是由于
- A 心脏左压
 - B 肝位于右膈下
 - C 左肺较右肺体积大
 - D 左肺两叶, 右肺分三叶
 - E 以上都不对
60. 关于奇叶叙述不正确的是
- A 只见于右肺上叶纵隔侧
 - B 没有独立的支气管
 - C 奇叶的叶间裂共有四层胸膜
 - D 可以独立为一个肺叶
 - E 由右肺尖走向右肺门上方的奇静脉
61. 由3~5支终末细支气管组成的肺结构称为
- A 肺腺泡
 - B 肺初级小叶
 - C 肺小叶
 - D 肺亚段
 - E 肺段

62. 心脏最大径是指
- 心影左侧最突出点至中线的垂直距离
 - 心影右侧最突出点至中线的垂直距离
 - 心影左右两侧最突出点间距离
 - 右心缘上下部交界点至心尖部之间距离
 - 心影左侧最突出点至中线的距离与右心缘最突出点至中线距离之和
63. 正常成人心胸比例一般不超过
- 0.45
 - 0.5
 - 0.55
 - 0.6
 - 以上都不是
64. Simon 认为右下肺动脉正常直径为
- 9~15 mm
 - 9~17 mm
 - 10~15 mm
 - 10~17 mm
 - 10~16 mm
65. 心脏后前位片上心胸比例的正常范围为
- 0.3~0.5
 - 0.4~0.5
 - 0.3~0.55
 - 0.3~0.6
 - 0.4~0.6
66. 在正位胸部 X 线片上, 老年人右心缘上部是由哪部分组成的
- 上腔静脉
 - 升主动脉
 - 奇静脉
 - 无名动脉
 - 右心房
67. 在正位胸部 X 线片上, 青年、儿童右心缘上部是由哪部分组成的
- 上腔静脉
 - 升主动脉
 - 奇静脉
 - 无名动脉
 - 右心房
68. 关于冠状动脉解剖叙述错误的是
- 心脏正位片上左冠窦向左膨出, 右冠窦向右膨出, 无冠窦位于两窦之间的前壁
 - 左冠状动脉主干走行于肺动脉干和左心耳之间, 到左房室沟处分为两支
 - 左前降支阻塞时, 由斜角支建立侧支循环由右冠状动脉供血给左室
 - 右冠状动脉窦房结支通常为第 2 分支, 走向后上方, 供血给心脏系统的重要部位
 - 约 18% 的人无右冠状动脉远侧段
69. 关于肠内气体叙述正确的是
- 十二指肠球部的气体位置不固定
 - 右下腹出现固定的小气液平面有病理意义
 - 各部小肠内均不应充气
 - 大肠内总是有些气体
 - 以上都不对
70. 消化道管壁由内向外第三层为
- 黏膜下层
 - 外膜层
 - 肌层
 - 黏膜层
 - 内膜层
71. 交感神经兴奋时
- 消化道张力增高

8 影像解剖

- B 胃肠蠕动增强
 - C 消化道张力减低
 - D 胃肠蠕动减弱
 - E 胃肠排空加快
72. 吞咽过程食管期最长不应超过
- A 10 秒
 - B 11 秒
 - C 12 秒
 - D 13 秒
 - E 14 秒
73. 食管黏膜一般有几条黏膜皱襞
- A 2~4 条
 - B 3~4 条
 - C 3~5 条
 - D 2~5 条
 - E 4~5 条
74. 气管隆突下方的奇食窝指
- A 奇静脉与食管之间的肺组织
 - B 奇静脉、右主支气管与食管之间的肺组织
 - C 食管与右主支气管之间的肺组织
 - D 食管与左主支气管之间的肺组织
 - E 奇静脉与右主支气管之间的肺组织
75. 关于胃与其相邻组织叙述不正确的是
- A 胃小弯和肝之间形成肝胃韧带
 - B 胃前壁右侧邻接肝左叶和方叶
 - C 胃体后壁上部邻接左肾上腺和左肾
 - D 胃体后壁下部及胃窦后壁邻接胰腺
 - E 肝左叶呈舌形覆盖在贲门胃底后方
76. 关于胃小区的叙述正确的是
- A 均为圆形或类圆形
 - B 不是胃的微皱襞
 - C 可以发现病灶和早期病变
 - D 由胃小凹组成
 - E 胃底部没有胃小区
77. 低张力十二指肠造影的优点不包括
- A 肠管扩张
 - B 主要显示永久皱襞
 - C 能显示瓦特壶腹部的解剖结构
 - D 岬部平直段及纵行皱襞三联征
 - E 可使肠蠕动减慢
78. 小肠排空延迟指口服钡剂超过几小时未全部排入结肠
- A 6 小时
 - B 8 小时
 - C 9 小时
 - D 10 小时
 - E 12 小时
79. 动力过快指口服钡剂多长时间达到盲肠
- A 半小时
 - B 1 小时
 - C 1.5 小时
 - D 2 小时
 - E 3 小时
80. 大肠全长约为
- A 5~6 m
 - B 2.58 m
 - C 1.5 m
 - D 2.5 m
 - E 3.0 m
81. 肝脏的纵裂内有
- A 肝圆韧带
 - B 肝左静脉
 - C 左肝动脉
 - D 左门静脉
 - E 以上均有
82. 有关肝脏 CT 解剖描述不正确的有

- A 肝静脉进入下腔静脉的部位称为第二肝门, 约平第 10 胸椎
B 肝静脉分为肝右、肝左、肝中静脉三支
C 肝静脉支走行于肝脏叶或段间裂内, 以用肝静脉划分肝叶、肝段
D 第二肝门的左侧可见食管影, 食管后方为胸导管
E 胸主动脉的左后方有半奇静脉, 右后有奇静脉, 奇静脉的前方有胸导管
83. 关于胆囊叙述错误的是
A 分颈、漏斗、体、底四部分
B 胆总管连于漏斗部
C 容积约 40ml
D 服油餐后半小时胆囊开始缩小
E 服油餐后胆囊 2 小时内排空
84. 脾脏与周围器官的关系不正确的有
A 和左肾上 1/3 前缘相邻接
B 内缘中 1/3 邻接胃大弯
C 一般人脾下极平第 1 腰椎
D 脾膈面与左膈的后外侧弧线一致
E 脾下缘邻接结肠脾曲
85. 关于肾脏 X 线解剖描述错误的有
A KUB 上肾脏位于第 12 胸椎到第 2~3 腰椎两旁
B 侧位片上肾脏影一般在脊柱前缘的后方
C 肾内缘较外缘靠前
D KUB 上可观察到肾周围的脂肪组织
E 正常情况下, 肾上下左右均有一定的移动度
86. 关于肾脏 X 线解剖描述正确的是
A 肾由肾实质和肾皮质两部分组成
B 一般有 2~4 个肾大盏
C 每个肾大盂顶部有 3~4 个肾小盏
D 肾髓质由 10~12 个肾锥体组成
E 肾乳头顶上有 10~50 个乳头管开口
87. 每个肾脏有肾小盏的数为
A 5~8 个
B 6~8 个
C 7~8 个
D 6~10 个
E 8~10 个
88. 肾的后半面的中部尖段的下方的供血动脉为
A 肾动脉前支的上段
B 肾动脉前支的中段
C 肾动脉前支的后段
D 肾动脉前支的下段
E 肾动脉前支的尖段
89. 下列不可能属于肾动脉的肾外分支的是
A 膈下动脉
B 肾包膜动脉
C 输尿管上段动脉
D 肠系膜上动脉
E 性腺动脉
90. 肾上腺静脉起源于
A 下腔静脉
B 肾静脉
C 肠系膜上静脉
D 门静脉
E 脾静脉
91. 胰腺 CT 断面解剖论述不正确的是
A 胰腺位于腹膜后肾前间隙中, 前为腹膜壁层, 后为肾前筋膜
B 胰体、尾层面高于胰头, 钩突最低
C 正常胰头宽径最大范围不应超过同层面上椎体的横径

10 影像解剖

- D 胰颈位于胰头体之间, 肠系膜动脉前方, 前缘可见边缘凹入
E 胰头在十二指肠内呈圆形或分叶状, 十二指肠降部在其右缘, 下腔静脉在其后方, 这是确定胰头的标志

92. 输精管全长为

- A 15~30 cm
B 25~35 cm
C 25~45 cm
D 25~40 cm
E 30~45 cm

93. 正常成人右下肺动脉主干直径一般不超过

- A 5mm
B 10mm
C 15mm
D 20mm
E 25mm

94. 正常成人膀胱的容量是

- A 200~300 ml
B 200~400 ml
C 300~400 ml
D 300~500 ml
E 400~500 ml

95. 子宫输卵管造影所显示的子宫腔容量平均为

- A 2 ml 左右
B 4 ml 左右
C 6 ml 左右
D 8 ml 左右
E 10 ml 左右

96. 正常时, 在多少时间内子宫腔和输卵管内造影剂应排空

- A 12 小时

B 24 小时

C 36 小时


D 48 小时

E 24~48 小时

97. 输尿管全长约

- A 10~15cm
B 15~25 cm
C 25~30 cm
D 30~35 cm
E 35~40 cm

98. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为



A 股动脉


B 股静脉

C 股神经

D 股直肌

E 坐骨神经

99. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为



A 股二头肌


B 腓总神经

C 肱动脉

D 肱静脉


E 胫神经

100. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为




- A 鳞状缝
- B 蝶额缝
- C 蝶顶缝
- D 蝶鳞缝
- E 冠状缝

101. 下图松果体层面画线部分所指的 X 线解剖名称为




- A 尾状核头
- B 豆状核
- C 内囊前肢
- D 侧脑室前角
- E 内囊膝部

102. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为




- A 大脑脚
- B 环池
- C 内囊
- D 脚间池
- E 丘脑

103. 下图侧脑室三角区层面画线部分所指的 X 线解剖名称为




- A 尾状核头
- B 内囊额部
- C 侧脑室前角
- D 内囊前肢
- E 豆状核

104. 下图第 3 腰椎椎弓根下层面画线部分所指的 X 线解剖名称为




- A 第 3 腰神经节
- B 第 3、4 腰椎椎间孔
- C 椎静脉
- D 第 3、4 腰间孔内脊神经
- E 第 3 腰椎下关节突

105. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为



- A 上腔静脉
- B 左无名静脉
- C 右无名静脉
- D 左无名动脉
- E 奇静脉


106. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为




- A 右上肺静脉
- B 右主支气管
- C 上腔静脉
- D 降主动脉
- E 升主动脉

107. 下图画线部分所指的 X 线解剖名称为

- A 内基底段支气管
- B 前基底段支气管
- C 外基底段支气管
- D 外侧段支气管
- E 背段支气管



108. 下图关于肺段画线部分所指的 X 线解剖名称为



- A 中叶内侧段
- B 下叶前基底段
- C 下叶背段
- D 中叶外侧段
- E 下叶外基底段

109. 下图左右肺门下方层面画线部分所指的 X 线解剖名称为

