

◎ 卢祥之 杜惠芳 等编著

# 名医名家

用 药 心得汇讲

◎ 内科卷

MINGYI MINGJIA  
YONGYAO XINDE  
HUIJIANG

陕西科学技术出版社

R282.7

LXZ

# 名医名家用药心得汇编

## 内科卷

卢祥之 杜惠芳

李文泉 郭润田 李建新 李庆升

常德增 李帮清 罗金燕 王晓鹤 编著

赵云鹏 刘志国

陕西科学技术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

名医名家用药心得汇讲·内科卷/卢祥之,杜惠芳等编著.  
—西安:陕西科学技术出版社,2006.9

ISBN 7-5369-4080-7

I . 名... II . ①卢... ②杜... III . 内科 — 药物  
IV . R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 021739 号

---

**出版者** 陕西科学技术出版社  
西安北大街 131 号 邮编 710003  
电话(029)87211894 传真(029)87218236  
<http://www.sntpc.com>

**发行者** 陕西科学技术出版社  
电话(029)87212206 87260001

**印 刷** 西安天成印务有限公司

**规 格** 880mm×1230mm 32 印本

**印 张** 15

**字 数** 400 千字

**版 次** 2006 年 9 月第 1 版  
2006 年 9 月第 1 次印刷

**定 价** 30.00 元

---

**版权所有 翻印必究**  
(如有印装质量问题,请与我社发行部联系调换)

## 前　　言

著名中医学家、北京中日友好医院焦树德先生《用药心得十讲》一书，出版十余年来，累印数十万册，说明中医学界对名医用药经验是十分重视和欢迎的。中医临床的理法方药，其中“药”是基础，研究、学习名医名家运用药物和使用方剂的心得、体会、经验，不仅对初涉临床的青年医师有所帮助，而且对经验老到的医务工作者，也是很好的学习、补充和提高技艺的途径。

譬如常用中药黄芪，岳美中先生言黄芪味甘，微温，补气之功最优，故推为“补药之长”，用其主治诸虚羸弱，尤其善用肾病；焦树德先生用黄芪治心脏早搏，疗效肯定；谢海洲先生用黄芪治单纯性肥胖，坚持数月，无不效验，但黄芪用量应在 150~250 克为宜，若黄芪每剂少于 60 克，则益气利水消脂作用甚差；赵锡武先生用黄芪治臌胀，认为臌胀多本虚标实，虚实夹杂，治当扶正顾本为先，兼以利水化瘀，祛湿理气，寓消于补，用大剂黄芪益气扶正利水；周凤梧先生用黄芪治重症肌无力，累累有验。诸家用黄芪一味，各有其途，各有千秋。集多人多家、多视角、多层次地举述某药的使用经验，尤其是 20 世纪以来，冉雪峰、蒲辅周、赵锡武、王伯岳、岳美中、郭士魁。方药中，时逸人、王文鼎、赵心波、韦文贵、姜华、黄文东、张赞臣、罗元恺、邓铁涛、周凤梧等一大批名医名家珍贵的用药、用方心得，分门别类，按最利于临床使用和便于参考的科属分类分述（内、外、儿、妇），用中国中医研究院著名医学家，医史文献所老所长余瀛鳌先生话说，“这对中医经验的发扬，真是厥功甚伟”。实际上，读者只要粗粗翻阅一下本书，便会从中对某种药物的使用，得到非常清晰的印象。

自从 2003 年 10 月以来，中国中医研究院、山东中医药大学、江苏中

医大学、首都医科大学、北京中医药学院、山西中医研究院、中国中医研究院西苑医院、朝阳医院等一批正高职称的研究人员、临床工作者，在总的框架指导下，分别在浩瀚的文献资料中披沙拣金，几经易稿，终于在 2006 年春天到来的时候，开始陆续完成，这些资料的整理、归纳、梳理，凝聚了诸多直接参与者和提供原始资料间接参与者的心血和成果，由于资料来源广泛，涉及医刊、医著极多，未能一一列举，在此，向这些原始文献的作者、出版者，表示深切的敬意。同时，本书在编辑、编选过程中，还得到了中国出版工作者协会国际合作出版促进会会长、中宣部出版局原局长许力以先生，中国出版工作者协会副主席、全国科技出版委主任周谊先生，科学出版社原副总编辑、中国中医研究院客座教授卢祥之先生等诸多专家的指导和帮助，在此出版之际，对上述各位一并致以衷心感谢。

参加本书编写工作的作者还有：林祝富（中国中医研究院），陈晓雷（中国医科大学），李薇（首都医科大学中医药学院），卢燕玲、常德增（北京中医医院），赵云、张继红（山东中医大学），汤楠、张乔珍（山西中医药研究院）等。

作者

2006 年 2 月 21 日

于北京中国中医研究院

# 目 录

## || 发散药 ||

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| 麻 黄 | 1  | 薄 荷 | 47 |
| 桂 枝 | 17 | 蝉 蜒 | 49 |
| 防 风 | 30 | 白 芍 | 50 |
| 细 辛 | 34 | 葛 根 | 52 |
| 羌 活 | 43 | 柴 胡 | 58 |
| 独 活 | 44 | 升 麻 | 73 |
| 菊 花 | 45 |     |    |

## || 寒凉药 ||

|       |    |     |     |
|-------|----|-----|-----|
| 金銀花   | 75 | 黃 苓 | 98  |
| 石 膏   | 79 | 黃 连 | 105 |
| 敗醬草   | 88 | 黃 柏 | 116 |
| 苦 参   | 89 | 龍膽草 | 119 |
| 天 花 粉 | 91 | 苦 参 | 121 |
| 梔 子   | 92 | 丹 皮 | 122 |
| 夏枯草   | 94 | 青 簾 | 125 |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 连 翘 | 126 | 生 地 | 138 |
| 蒲公英 | 129 | 虎 杖 | 145 |
| 白头翁 | 136 | 马齿苋 | 145 |
| 青 萎 | 137 |     |     |

## || 泻下利湿药 ||

|     |     |       |     |
|-----|-----|-------|-----|
| 金钱草 | 147 | 猪 苓   | 173 |
| 茵 陈 | 148 | 泽 泻   | 174 |
| 茯 苓 | 152 | 薏苡仁   | 176 |
| 大 黄 | 155 | 苍 术   | 179 |
| 蜂 蜜 | 169 | 雷 公 藤 | 182 |
| 芒 硝 | 170 | 车 前 子 | 183 |
| 番泻叶 | 171 | 茵 陈 萎 | 184 |
| 巴 豆 | 172 |       |     |

## || 温热药 ||

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 附 子 | 186 | 半 夏 | 210 |
| 白芥子 | 206 | 艾 叶 | 217 |
| 硫 黄 | 208 | 肉 桂 | 218 |
| 天南星 | 209 |     |     |

## || 理气药 ||

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 厚朴  | 220 | 川楝子 | 233 |
| 香附  | 221 | 莱菔子 | 234 |
| 枳壳  | 225 | 槟榔  | 236 |
| 旋覆花 | 227 | 前胡  | 237 |
| 砂仁  | 229 | 瓜蒌  | 238 |
| 木香  | 230 | 川贝母 | 239 |
| 乌药  | 232 |     |     |

## || 活血化瘀药 ||

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 茜草根 | 241 | 川芎  | 267 |
| 水蛭  | 242 | 延胡索 | 276 |
| 赤芍  | 248 | 丹参  | 279 |
| 穿山甲 | 252 | 益母草 | 290 |
| 莪术  | 254 | 桃仁  | 292 |
| 郁金  | 259 | 红花  | 293 |
| 三棱  | 261 | 仙鹤草 | 295 |
| 骨碎补 | 264 | 小茴  | 297 |
| 蒲黄  | 266 |     |     |

## || 补益药 ||

|     |     |         |     |
|-----|-----|---------|-----|
| 牛 膝 | 299 | 远 志     | 346 |
| 熟地黄 | 300 | 人 参     | 347 |
| 杜 仲 | 303 | 黄 茜     | 352 |
| 百 合 | 306 | 白 术     | 388 |
| 枸杞子 | 309 | 山 药     | 392 |
| 白 苓 | 312 | 甘 草     | 396 |
| 沙 参 | 322 | 大 枣     | 400 |
| 黄 精 | 323 | 益 母 草   | 401 |
| 玉 竹 | 324 | 扁 豆     | 404 |
| 当 归 | 325 | 鹿 草     | 405 |
| 何首乌 | 335 | 川 续 断   | 406 |
| 补骨脂 | 338 | 冬 虫 夏 草 | 406 |
| 菟丝子 | 339 | 太 子 参   | 407 |
| 淫羊藿 | 340 |         |     |

## || 其他药物 ||

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 山 檀   | 410 | 地 榆 | 419 |
| 杏 仁   | 413 | 白茅根 | 420 |
| 桑白皮   | 414 | 白 莪 | 421 |
| 桔 梗   | 415 | 百 部 | 422 |
| 鸡 内 金 | 416 | 款冬花 | 423 |
| 使 君 子 | 417 | 紫 菖 | 424 |
| 苦 棘 皮 | 418 | 枇杷叶 | 425 |

|                |     |       |            |
|----------------|-----|-------|------------|
| 全 蝎            | 425 | 地鳖虫   | 454        |
| 蜈 蚣            | 430 | 葶苈子   | 455        |
| 地 龙            | 434 | 代赭石   | 457        |
| 冰 片            | 436 | 石菖蒲   | 459        |
| 三 七            | 437 | 龙 骨   | 460        |
| 土茯苓            | 441 | 乌贼骨   | 461        |
| 鸡 血 藤          | 443 | 诃 子   | 462        |
| 马 钱 子          | 445 | 五 味 子 | 464        |
| 白 花 蛇 舌 草      | 448 | 乌 梅   | 467        |
| 瓜 蕤            | 452 |       |            |
| <b>换 算 说 明</b> |     |       | <b>470</b> |

# 发 散 药

## 麻 黄

麻黄为麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄和中麻黄的干燥茎枝。均为野生。主产于山西、内蒙、甘肃、河北、新疆、四川等地。味辛、苦、温，归肺、膀胱经。入药将嫩枝阴干、切段，生用或蜜制。

**谢海洲** 根据实验，证实麻黄主要含生物碱，另含挥发油、鞣质。麻黄碱可使人的汗腺分泌增多，促进发汗，起平喘作用，还可利尿。麻黄与麻油熬成膏药，贴于背部肺俞穴，能治小儿哮喘。

**周凤梧** 治疗急、慢性荨麻疹，用麻黄、干姜皮、浮萍草各3克，杏仁6克，陈皮、丹皮、白僵蚕各9克，丹参、白鲜皮各15克，水煎服。麻黄为主治疗急性乳腺炎，用炙麻黄、生甘草、丹参、川芎、青皮、蒲公英，将上药研末，缝成较乳房稍大的纱布袋，然后将玄明粉500~1000克装袋内，封口。将患处用温水洗净擦干，敷置药袋，每日更换。另外，用麻黄治疗小儿痉挛性喉炎，麻黄3克，杏仁、甘草各3.5克，射干、荆芥各4克，天冬5克，水煎服，1日1剂，2~5日为一疗程，曾治10例，全部治愈。

**张锡纯** “责风水肿之症，金匮治以越婢汤，其方以麻黄为主，取其能祛风兼能利小便也。”浮萍辛寒轻浮，气味俱薄，上宣肺气，外达皮毛，下利州都，有解表发汗，祛风止痒，利水消肿之功。《本经逢原》载：“浮萍，发汗胜于麻黄，下水捷于通草。”麻黄、浮萍相伍，一温一寒，相互制约，相互促进，可宣肺发汗，利水消肿。

**施今墨** 麻黄中空而浮，轻扬上达，善散风寒，开腠理，透毛

窍，通经络，复能开鬼门，洁净府，启上源而利水消肿。

**焦树德** 用麻黄的指征有发汗散寒、宣肺平喘、行水消肿、散阴疽、消癰结。最常用为辛温发汗。其宣肺平喘作用明显，凡风寒外侵，毛窍束闭，肺气不宣的外感喘咳，都可用麻黄治疗。生麻黄发汗力大，炙麻黄发汗力小。麻黄治喘，须配杏仁。麻黄宣通肺气以平喘止咳，杏仁降气化痰以平喘止咳；麻黄性剧烈，杏仁性柔润，“麻黄以杏仁为助”。喘咳的病人，如出现肺热的证候（痰黄稠，喉燥咽干，口鼻气热，遇热则喘咳加重，苔黄，脉数等），则需加入生石膏、黄芩、知母等，以清肺热而平喘。常用的方剂如麻杏石甘汤、定喘汤。麻黄还可以行水消肿，主要用于上半身或头面四肢水肿、急性水肿兼有表证。麻黄温宣肺气，开发腠理，用麻黄治水肿，水从汗解而消肿或小便增多而消肿，用越婢加术汤（麻黄、生石膏、苍术、甘草、生姜、大枣）加减，治疗肾炎病的水肿，有一定效果。《外科全生集》的阳和汤（麻黄、熟地、白芥子、鹿角胶、炮姜炭、肉桂、甘草）就是把麻黄、熟地同用，消散阴疽、痰核、流注结块，“麻黄得熟地而不表，熟地见麻黄而不腻”。用麻黄、熟地、白芥子、桂枝、红花、鹿角霜、炙山甲等随证加减，治疗肢端动脉痉挛病、闭塞性脉管炎等病，具有一定疗效。

**印会河** 麻黄外能散风寒，内能宣通肺气，上能开宣以启上源，下输膀胱以利州都。临床常配葛根，取其辛凉升散，宣肺经之风热，散胃经之郁火，走肌表以透疹，入脾胃以升清，布津液以止渴。《本草汇言》云：“葛根，清风寒，解肌热，止烦渴，泻胃火之药也。”二药伍用，一温一寒，相反相成，太阳、阳明并治。

**郭子恒** 麻黄辛温气香，善达肌表，走经络，开腠理，散风寒以发汗解表，宣肺气以平息咳喘，《本草纲目》言：“麻黄乃肺经专药，故肺病多用之。”常配黄芩，二药相参，寒温兼用，然以黄芩之苦寒制麻黄之温热，使之平喘而不助热，配伍以寒性为主导，但借麻黄之辛散，虽寒而不冰伏遏邪，共奏清肺化痰，宣肺平喘之功。

**许玉山** 治外感喘咳，尤以年高之人，以麻黄配人参，麻黄发汗解表，宣肺平喘，《本草经集注》认为：“麻黄疗伤寒，为解肌第一药。”

《本草正义》亦云：“麻黄轻清上浮，专疏肺郁，宣泄气机，是为治外感第一要药。”唯发汗力强，故体虚、年高之人，可配人参，人参味甘性微温，主归脾、肺二经，大补元气，挽救虚脱，补脾益肺，安神益智，生津止渴，益气生血，扶助正气，强身延年。《神农本草经疏》言其“能回阳气于垂绝，祛虚邪于俄顷”。二者相合，补泻并举，相反相成，扶正祛邪，既可益气，又可疏表矣。

**郝玉明** 麻黄辛温微苦，为伤寒发表之第一药。其辛散逐邪力强，可外开皮毛郁闭，以使肺气宣畅，借其苦降之性，又能内复肺金清肃下降之常，以使逆气下降，喘咳得平。临床治体弱血虚之人的外感表病，常配熟地，熟地功能补血滋阴，益精填髓。《本草从新》说：“一切肝肾阴亏，虚损百病，为壮水之主药。”《药品化义》云：“安五脏，和血脉，润肌肤，养心神，宁魂魄，滋补真阴，封填骨髓，为圣药也。”熟地可补肾精以加强纳气归元之功，与麻黄相伍，一主散邪，一填真阴，补泻兼施；一调肺气，一补肾精，金水相生，标本兼顾，止咳平喘，除滞通脉，而且麻黄得熟地而无耗散之忧，熟地得麻黄而无腻膈之患。

**门纯德** 临床治积寒，尤以四肢末端如脉管炎、静脉炎等疾病，常麻黄配附子，取麻黄之辛散苦降温通，《本草正义》云“麻黄以轻扬之味，而兼辛温之性，故善达肌表，走经络，大能发散风邪，祛除寒毒。”陶弘景认为：“麻黄疗伤寒，为解肌第一药。”配附子之辛热纯阳，上助心阳以通脉，中温脾阳以健运，下补肾阳以益火，能挽散失之元阳，为救逆之要药。《医学衷中参西录》称其“为补助元阳之主药，其力能升能降，能内达能外散，凡凝寒痼冷之结于脏腑、着于筋骨、痹于经络血脉者，皆能开之通之”。二者相伍，麻黄以辛散宣泄通滞为功，附子以补火助阳祛寒为用，攻补兼施，助阳解表，鼓邪外出，发汗而不耗阳气，助阳化气而温经通脉。

**顾兆农** 临床治呼吸系疾病，惯以麻黄配射干，射干苦寒泄降，入肺经，清热解毒，清肺泻火，降气消痰，利咽消肿。《本草正义》云：“射干之主治，虽似不一，实则‘降逆开痰，破结泄热’一语足以概之”。麻黄辛温发散，善达肌表，走经络，开腠理，散风寒，发汗解表，又

可宣散肺气以平喘咳，发汗利水以消水肿，温经行滞以逐阴寒。射干以降气为主，麻黄以宣肺为要。二药相伍，一宣一降，宣降合法，有消痰下气，平喘降逆之妙。

**邢子亨** 用麻黄治肺，每配葶苈子。麻黄轻清上浮，专疏肺郁，宣泄气机，是为治外感第一要药。《本草正义》亦云：“麻黄之泄肺，亦不独疏散外来之邪也，苟为肺气郁窒、治节无权，即当借其轻扬，以开痹着。”葶苈子苦寒泄降，功长泻肺消痰定喘，为治喘咳痰多实证之要药，并能利水消肿，《开宝本草》言其“疗肺壅上气咳嗽，定喘促，除胸中痰饮”。麻黄以辛温宣散为功，葶苈子以苦寒降泄为用。二者一宣一降，宣降相宜，一温一寒，寒温互制，则宣肃有节，升降有序，肺气通利，喘咳可平，水道可通；以麻黄配杏仁，麻黄辛温发散，有发汗解表，宣肺平喘，利水消肿，散寒通滞之功。杏仁辛以散邪，苦以下气，润以通秘，温以宣滞行痰，既有下气除喘之力，又有发散风寒之能，降肺之中兼有宣肺之用，无论外感、内伤均可选用，为止咳平喘之要药。麻黄擅于宣畅肺气，杏仁长于降泄肺气。肺主宣发与肃降，宣降相宜则气机和顺，二药一宣一降，相反相成，正合肺之机宜，宣散表邪，降气平喘功著，故前人有“麻黄以杏仁为臂助”之说；对久嗽，还以麻黄配罂粟壳，麻黄辛温，功于宣肺平喘，发汗解表，利水消肿。罂粟壳涩平，长于敛肺止咳，涩肠止泻。麻黄以宣为主，罂粟壳以敛为要，麻黄突出一个“开”字，罂粟壳侧重一个“阖”字。二药合用，一宣一敛，一开一合，麻黄以罂粟壳为佐，不致耗散肺气；罂粟壳以麻黄为佐，不致闭门留寇。

**周仲瑛** 治中焦，有时以麻黄配白术，麻黄辛温，既能发汗解表，又能宣肺利水。白术苦甘性缓，以补脾益气为主，且能益土治水，固表止汗。二药伍用，相反相成，麻黄发汗解表，祛风散寒，并引白术走表行湿，而湿非暴汗可散，但当使其微汗之意，不致汗出寒去而湿滞不去。另外，麻黄宣肺利水，白术健脾燥湿，肺脾同治，补泻两施。麻黄发表不伤正，白术益气不滞涩，寒湿两散，风去肿消，表里两顾，其用甚妙。以麻黄配细辛，麻黄辛温，发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。细辛辛温，祛风解表，散寒止痛，温肺化饮，宣鼻通窍。麻黄中空而浮，质

轻而长于升散，善于宣肺气，开腠理，透毛窍，散风寒，乃肺与膀胱经专药，有“发汗解表第一药”之称。细辛辛温而性烈，上通肺经，下达肾气，为肺肾二经之药，不仅祛风解表，更能温里散寒，既能开窍止痛，亦能温肺化饮，诚为表里两顾之剂。二者相伍，一治外感风寒，协同鼓动内外阳气，并走肺肾二经，温分肉，助卫阳，祛风散寒；一治寒饮留肺，饮邪不化，郁闭肺气，水道不利，则宣肺与温肺并举，利尿化饮并行，肾阳振奋，肺气开通，澄源开流，水邪自散；更能温经散寒，开络通痹，内外相应，攻无不克。

**刘绍武** 治急性肾炎，每以麻黄配石膏，麻黄发汗解表，宣肺平喘，利水退肿，其性升散，长于开宣，主于卫表。石膏辛甘大寒，甘寒生津，味辛能散，大寒清热，于退热泄火中具有清解之义，能外解肌肤之热，内清肺胃之火。麻黄为发汗解表第一药，石膏为清解肺胃气分实热之要药。麻黄专于宣肺，石膏专于清热，麻黄发表，石膏清里，二药相合，一寒一温，一表一里，麻黄得石膏之辛凉，能制其温燥之偏，但不减低其定喘效能；石膏引麻黄入里，减缓发汗功用。二者皆味辛之品，共入肺而清泄肺热，宣肺平喘，有表里两解之妙。麻黄有温化膀胱，行水利尿之功，石膏清热解肌，发汗消郁，二者相合，有发越水气，利水消肿的功效。

**董漱六** 平生治杂病，多用自创之方，其治支气管哮喘以气喘、痰鸣、咳呛症，用麻杏参蛤膏治支气管哮喘缓解期，多有效验。麻黄(去节)60克，杏仁100克，炙甘草50克，生姜60克，生晒参60克(如用党参，剂量加倍)，蛤蚧2对，红枣(去核)120克，白果肉20枚组成。制法为：将生晒参另煎，收膏时冲入；蛤蚧去头足研末冲入收膏；余药加水浸泡1宿，浓煎3次，去渣，滤取3次清汁再浓缩，加入冰糖500克收膏，装瓶备用。每日早晚各1匙，开水冲服。不分男女老幼，常年均可服用。服药期间切忌烟、酒、红茶、萝卜、鱼腥及一切过敏食物、辛辣食物、生冷果品。若伤风停食，可缓服数日。适用于治疗支气管哮喘缓解期，慢性支气管炎伴有肺气肿等病。临床使用此膏还应注意随证加减。如患者咳嗽低热，可加桑白皮90克，地骨皮120克；如痰多呈泡

沫状，加干姜 10 克，细辛 3 克；如大便干结，加熟地 120 克，当归 90 克；如心悸盗汗，加麦冬 100 克，五味子 45 克。

**李克绍** 用麻黄，常配前车子。麻黄辛温发汗，微苦而有利尿之功。其宣肺气，开腠理，散风寒，平咳喘，消水肿，祛湿痹。《本草纲目》载：“麻黄乃肺经专药，故治肺病多用之。”车前子甘淡渗利，气性清寒，长于降泄滑利而能导湿热下行。入小肠能泌清浊，通淋闭；入肺经能清肺热，化痰浊；入肝经能清肝热，疗目疾。故其功效可概括为：利水通淋，渗湿止泻，清热明目，祛痰止咳。二药相伍，均可利水而增强祛湿除痰利水之功。然麻黄中空气浮，性主升散，宣通肺气而行水之上源，车前子甘寒滑利，性专降泄，开通肾气而利水窍，出小便。二者相济，同奏利水消肿之功。另外麻黄宣肺平喘主降，车前子祛痰止咳，二者相反相成，有平喘止咳之功。治外感，以麻黄配桂枝，麻黄辛温，中空而浮，善宣肺气，开腠理，透毛窍，散风寒，为外感风寒，表实无汗，肺气壅塞，气喘咳嗽之要药，且又散风止痒，疏邪透疹，温化膀胱，利水消肿，还可温散寒邪，舒通经络，除风湿痹痛，消阴疽痰核。桂枝辛散温通，能振奋阳气，透达营卫。可外行于表，解散肌腠之风寒，横走四肢，温通经脉之寒滞，又能散寒止痛，活血通经，更能温化阳气，通阳利水，治痰饮蓄水等症。二者相伍，同入太阳之经，麻黄善走卫分，能开发腠理，为发汗散寒之解表要药，其发汗之力冠辛温解表药之首。桂枝能温经通阳，透营达卫，解肌发表，但发汗之力较弱。二药同用，可以温散表寒，以辛泄闭，相互协同，入于营分，出于血分，以引营分之邪达于肌表，令汗出而解，相须之中，又有相使之用，但为发汗解表之峻剂，年老体弱者忌。

**姜春华** 江南过去某些医生倡言“南方不比北方，夏月不可用麻黄”，于是夏天哮喘发作当用麻黄而不用；又有些人说，仲景明训，“有汗用桂枝，无汗用麻黄”，认为凡汗出者均忌用麻黄。于是，哮喘发作时，汗出者不用麻黄。临幊上很多病人在哮喘大发时常大汗出，喘平则汗亦少，当以平喘为主，不平喘则汗不得止，因为有汗避开麻黄，则喘不得止，汗亦不得止。前人有鉴及此者，如王旭高麻杏石甘汤注：

“喘病肺气内闭者，往往反自汗出”；“用麻黄是开达肺气，不是发汗之谓”；“且病喘者虽服麻黄而不作汗”；“麻黄乃治喘之要药，寒则佐桂枝以温之，热则加石膏以清之；正不必执有汗无汗也”。诚有识之见，可以推论，凡对某病症，有良好作用的药物，不必因有某种副作用而避开不用，也不必受非主要症状的牵制而不敢用，当然用量应斟酌，中病即止。

**李古松** 麻黄，功能开腠发汗，宣肺平喘，为辛温解表之要药，在外科临幊上也是常用之品，所谓“汗之则疮已”。麻黄配熟地，代表方如《外科全生集》之阳和汤，能治一切阴疽，如阳光一照，寒凝悉解。但使用本方，应以局部皮色白而漫肿、酸楚不痛为依据。若伴有面白，脉迟细，苔白而不渴，小溲清利等虚寒证象，则更为适合。麻黄宣肺发汗以解肌，熟地入肾补阴以养血，两相配伍，寓消于补之中，使发汗而不伤正，又无腻膈之虞。常用量，麻黄2~5克，熟地20~30克。用阳和汤常去肉桂，加桂枝10克，以助麻黄辛温透表，效果甚好。麻黄配附子，肾阳虚而寒客阴凝之骨槽风、鹤膝风，在初期，可用麻黄外解太阳之表，配附子5~10克，内散少阴之寒，发表温经，相得益彰。麻黄配石膏，麻黄疏肺，散在表之寒，石膏泄肺胃，撤在里之热。两药相伍，则发汗之力微，变辛温散寒为辛凉清解，用于荨麻疹、副鼻窦炎（鼻渊）、热痹之急性期，常获佳效。麻黄配参、芪，麻黄解表，参、芪补气，两者相合，具益气发汗之功，主治外疡体虚而感外邪者。肿疡期取小量参、芪扶正气，助麻黄驱邪之力，所谓“扶正祛邪”，非补养衰弱之意也。麻黄配僵蚕、细辛，僵蚕疏风热，有熄风解痉，化痰散结之功；细辛性辛散，有散寒止痛之效。凡外疡漫肿、木硬，隐痛彻骨，牙关拘急，如骨槽风等症，系风寒深袭于筋骨所致，取僵蚕、细辛助麻黄透彻表里，泄邪外出，功效甚良。

**许公岩** 麻黄配苍术，治湿证效果最为理想。因苍术辛苦温为燥湿健脾之要药，辛温之气味升散温化水湿，使脾气继续上归于肺，脾健则湿化。湿证的治法，应“治病求本”“审问论治”。其因虽有内外之别，外因仅属变化的条件，内因则是变化根据。内湿虽与脾肺、肾三