

植物奥秘探索

ZHIWUAQMITANSUO

(三十六)




编者
张生会

内蒙古人民出版社

植物奥秘探索

(三十六)

编 著: 张生会



内蒙古人民出版社

目 录

蔬菜植物	/1
扁豆	/1
大豆	/2
赤豆	/2
芫荽	/3
灯笼椒	/4
马铃薯	/4
番茄	/5
水蔓青	/5
冬瓜	/6
筍瓜	/7
丝瓜	/7
棱角丝瓜	/8
黄瓜	/8
苦瓜	/9
菊芋	/10
野茼蒿	/11
马兰	/12

茼蒿	/ 12
莴苣	/ 13
慈姑	/ 14
毛竹	/ 15
卷丹	/ 16
韭	/ 16
薯蕷	/ 17
蘘荷	/ 17
芳香植物	/ 18
胡椒	/ 18
金粟兰	/ 19
土荆芥	/ 20
肉桂	/ 21
樟	/ 22
金合欢	/ 22
降真香	/ 23
青花椒	/ 24
米兰	/ 25
白千层	/ 26
窿缘桉	/ 27
小叶白辛	/ 27
茉莉	/ 28
桂花	/ 28

岩青兰	/ 29
薄荷	/ 30
薰衣草	/ 30
毛蕊花	/ 31
蜜源植物	/ 31
枇杷	/ 31
马缨丹	/ 32
荆条	/ 33
淀粉植物	/ 33
锥栗	/ 33
茅栗	/ 34
白栎	/ 35
甜槠	/ 35
薜荔	/ 36
荞麦	/ 36
蕉芋	/ 37
饲料植物	/ 38
红薯	/ 38
黄鹌菜	/ 39
蒲公英	/ 39
苦苣菜	/ 40
小白酒草	/ 40
免子菜	/ 41



植
三
十六

串叶松香草	/ 41
光稃茅香	/ 42
做扫帚用植物	/ 42
扫帚菜	/ 42
五倍子植物	/ 43
盐肤木	/ 43
割取生漆植物	/ 44
野漆树	/ 44
漆树	/ 44
烟草植物	/ 45
烟草	/ 45
绿化植物部分	/ 46
雪松	/ 46
异叶南洋杉	/ 46
凤凰木	/ 46
落羽杉	/ 47
九里香	/ 47
紫鸭跖草	/ 48
大丽菊	/ 49
百变艳后——四照花	/ 50
蜀葵	/ 53
著名的观赏花卉——珠兰	/ 54
唐菖蒲	/ 55

· 云南高山花卉	· / 57
莲瓣兰奇花王——神州牡丹	· / 64
蓝盆花	· / 70
阿拉伯婆婆纳	· / 71
夏季观赏植物——美国凌霄	· / 73
天然香水树——依兰香	· / 74
垂筒苣苔	· / 75
裂叶蓝钟花	· / 76
黄、白晶菊	· / 78
花菱草	· / 79
观赏茄	· / 80
观赏椒	· / 81
高、矮雪轮	· / 82
黑心菊	· / 83
翠菊	· / 84
黄秋葵	· / 85
羽叶茑萝	· / 86
千日红	· / 87
鸡冠花	· / 88
荷花新品之梨花白	· / 89
荷花新品之杏花粉	· / 90
荷花新品之枇杷橙	· / 90
香雪球	· / 91

黄玉兰	/ 92
桂花	/ 93
荷花	/ 94
皱叶剪夏罗	/ 96
狗牙花	/ 97
狐尾天门冬	/ 98
袋鼠花	/ 100
鹅掌草	/ 101
裂叶蓝钟花	/ 102
须苞石竹	/ 103
小齿龙胆	/ 105
头花蓼	/ 107
丽江黄钟花	/ 108
紫牡丹	/ 110
美丽芍药	/ 111
川赤芍	/ 113
美丽绿绒蒿	/ 114
总状绿绒蒿	/ 116
拟秀丽绿绒蒿	/ 118
双倍白	/ 120
紫叶马氏榛	/ 121
绿杆红瑞木	/ 122
金叶莸	/ 122

金叶山梅花	/ 123
金叶连翘	/ 124
金叶红瑞木	/ 125
金黄叶风箱果	/ 126
金山绣线菊	/ 127
黄叶锦离黄杨	/ 128
扶芳藤	/ 129
彩叶卫矛	/ 130
紫纹兜兰	/ 131
白铧醉鱼草	/ 132
红花八仙花	/ 133
紫叶梓树	/ 134
紫叶矮樱	/ 134
杂交马褂木	/ 135
美国红栌	/ 136
金叶皂莢	/ 137
金叶国槐	/ 138
金叶刺槐	/ 138
花叶复叶槭	/ 139
红叶石楠	/ 140
沙漠玫瑰	/ 141
美丽的新娘花——多花黑蔓藤	/ 142
阳台绿化佳品——火龙果	/ 144

黑花魁	/ 147
铜驼金辉	/ 148
太白醉酒	/ 148

蔬菜植物

扁豆

(*Dolichos lablab* Linn.)



扁豆(食) 豆科。一年生缠绕草本，茎淡绿色，无毛。羽状3小叶；顶生小叶三角状宽卵形，长6—12厘米，侧生小叶斜卵形。总状花序腋生，长15—25厘米，每节生2—5朵花；花白色，紫红色，龙骨瓣弯曲成直角；子房被绢毛，基部有腺体。荚果长圆状镰形，长6—9厘米，宽2.5厘米。种子白色。

嫩荚供食用蔬菜。

植三十六

大豆

(*Glycinemax* (Linn.) Merr.)

豆科。一年生草本，高 60—150 厘米，茎直立，上部稍带蔓性。羽状三出复叶，顶生小



大豆〈油、食〉

叶菱状卵形，长 7—13 厘米，宽 3—6 厘米，侧生小叶斜卵形。总状花序腋生，花小，长 5—8 毫米，白色或淡紫色；二体雄蕊；子房被毛，无柄。荚果线状长圆形，长 2—7 厘米，宽 1—1.5 厘米，密被毛，具 2—5 粒种子。

大豆乃重要油脂植物，亦食用植物。

赤豆

(*Vignaangularis* (Willd.) OhwietOhashi)

豆科一年生草本，高 30—90 厘米，茎被卵形，长 4—10 厘米，宽 2.5—7 厘米，侧生羽状 3 小叶，顶生小叶卵形或宽开展长硬毛。小叶基部偏斜，小叶全缘。总状花序腋生，花

4—6朵聚生花序上端；花冠黄色，龙骨瓣先



赤豆（食）

端卷曲；子房无毛，花柱细长，顶部卷曲。荚果圆柱形，长5—9厘米，径5—8毫米。种子暗棕红色，种脐白色。

种子供食用。

芫荽

(*coriandrum sativum* Linn.)



芫荽（食，药）

伞型科。一年生或两年生草本，高20—100厘米，全体无毛，有强烈气味。基生叶具长柄，柄长1.5—8厘米，二回羽状全裂，羽片卵圆形，边缘不规则粗齿，茎生叶鞘状叶柄，叶2—3回羽裂，裂片线形。复伞形花序，花白色，果实圆球形，主棱与次棱明显。

嫩叶作蔬菜。又入药，有发表透疹，温

· 胃消食功效。

灯笼椒

(*Capsicum annuum* Linn. var. *grossum* (L.) Sendt.)

茄科。辣椒的一栽培变种。特点在果实大型，肉厚，球状，圆柱形，扁球形，多纵沟，顶端平或稍凹陷，味甜而不辣。



灯笼椒（食）

马铃薯

(*Solanum tuberosum* Linn.)



茄科。一年生草本，茎直立，高30—100厘米；地下有块茎，块茎扁球状；叶为羽状复叶；伞房花序顶生，花白色，花药黄色；浆果圆球形。

铃薯（食，淀粉） 块茎入蔬菜，也是工业用淀粉

粉的原料。

番茄

(*Lycopersicon esculentum* Mill.)



茄科。一年生草本，靠它物而上的蔓性茎，高可达2.5米；植物体被粘质腺毛，具气味；叶为羽状复叶，边缘不规则锯齿；圆锥式聚伞花序，花黄色；浆果红色。

果作蔬菜。

番茄（食）

水蔓青

(*Veronica linearifolia* Pall. ex Link ssp. *dilatata* (Nakai) Kitagawa Hong)

玄参科。多年生草本，茎直立，株高30—90厘米；叶对生，上部互生，叶宽线形，长2.5—6厘米，宽0.5—2厘米，边缘锯齿；穗形总状花序集枝顶，花小，蓝紫色；蒴果扁

植三十六

圆，顶凹。嫩苗期摘取食用。



水蔓青〈食〉

冬瓜

(*Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.)



冬瓜〈食，药〉

冬瓜〈食，药〉

葫芦科。一年生蔓生攀援草本，茎密被黄褐色毛，卷须常2—3歧；叶互生，肾形，圆形，宽10—30厘米，掌状5—7浅裂，上面粗

糙，下面具毛；花单性，雌雄同株；雌雄花花萼宽钟状，5裂；花冠辐状，黄色，5裂，直径5—10厘米；果大型，长圆柱形，长可达50—80厘米，直径可达35厘米，披白粉，生长而粗的毛；种子扁卵形，黄白色。

常用蔬菜，全国广为栽培；果皮、种子亦入药。

筭瓜

(*Cucurbita maxima* Duch.)

葫芦科。一年生蔓生草本，茎粗壮，有粗毛，卷须多歧；叶互生，肾形或圆形，长、宽20—40厘米，无裂片，具细齿；花单性，雌雄同株，花冠钟形，黄色；瓠果，形状因品种各异，果柄圆柱形，无棱沟；种子椭圆形，长圆形，扁平，白色。

果实作蔬菜；种子食用；种子、瓜蒂入药。

丝瓜

(*Luffa cylindrica* (Linn.) Roem.)

葫芦科。一年生攀援草本；叶互生，圆形、宽卵形，通常掌状5裂，长宽各10—20厘米，裂片三角形，边缘具小锯齿；花单性，