



农村常用药品手册

河南人民出版社

農村常用藥品手冊

中國醫藥公司河南省公司編

*

河南人民出版社出版（鄭州市行政區總五路）

河南省書刊出版業營業許可証出字第一號

地方國營鄭州印刷廠印刷 新華書店河南分店發行

*

統一書號：14105.1（豫總書號407）

787×1092 1/2 印張 • 45,000字

1956年6月第1版——1956年6月第1次印刷

印數 1—19,116冊

定價 1角6分



前 言

1956年到1967年全國農業發展綱要(草案)給農業生產和農村工作的發展作出了一个远大的规划。我省將在今年实现全社会主义的農業合作化，隨着廣大農民的物質文化生活水平的日益提高，特別是隨着除四害，消滅人、畜疫病工作的迅速進展，廣大農村对衛生条件的改善和医藥的需要也就必然更加迫切。这种新的形势給我們帶來了新的光荣任务。为此，特根据中央衛生部的核定处方(三十七种成藥)，从中选定常备藥品，裝置了保健箱，供应廣大農村需要。它的好处是：使用方便，一般疾病能得到及時的治療，从而可以促進人民的身体健康，保証增加生產，支援社会主义建設。

为了使大家正確的了解和使用这些

常用藥品，我們編輯了这本小冊子。它的主要內容是介紹了各種成藥和藥械的品名、應用範圍、用法、用量和保管方法等。

讀者如果需要保健箱或成藥，或者保健箱內的各種藥品、器械需要添補，可到各地基層供銷社、人民藥房或醫藥公司去購買。

如對保健箱中的藥品和器械有何意見，可向當地醫藥公司提出，也可以直接寫信告訴我們。

編 者

1956年1月

目 錄

甲、中央衛生部核定处方

品 名	頁 數
解熱止痛片.....	(1)
小兒退熱片.....	(2)
止癆片.....	(3)
小兒癆疾片.....	(5)
止咳祛痰片.....	(6)
小兒止咳糖漿.....	(7)
胃痛片.....	(8)
健胃片.....	(10)
調經片.....	(11)
驅蛔虫片.....	(12)
補血片.....	(13)
止痢片.....	(14)
小兒消炎散.....	(15)
十滴水.....	(17)
清涼油.....	(18)
疥瘡膏.....	(19)
瘡藥膏.....	(20)
癬藥水.....	(21)
凍瘡膏.....	(22)
禿瘡膏.....	(23)
紫藥水.....	(24)

紅藥水.....	(25)
眼藥水.....	(26)
眼藥膏.....	(27)
消炎眼藥膏.....	(28)
消炎片.....	(29)
阿斯匹林片.....	(30)
小蘇打片.....	(31)
乳酸鈣片.....	(32)
酵母片.....	(33)
輕瀉片.....	(34)
小兒消食片.....	(35)
小兒健身片.....	(36)
止瀉片.....	(37)
生乳藥.....	(38)
碘酒.....	(38)
牙痛水.....	(39)

乙、附加藥、械

治癭片.....	(40)
酒精.....	(40)
藥棉.....	(41)
紗布.....	(41)
剪刀.....	(42)
鑷子.....	(42)
体温表.....	(42)
膠布.....	(43)
綑帶.....	(43)

1 解熱止痛片



成分含量：阿斯匹林0.2268克，非那昔汀0.162克，咖啡因0.0324克，以上共制成一片。

規格：片重0.5克，壓制片劑。

性狀：本品為白色，無臭略有酸而帶苦味的小圓片。

應用範圍：神經性頭痛、傷風感冒、有鎮痛發汗退熱作用。此藥主要成份中阿斯匹林、非那昔汀都是很好的解熱劑，用於流行性感冒、支氣管炎，不僅能解熱，且對因發熱而引起的頭痛、神經痛等有鎮痛作用。咖啡因是興奮強心利尿藥，能興奮橫紋肌解除疲勞。三種藥配合可增強治療效力。如用藥後症狀不見減輕，應即請醫師診治以免耽誤。

用法及用量：成人每日三次，每次一片，如為止痛用服一片後痛不止時，半小時後再服一片，但一晝夜連續服用以四至六片為限。

六十歲以上老年人，服成人剂量的四分之三。

十五至十八歲服成人剂量的四分之三。

十二至十五歲服成人剂量的五分之三。

飯后用溫開水吞服。

十二歲以下最好服小兒退熱片。

此藥片是一種劇藥，服用時不能超過上述用量，因片中非那昔汀，如服用過多可能發生嘔吐，發疹（風疹塊），下痢（拉肚子），虛脫（失去知覺）等現象，又因咖啡因能使精神過度興奮而發生不安甚至失眠。

包 裝：每袋二片。

保存方法：此藥片既易分解又會風化，（分解和風化的結果能使藥品變壞或失去療效），所以須密閉於干燥避光地方。

2 小兒退熱片



成分含量：每片含阿斯匹林0.0567克，非那昔汀0.041克。

- 規格：**片重0.1克，壓制片劑。
- 性狀：**本品為白色無臭，略有酸而帶苦的小圓片。
- 應用範圍：**小兒傷風發熱，輕度頭疼，而無嚴重病狀者，可服此藥，用藥一天後不見效，應請醫生診治。
- 用法：**以溫開水沖服或混合飲食內服下，此藥服用過多後因體質關係有時要發生嘔吐，發疹（風疹塊），下痢（見第2頁），甚至虛脫（見第2頁）現象，故一定要按照規定用法或聽從醫生指導使用，五個月以內嬰兒禁用。小兒服用此藥只能服一天到兩天，不可久服。
- 用量：**五個月至一歲，每日三次，每次三分之一片。
一至二歲，每日三次，每次三分之二片。
二至四歲，每日三次，每次一片。
四至六歲，每日三次，每次一片半。
六至八歲，每日三次，每次二片。
- 包裝：**每袋四片。
- 保存方法：**放在冷暗乾燥處，密閉保存。

3 止 癢 片



成分含量：每片含鹽酸氫胍（百樂君）0.1克。

規格：片重0.2克，压制片劑。

性狀：本品為白色無臭、味苦的小圓片。

應用範圍：預防及治療瘧疾病（俗稱打擺子）。

此藥是近代抗瘧藥中治療惡性瘧疾的良藥，
用此藥治療後，不但抑制發作，而且還能使病不
復發，又可以用來預防傳染。對良性瘧疾也有治
療效用，但不能根治。

用法及用量：成人治療用：第一天服四次，每次一片，以後每
日三次，每次一片，止瘧後再服七至十四天。

預防用：每兩天服一次，每次一片，在瘧疾流行
期間用。

六十歲以上老年人，服成人劑量的四分之三。

十五歲至十八歲服成人劑量的四分之三。

十二至十五歲服成人劑量的五分之三。

八至十二歲服成人劑量的二分之一（一半）。


八歲以下最好服用小兒瘧疾片。

此藥服用後，治療效用發生較慢，因此對嚴重急
性發病時，應先用奎寧或阿地平等壓下病勢後再
服此藥，較為妥當。此藥片屬於劇藥，服用過多
時，可能發生惡心、嘔吐、腹瀉，尿中含血等現
象。

包裝：十二片管裝。

保存方法：放在冷暗干燥地方，用後把蓋蓋緊。

4 小兒瘧疾片



成分含量：每片含优奎寧（碳酸乙酯奎寧）0.1克。

規格：片重0.2克，压制片剂。

性狀：本品为白色，無臭，几乎無味，但咀嚼即緩緩發生輕微苦味的小圓片。

应用范围：治瘧疾（俗称打擺子）。

用法及用量：每日服三次，一歲以下每次服半片，一至二歲每次一片，三至四歲每次一片半，五至六歲每次二片，七至八歲每次三片，一星期內無效時，应請醫生診治。

小兒服用時，可將藥片粉碎，用溫開水服下。

此藥較其他奎寧毒性低，也無味，適宜小兒服用，但如服用量過多，也会發生嘔吐、發疹（見第2頁）、耳鳴，甚至虛脫（見第2頁）等現象。服用此藥時不能同時服用茶水、咖啡、鉄類

補血藥，以免此藥發生變化而減低療效。

包 裝：十五片玻璃管裝。

保存方法：此藥見光易變質，須存於有色玻璃瓶中避光保存。

5 止咳祛痰片



成分含量：遠志流浸膏0.075毫升，桔梗流浸膏0.225毫升，貝母粉0.15克，氯化銨0.1克，桉葉油0.002克，八角茴香油0.002毫升，甘草粉適量。以上共制一片。

規 格：片重0.7克，壓制片劑。

性 狀：本品為草黃色有芳香臭味椒鹽而略帶苦味的小圓片。

應用範圍：鎮咳祛痰。

此藥所含之遠志、桔梗、貝母是我國所產著名的鎮咳祛痰藥物，氯化銨可使黏稠的痰稀釋（沖

淡)，容易咳出。因此，凡由傷風感冒而引起的咳嗽或老年人咳嗽服用此藥很有效，但對肺結核、肺膿胸以及支氣管擴張病而發生的咳嗽，則效力很小。

用法及用量：根據咳嗽頻繁程度（次數的多少），成人每三至四小時服一次，每次一至二片，六十歲以上老年人及十五至十八歲少年服成人劑量的四分之三，十五歲以下，最好服小兒止咳糖漿。

包裝：二十片瓶裝。

保存方法：此藥受潮後易松散發霉，須放於乾燥地方。

6 小兒止咳糖漿



成分含量：氯化銨1克，桔梗流浸膏3毫升，甘草流浸膏15毫升，橙皮甙2毫升，苯甲酸鈉0.5克，蔗糖65克，加蒸溜水制成100毫升。

性 狀：本藥是深棕色，有酒的芳香臭，味甜而微帶咸苦的糖漿。

應用範圍：小兒因傷風而引起的咳嗽。此藥對小兒百日咳或肺結核等病所發生的咳嗽無效，必須請醫生診治。

用法及用量：每日三、四次，服藥期間要多喝開水，二至五歲每次一格（5 毫升），二歲以下嬰兒禁服。五歲至十五歲每次一格至二格（5——10 毫升）。

包裝：每瓶100毫升瓶裝（分為20格，每格5 毫升）。

保存方法：此藥用後應將瓶口清潔放在涼暗避光地方。

7 胃 痛 片



成分含量：每片含氫氧化鋁0.2克，碳酸氫鈉0.1克，顛茄浸膏0.003克。

規格：片重0.35克，壓制片劑。

性 狀：本品為白色無臭，味微咸而微帶有初甘後苦澀的小圓片。

应用范围：胃痛、胃酸过多、胃溃疡、十二指肠溃疡。

此藥中氫氧化鋁為制酸劑，用於中和胃酸，和治療消化性潰瘍，而且具有持久作用。顛茄具有弛緩（放鬆）腸肌解除痙攣（抽筋）而起止痛作用，因此對急性潰瘍症狀很有效。

如症狀嚴重，或服藥後症狀不見減輕，須請醫師診治，以免延誤。

用法及用量：成人每日三次，每次二片。

六十歲以上服成人劑量的四分之三。

小孩十歲以上每日三次，每次一片。

五歲至十歲每日三次，每次半片，五歲以下禁用。

此藥中顛茄浸膏是一種劇藥，服用大量能引起口腔咽喉干燥、口渴、下嚥及語言困難，發熱，狂燥（急躁）等現象；所以不可隨便超量服用。又此藥中氫氧化鋁有收斂作用，而發生便秘（大便干結）傾向，如遇服藥期間大便不通暢時可服用輕瀉片。

包裝：二十片或五十片紙管裝（或瓶裝）。

保存方法：放在干燥處，避免受潮，用後將盒蓋好。

8 健胃片



成分含量：龍胆粉30克，碳酸氫鈉（小蘇打）70克，上量共制成400片。

規格：片重0.28克，壓制片劑。

性狀：灰白色，有特殊臭味、苦而帶咸的小圓片。

應用範圍：食慾不振、消化不良、胃酸過多。

此藥中碳酸氫鈉為制酸劑，用於胃酸過多、胃痛（燒心）嘔吐、嘔氣、酸中毒、尿酸過多等病。

龍胆粉含龍胆素刺激胃液分泌，增加消化，為苦味健胃劑。兩種藥配合為良好健胃藥。

用法及用量：成人每日服三次，每次二至四片。六十歲以上每日服三次，每次二片，十至十八歲每日三次，每次二片。五歲至十歲每日三次，每次一片，飯後溫開水服下。此藥長期服用可能成習慣性，故服用一個時期後應停服，換用其他藥物，如症狀不見減輕，應請醫師診治，以免延誤。服藥期間忌

服鉄類補血藥。對於非單純性胃氣病或婦女孕妊期及產後所引起的消化不良，食慾不振，最好改用酵母片，比較妥善。

9 調經片



成分含量：每片含當歸浸膏0.3克。

規格：片重0.5克，糖衣，壓制片劑。

性狀：本品為紅色的糖衣小圓片。

應用範圍：婦女月經不調，經痛，腹脹、產後血虧等。

用法及用量：每日服三次，每次一片至二片，飯後服用。

此藥片必須耐心長期服用，可以獲得良好療效。一次不能大量服用，不然會發生口腔咽喉乾燥，鼻子出血等症狀。

包裝：五十片瓶裝。

保存方法：因糖衣受熱容易融化，所以須放在冷暗乾燥地方，用後將瓶蓋緊。