


土法防治猪病

汝 波 李中仁合編



內 容 提 要

为了推广汝陽“东風青年猪場”自建場至今沒有死过一头猪的成功經驗和創制成功的一百余种土法治猪病的有效驗方。作者具体介紹了常見几种猪病和發病的原因，猪病的預防，猪病的治疗等三部分。可供人民公社干部、飼养員工作的参考。

土 法 防 治 猪 病

汝 波 李中仁合編

*

河南人民出版社出版（郑州市行政区經五路）
河南省書刊出版業營業許可証出字第一号
河南第二新华印刷厂印刷 河南省新华書店發行

*

豫总書号：2553

787×1092 耗 $1/32 \cdot \frac{7}{8}$ 印張 · 20,000字

1960年5月第1版 1960年5月第1次印刷

印数：1—6,095册

統一書号：T16105·232

定价：(5)0.08元

前 言、

随着生猪生产的迅速发展，猪病的防治工作就显得特别重要。这一工作做好了，就能使猪生长发育正常，达到健全发展的目的。否则，将会造成很大损失。大跃进和人民公社化以来，在防治猪病工作上确实做出了很大成绩。汝阳县蔡店人民公社张沟大队“东风青年猪场”的猪病防治工作，就是许许多多奇迹中的一个范例。自建场至今没死过一头猪，保证了三千多头猪的健康发展；同时还创造和试验成功了一百余种防治猪病的有效验方，为今后养猪事业作出了很大贡献。

· 俗話說世上无难事，就怕人不鑽。說明不論做什么工作，只要有决心、有干劲、有鑽勁，工作就会做的很出色。

“东风青年猪场”猪医生李中仁，二年前还是个对猪病防治工作一窍不通的人，可是，他有高度的阶级觉悟，崇高的共产主义品德，热爱社会主义，热爱养猪事业。一句话，他有一股鑽勁，不会就学，不懂就问，勤学苦练，不上二年工夫，就练成了既红又专的猪医生。群众称他养猪“状元”。

群众的智慧是无穷无尽的，防治猪病工作也必须依靠群众，大搞群众运动，搜集流传在群众中的土验方，这是一项很重要的工作，“东风青年猪场”对这点抓的也较突出，他们千方百计的发动群众，献计献方，大大发挥了群众的集体智慧，一年多来，搜集和试验成功的土验方就有一百余种。

这些驗方，花錢少、办事大，既易找又好学，对猪病防治工作起了很大作用。

把疫病消灭在未發病之前，这也是“东風青年猪場”的另一个特点，他們特別重視对飼养人員的政治思想教育工
作，使其树立“热爱社会主义、热爱养猪事業、爱場如家”的共产主义新風尚，同时开展了有計劃、有領導、經常、全面的防疫衛生运动。由于防疫工作、飼养管理做的突出，半年多来，沒有一头猪發病，这就充分証明了党的“防重于治”方針的正确、英明。

总之，“东風青年猪場”对猪病防治工作做的較突出。这本小册子也就是具体介紹他們在猪病防治工作中的經驗和有效驗方，由于水平有限，一定会有某些缺点和錯誤，希望讀者指正。

編 者

一九五九年十二月

目 录

- 一、常見的几种猪病和發病原因..... (2)
- 二、猪病的預防..... (4)
- 三、猪病的治疗..... (8)

一、常見的几种猪病和發病的原因

汝陽县蔡店人民公社張溝大队“东風青年猪場”建場至今沒病死过一头猪，但發病的猪还是不少，而且一年四季都有，种类也很多。一般常易發生的猪病有：猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、仔猪白痢、猪感冒、猪瀉肚、猪大（小）腸干結、猪肺热、猪耳朵化膿、猪气喘、猪眼病、猪伤寒、猪伤風、猪奶病、猪伤热、猪胃病、猪反胃病、猪紅痢、猪肚脹、猪皮膚病、猪蹄腐爛、猪腹水、猪蛔虫、猪身生癩等二十四种。但危害性最大、且最易傳染的只有猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、仔猪白痢和猪气喘等五种。其發病的時間也沒一定，象猪瘟、仔猪白痢、猪气喘等，一年四季都会發生。猪丹毒多在夏季發生和流行，春季差一些，秋、冬很少。猪肺疫沒有固定時間，多在气候突变时容易發生。其他各种病症，發病的時間更难确定。各种傳染病的病狀在本書“猪病的治疗”部分中詳述，在此就不重复了。

猪病發生的原因很多，从“东風青年猪場”实际观察的情况看，除了由于病菌、病毒侵入的原因外，更重要的有以下几种：

（1）飼养管理不善，飼料調制不好，飢飽不一，致使猪体瘦弱，抗病力差。

(2) 对于猪管理不严，讓猪吃了生食、冷食、陰陽食、不干淨之物、飲水少等。

(3) 猪場衛生工作做的不夠好，坚持防疫制度不严。如外地来往行人不經消毒随便进入猪舍；或由外地来配种的猪因沒做好消毒防疫工作，帶进了傳染病；或因病猪隔离不及时、不严格，使其傳染蔓延。

(4) 猪舍建造不合規格，后坡短、前坡長，致使猪舍陽光不充足，陰暗潮湿，杀菌力不强；或在寒冷季节里，保暖工作做的不夠，里热外冷，猪都挤到一塊上了垛，压在下边的猪渾身出汗，放圈时又不注意，使猪受了涼。

(5) 猪舍地址選擇不当，地势低窪、不易排水，地面潮湿，适合細菌生活，該場剛建場时，猪舍在北院，因地勢低窪、潮湿陰暗，發病的猪通常在百分之二十左右（还有別的原因），一九五九年把猪舍改建在地勢高燥、不易积水的西边空地以后，猪的得病率显著下降了。因此，猪舍的建造对猪体的生長發育和健康有極大的关系。

总之，猪場衛生、精心喂养、場址選擇、猪舍样式等作的好坏，都是防止猪病發生的重要关键。初建場时，因缺乏經驗，这几方面的工作做的很差，故發病的猪經常不断出現。先后發病三百一十九头次。但由于他們坚决貫徹执行了“防重于治，先土后洋、土洋結合”的方針。一年多来，只花十二元錢，全部治愈。可見，只要做好工作，猪病并不可怕。一九五九年得病的猪已很少了，偶尔有一头得病，也沒有傳染开；基本上消灭了猪瘟、猪丹毒、仔猪白痢、猪肺炎等病。

二、猪病的預防

消灭猪病的关键，在于作好猪病的預防工作，只要預防工作做好了，就能使猪不生病或少生病，也就是說，养猪場中必須坚决貫徹执行“养重于防，防重于治”的方針，把猪病消灭在未發病之前。这条方針的貫徹，也具体反映了兩条道路的斗争。有的人說：“髒猪！髒猪！天生的髒东西，你就把猪舍打扫成宮殿，母猪也做不了公主。”对科学的管理猪群思想抵触。为此，在猪病的預防工作中：

首先必須坚持政治挂帅、破除迷信、解放思想、依靠群众、大搞群众运动、培养既紅又專的飼养队伍。該場对此一工作抓的很突出，猪場一建立，他們就認真选拔了成分好、政治覺悟較高、热爱养猪事業、对养猪較有經驗的人充当飼养員，这就保證了飼养队伍的純潔、可靠，对搞好集体养猪事業奠定了可靠基础。猪場建立后，他們又突出的抓住了对全体飼养員的政治思想教育。除建立了紅專夜校，定时学习（每晚两个小时，一天政治一天業務），定时測驗（一周一次），包教、包学外，还組織了由七人組成的防疫衛生委员会，專門領導这一工作。首先根据飼养員的業務、年齡、文化程度分別編成三个小組，有領導、有計劃的进行学习；隨即又發動全体飼养員，开展“紅勤巧、一員变三員（飼养員、防疫員、飼料加工員）”的紅旗竞赛运动。为此，使場內始終保持着濃厚的政治空气，培养出爱場如家、热爱养猪事業、

既紅又專的飼養員二十五人。他們既是養豬能手，也是懂得防治一般豬病的好醫生。象飼養員馬仙榮，參加豬場一年多來，不僅鍛煉成了養豬能手，而且也學會了防治豬病和配種等技術。豬醫生李中仁，在黨的培养教育下，一面學習科學技術，一面依靠群眾，經常搜集流傳在群眾中防治豬病的土驗方，他只要聽說誰對防治豬病有經驗，不論遠近，就去登門拜訪。為了治好豬病，再大困難也能克服。一次冒雨步行百十里訪來了用柿樹皮和豆面治豬瀉肚的驗方。經常看書到深夜，遇有不認識的生字和不懂的名詞就記下來，請教別人。就這樣，勤學苦練，經過一年多的時間，創造和試制成功防治豬病的有效驗方七十餘種，治好了三百一十九頭豬、雞四百只。自己也由一個對豬病一竅不通的普通人鍛煉成一個既紅又專的豬醫生。目前，該場已出現了“人人講衛生，个个搞防疫”的新氣象，防治豬病的工作已形成了群眾性的運動。這樣，不但節省了勞力，而且由於飼養員懂得了防疫知識，便于飼養管理，減少了豬病的發生。在訓練培养飼養員中，他們的經驗是：

（1）在學習內容上，應以防疫為主，治療為輔，因為飼養員成天和豬在一起，舍飼放牧都由他管，懂得了防疫知識對防疫工作的開展有很大好處。

（2）學習科學技術結合搜集流傳在群眾中的土驗方，邊學習、邊試驗、邊改進提高，理論與實際相結合。

（3）由淺到深，由土到洋，先學怎樣做，再學為什麼？逐步提高，逐步改進。

其次，搞好飼養管理和豬場衛生工作，對豬病的預防和豬的健康起着很重要的作用。他們在全体飼養員中開展了

“白圈化（定时用石灰撒地）、隔槽化（猪食槽一边安装夹栏，猪只能伸进头吃食，防止猪跳在槽内，把饲料弄脏）、便池化（训练猪在粪池内大、小便）的三化运动。在饲养管理上执行了“定饲料、定肥料、定膘情、定人员、定繁殖、定工分”的六定制度。并做到了槽净、料净、拌食均匀；大、小、强、弱、公、母猪分圈分槽喂养；先松圈后喂食，食前适当运动而后喂食，不吃生食、冷食、阴阳食（煮与未煮过的混合食），饲料不加工不喂，对爱拥挤的猪不用鞭抽、不用棍打，专人负责，精心喂养。

为了保证猪的健康，他们还规定了以下制度：

（1）一天两放牧，两打扫，七天一消毒，一天两洗槽，一洗澡（夏秋两季），经常保持圈内、外清洁卫生。

（2）向外购猪和当外面母猪来场配种时，必须进行防疫检查，不经检查不准入场，如发现患有疾病的猪先行隔离治疗，防疫注射，到符合要求时再入猪群。往往每来一头新猪，被老猪咬的很厉害，可将新猪脖子和耳朵用麻袋或破布片包好，待熟悉了再去掉，以免带进传染病和被咬伤而得皮肤病。

（3）设立三院（产院、病猪院、休养院），母猪临产前半个月送入产院，加强喂养，产后四十天离院；发现病猪，立即送到病猪院，进行隔离治疗，待病好后再出院；对无病而瘦弱的猪，送休养院休养，待肥胖后出院。以上三院，均有专人负责，并设有专门技术研究组，改进饲养管理技术，这对猪的健康起了决定性的作用。

其三，猪病的药物预防。除了饲养管理好外，就是作好药物预防工作。这是预防猪病的关键所在。“药物预防”应

从兩方面着手：一是分春、夏、秋、冬四季，进行固定的防疫注射；另是在疫病流行季节，实行早期預防。注射的藥物也有兩类：

一类是兔化猪瘟弱毒疫苗，副伤寒疫苗，猪丹毒菌苗，猪肺疫菌苗等四种藥物，应按季节和免疫期長短，进行注射；象用土法制造的“金雞猪瘟素注射液，金雞猪气喘注射液，四黄素注射液”，可連續不断，每隔六、七天就注射一次，再多些也沒坏处。注射的剂量，应根据猪的体質而定，一般猪均按藥物說明規定进行，但有些猪体質不好，抗病力很弱，就应适当增加一些，比如“猪瘟結晶素疫苗”按規定每头每次皮下注射二毫升，“兔化猪瘟弱毒疫苗”每头每次肌肉注射一毫升，有些体弱的猪，也可把“猪瘟結晶紫疫苗”增至二毫升半，“兔化猪瘟弱毒疫苗”增至一毫升半。这样，既可增加抗菌力又能延長免疫期。对于仔猪的注射，应十分慎重，不到一个月的仔猪不应注射任何疫苗，因仔猪很小，注射了会起反作用，但滿了一个月的仔猪，就应及时注射，过晚了也沒好处。注射的剂量，一般应按規定剂量減少百分之五十，体質过于虛弱的，还可再少一些，应根据实际情况而定。在防疫注射中，应特別注意以下几件事：

(1)一定要严格的进行消毒，注射前后，都应用碘酒擦洗注射处。

(2)注射“猪瘟結晶紫疫苗”和“兔化猪瘟弱毒疫苗”时，必須每注射一次就換一个針头，如針头少时，可采取注射一次消一次毒的办法，防止針头傳染。

另一类是定时給猪內服清涼藥，这种办法花錢少，效果好，簡便易行。根据經驗，在春季，猪的肝臟發热，易得眼

病，他們每隔六、七天就給豬內服一次土中藥。其藥方是：野菊花二兩、夏枯草二兩、柴胡三兩，連服兩三次即可；在夏季，豬最易發生心經發熱，會形成口、舌潰爛，引起豬丹毒病的發生或得尿道炎。如果每隔三、四天內服一次，茅草根、葦尖、黃芩、綠豆、香油、鵝蛋各二兩，連服三、四次，就可防止；在秋季，豬最易發生肺病，通常每隔六、七天，內服地骨皮一兩半，蜂蜜一兩，天花粉一兩半，瓜蘆子一兩，麥門冬一兩，內服二至三次，即可見效；在冬季，豬病大半發生于腎經虧虛，會得傷症、久亏、連啞等病，須在十天左右，就用川棟子一兩半，杜仲二兩，黑地芋兩半，生姜八錢，防風一兩，荊芥二兩，水煎服。以上各藥，可以混合服用，也可單獨服之，為了減少麻煩，他們一般採用了每到服藥期，把各樣藥混在一起，每樣四、五斤，煎几大鍋，喂豬時摻在食內，效果也很好。

三、豬病的治療

該場對於豬病的治療，始終貫徹執行了“及早治、徹底治”的原則和以“土法為主，土洋結合”的方針。因此療效很高，這裡特將幾種治療有效的土方法介紹一下，僅供參考，也許對豬病治療有好处。

識別豬病的症狀是件很重要的工作，只有認清了它是什麼病，才好對症下藥，否則會引起不良效果。

豬的病症很難識別，既複雜又沒有明顯特征，如不仔細

觀察就不易辨清，因為許多的症狀大同小異，最難辨別的有豬瘟、豬丹毒、豬肺疫、豬氣喘、仔猪白痢、豬感冒、豬副傷寒、豬傷風等八種，其他病症都比較明顯。根據經驗，這八種病症的共同特點是：第一，除豬肺疫得病就不吃食外，其他七種均系開始精神不好，飲食減少，逐步轉為不吃食；第二，得病就發燒，一般均燒到三十八至四十一度，而豬瘟病最高時能燒到四十三度，豬氣喘病開始體溫正常，病到後期發燒，但最高也超不過四十度；第三，呼吸困難，有時發喘；第四，背成弓形，喜臥不喜行動，走路東倒西歪；第五，豬丹毒、豬肺疫、豬感冒、豬副傷寒這四種病還表現咳嗽、嘔吐。

以上僅是共同之處，各種病的不同特點、在各種病內詳述。

(1) 豬瘟病

豬瘟病也叫爛腸瘟、爛腰子。得豬瘟病的原因主要是：飼養管理不善，讓豬吃了帶有“濾過性病毒”的食物和水，由消化器官感染，或因豬的“眼結膜”、“鼻粘膜”和豬的“皮膚破裂”後，保護不嚴，使病菌浸入而得。

其主要病症是：病後心跳加快，眼屎很多，能粘著眼皮，皮膚、耳尖、頭部、腹部、四肢內側等處，發現有米狀大的小紅點，用手指按也不退色，紅點由小而大，公豬有時睪丸腫脹，小便內有臭水，用手一擠即出；愛喝冷水。渾身發抖，後腿發硬。初得病時先拉干屎（球狀），後拉稀屎。病到後期，其耳根、肚皮生惡臭氣味，有時拉屎連膿帶血，也有拉黃綠色的，也有有的不拉稀屎，有時耳尖、嘴唇、四

腿下部都变成烏紫色。这种病潜伏期一般为五至八日，分急性、慢性两种，急性的往往看不出病来，头一天吃食很好，第二天忽然倒地而死；慢性的能延長兩、三星期，漸漸瘦弱而死。死后主要病变在大腸上，常見有象小豆或玉米大的黑紫色斑点，腸子上有紐扣样的潰爛。腎臟（腰子）及周身的淋巴結有腫脹和針头大小的出血点。

这种病一年四季都会發生，一般春初較多，預防的办法是：經常打扫猪圈，保持清潔衛生，每隔七天用石灰十五斤，草木灰三十斤，加水五十五斤，混合消毒。該場建場至今共發生猪瘟病的猪三十五头，全部治愈。其治法是：

①針灸藥物治法：先在猪耳朵的圪叉筋正圪叉处，用二毫米粗的三棱鋼針刺破，由流黑血到流紅血为止。再在猪的“蹄門穴”处，用五毫米寬的箭头鋼針刺一厘米深。同时在猪的口內上边三道渠（玉堂穴）前，用二毫米寬的箭头鋼針刺一毫米深即可。出血后，用食鹽在刺破处擦之，一則消炎，二則防止出血过多，（詳情見圖一）。还应在猪的鼻子內边的“血堂穴”用一毫米寬的箭头鋼針刺二毫米深即可。




圖 一

并在猪的肛門上边尾巴下边“桑門穴”处，用一毫米粗的圓

鋼針，棉花包住針尖，蘸油燒紅，猛刺二厘米深，立即去掉棉花，停三分鐘后，將針取出即可。

在各穴用針刺后，可在豬的前腿汗毛眼內塞胡椒一個，一出汗即愈。

③卡耳萬能丸：用白信一兩，紅娘五十個，蜈蚣二十條，斑毛五十個，全蝎五十個，巴豆二個（去皮），元寸一錢，朱砂一錢，大棗十個（去核），葦力子一兩，土元二十個，大吉一兩，甘遂一兩，甘草一兩，米沙一錢。以上藥品，研為細末，做成鼠糞狀藥丸。將豬耳朵上的坑叉筋中間肉皮刺一個小口，將藥塞進去一粒（見圖二），等發腫后，將藥擠出，再用米醋擦之，以防發炎。這種治法，隔日即可見效，治愈率達百分之九十五以上（孕豬禁用，會打掉胎兒）。




圖 二

③金雞豬瘟素注射液：用鷄子一只（公母均可），黨參四兩，口芪一兩，枝子五兩，射干五兩，黃芩一斤，地骨皮一斤。制法是：先將鷄摔死（不讓其出血），把鷄毛拔掉，將內臟、糞便等取出，用清水洗干淨，放入鍋內，加水五十市斤，煮沸至肉化為止，取出后，用多層紗布過濾，除去雜質，即成第一液；再將上述中藥研為細末，放入鍋內，加水三十市斤，煮沸至十斤水為止，用多層紗布過濾，即成第二液；然後將第一、二液混合煮沸至二十分鐘，用多層紗布過

濾后，再煮沸三十分鐘，再用更多層紗布過濾后，就算制成了。制成后，分裝在四十、五十、一百、二百五十毫升的瓶子內，严加封盖即可。有效期為一年。用時，三十至五十斤重的猪，每次肌肉注射三十毫升，五十至一百斤重的猪，每次注射八十毫升。四个小时注射一次，到病好为止。

④用生地一兩，荆芥五錢，防風五錢，連壳一兩，二花二錢，赤芍五錢，柴胡四錢，犀角一錢，葛根二錢，甘草二錢。用水煎成后，摻大米湯服下。

⑤白朮一兩，蒼朮一兩。水煎服。

⑥麻黃三兩，桂枝一兩五錢，神曲、麦芽各一兩，甘草一兩。竹叶、大米為引，水煎服。

⑦葱一斤，冬渣二兩，生姜一兩，蒼朮三兩，白酒一兩，大棗為引，水煎服。

⑧葱四兩，石膏四兩，冬渣二兩，神曲四兩，生姜一兩半，胡椒一錢。面湯服下。

⑨斷腸草二斤半，馬連安一斤，茶辣四兩，大蒜一斤，大楓葉一斤，甘草四兩，兩面草一斤，山豆根一斤，木通一斤，狗膝一斤，青蒿葉一斤，山先一斤，黃芩一斤，姜連四兩，加八十八斤水煎。按照猪體大小每頓喂半斤至一斤。

⑩甘汞一克，分二次內服。

⑪苏打五克，夕安五克，一次內服，每隔四小時服一次，多飲溫開水。

⑫連霉素一支，蒸溜水一支，混合分二次肌肉注射。

（2）猪丹病（又名打火印）

这种病有打火印、黑牙風、桂花瘟、菜花瘟等多种叫

法。得这种病的原因，因吃不干净之物，傳染“猪丹毒杆菌”。病后主要症状是：粪便干燥，形如球状，脖子、胸部、身上出有铜元大或巴掌大的红斑，有的连成一片，高出皮膚，用手一按就退色，少停一会又复原。急性的一般看不出红斑来，四肢无力，腿麻發硬，有的过三、四天象是好了，可是仍不吃食，再过一个时期才死亡，这种病死亡率很高，一般的二至三天就会死去。死后脾臟腫大，胃里部分变紅色或黑紫色，心里長出粉紅色肉芽，肺部充血水腫，而有泡膜液流出。該場前后共發病八十三头，全部治愈。治疗的方法是：

①先用治疗猪瘟的針灸法治疗后，再在猪的四蹄八个汗毛眼（每蹄有兩個）內，各塞白胡椒一个，隔二十四小时后，將胡椒取出，用碘酒擦之。疗效在百分之九十以上。

②用治猪瘟的“卡耳万能丸”治猪丹毒也有特效，剂量和用法与治猪瘟病相同。

③用二花一兩，黃連三分，連壳一兩，花粉一兩，寸冬五分，黃藥子一兩，白藥子一兩，薄荷五錢，甘草三錢，水煎服。

④党参八錢，当归一兩、枝子二兩，黃芩三兩，桔梗一兩半，口芪一兩，二花二兩，連壳一兩半，牛蒡子一兩，白芷一兩，双皮为引，水煎服。

⑤生地一兩，二花一兩，連壳一兩半，黃芩一兩，蒲公英三兩，白芷一兩，川芎一兩，寸冬一兩，葦尖二兩，水煎服。

⑥葦尖半斤，白桑皮半斤，毛眼根一斤，大黃四兩，地芋四兩，甘草二兩，水煎服。此藥既作治疗又有預防作用，