

全国硕士研究生入学考试

最新

诊断学

复习试题集

赵景涛 主编



北京大学医学出版社

全国硕士研究生入学考试

诊断学复习试题集

主 编 赵景涛

编 者 (按姓氏笔画为序)

王晶桐 刘佩珍 时 红

陈琦玲 赵景涛 韩江莉

主编助理 王晶桐

北京大学医学出版社

QUANGUO SHUOSHI YANJIUSHENG RUXUE KAOSHI ZHENDUANXUE FUXI SHITIJI

图书在版编目(CIP)数据

全国硕士研究生入学考试诊断学复习试题集/赵景涛主编. —北京:
北京大学医学出版社, 2004. 10

ISBN 7-81071-781-2

I. 全… II. 赵… III. 诊断学—研究生—入学考试—习题
IV. R44-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096171 号

全国硕士研究生入学考试——诊断学复习试题集

主 编: 赵景涛

出版发行: 北京大学医学出版社(电话: 010-82802230)

地 址: (100083)北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京地泰德印刷有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 罗德刚 责任校对: 李宇华 责任印制: 郭桂兰

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 9 字数: 227 千字

版 次: 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷 印数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-81071-781-2/R·781

定 价: 16.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

本书定名为《全国硕士研究生入学考试——诊断学复习试题集》，目的是帮助医学本科毕业生和本硕连读学生复习诊断学的知识和技能以迎接临床硕士研究生入学考试。本书以高等医学院校诊断学教材为基础，以试题的形式概括了诊断学的主要内容，把教材的内容与试题融为一体，尤其是心、肺、腹体格检查和病变，以及心电图的辨识和诊断更为详尽，能够使广大读者更清楚、更快捷地掌握诊断学的基础知识和基本理论，相信对于毕业后教育和自学考试的青年医师作自我考查亦有参考价值。

作为考研参考书，本书涉及的内容较一般诊断学更加深入，其中有一些属于内科学与专科（如神经内科）内容，或曰有些“超纲”，这样也可作为主治医师以上执业医师考试的参考材料。

本书在填空题、选择题、名词译释、问答题和病例分析等传统题型之外，增加了英文选择题，这是临床诊断学教学的需要，也是硕士研究生入学考试的发展趋势。每一部分之后均附有参考答案，以供读者理解和参考。

本书参编者均为长年从事临床教学的老教师和中年教师，他们以饱满的工作热情、认真负责的精神，反复推敲，在预定时间内完成书稿。由于时间较紧，恐仍有谬误或顾此失彼之处，敬请同道及读者不吝指正，以图进一步修正和提高。

编者

2004年9月

目 录

第一部分 问诊和病历

一、填空题	1
二、中文选择题	1
三、名词译释	4
四、问答题	4
参考答案	4

第二部分 一般检查及皮肤、淋巴结检查

一、填空题	6
二、中文选择题	7
三、英文选择题	12
四、名词译释	13
参考答案	13

第三部分 头颈部检查

一、填空题	16
二、中文选择题	16
三、英文选择题	19
四、问答题	22
参考答案	23

第四部分 呼吸系统检查

一、填空题	25
二、中文选择题	27
三、英文选择题	37
四、名词译释	40
五、问答题	40
参考答案	42

第五部分 循环系统检查

一、填空题	50
二、中文选择题	51
三、英文选择题	62

四、名词译释	69
五、问答题	69
六、病例分析	70
参考答案	75

第六部分 腹部检查及肛门外生殖器检查

一、填空题	84
二、中文选择题	86
三、英文选择题	99
四、名词译释	105
五、问答题	105
参考答案	107

第七部分 脊柱、四肢、神经系统检查

一、填空题	118
二、中文选择题	119
三、英文选择题	124
四、问答题	125
参考答案	125

第八部分 心电图和超声心动图

一、填空题	129
二、中文选择题	129
三、名词译释	131
四、问答题	131
参考答案	132

第九部分 血尿便常规检查及常规操作

一、填空题	133
二、中文选择题	134
三、名词译释	136
四、问答题	136
参考答案	137

第一部分 问诊和病历

一、填空题

1. 对疾病的诊断，_____、体格检查以及辅助检查是必不可少的。
2. 问诊的内容一般应包括_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
3. 主诉应包括_____和_____，一般要求在_____字以内。
4. 现病史中主要包括_____、_____、_____、_____、_____、_____和_____。
5. 现病史中主要症状的特点应包括主要症状出现的_____、_____、_____、_____和_____。
6. 伴随症状常常是_____的依据。
7. 疾病演变的情况是指疾病在_____过程中主要症状的变化。
8. 既往史应包括有生以来的_____、_____、_____及_____。
9. 系统回顾主要包括_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____八大系统。
10. 个人史包括_____、_____、_____、_____。
11. 家族史中应包括_____、_____、_____。
12. 全面的诊断应当包括_____、_____、_____、_____和_____。

二、中文选择题

1. 关于医学术语，下列叙述哪项正确？
 - A. 心慌
 - B. 心跳
 - C. 心悸
 - D. 喘气
 - E. 拉肚子
2. 关于医学术语，下列哪项不正确？
 - A. 胸闷气憋
 - B. 呼吸困难
 - C. 里急后重
 - D. 跑肚拉稀
 - E. 多饮、多食、多尿
3. 下列对“主诉”的描述，正确的是
 - A. 患风湿性心脏病 2 年，加重 4 天
 - B. 活动后胸闷 2 天，加重半小时
 - C. 咳嗽、呼吸气促
 - D. 咳嗽 3 天，支气管炎 10 年
 - E. 反复头晕、头痛、出汗、心悸 10 年，加重伴夜间不能平卧、下肢浮肿、少尿 1 周

4. 下列哪项不属于现病史？
 - A. 主要症状
 - B. 伴随症状
 - C. 一般情况
 - D. 预防注射情况
 - E. 诊疗经过
5. 下列哪项不包括在个人史中？
 - A. 社会经历
 - B. 职业及工作条件
 - C. 婚外性生活史
 - D. 药敏史
 - E. 习惯与嗜好
6. 下列哪项属于现病史内容？
 - A. 至今未能痊愈的疾病（如糖尿病）
 - B. 有无药物过敏
 - C. 烟酒嗜好
 - D. 系统回顾
 - E. 工作条件
7. 下列哪项属于暗示与逼问？
 - A. 感到哪里不舒服
 - B. 什么时候开始病的
 - C. 哪里感到疼痛
 - D. 是不是下午烧的厉害
 - E. 在什么情况下胸口痛
8. 下列哪项不属于既往史？
 - A. 曾患传染病史
 - B. 外伤手术史
 - C. 预防接种史
 - D. 过敏史
 - E. 过去所患至今未愈的疾病（高血压病，血友病）
9. 下列哪项属于既往史？
 - A. 发病诱因
 - B. 诊疗经过
 - C. 婚外性生活史
 - D. 预防接种史
 - E. 毒物接触情况
10. 下列哪项不属于个人史？
 - A. 出生地
 - B. 居留地
 - C. 工作环境
 - D. 生活习惯及嗜好
 - E. 子女数目
11. 婚姻史不包括
 - A. 结婚年龄
 - B. 夫妻关系
 - C. 离婚与再婚
 - D. 配偶健康情况
 - E. 子女健康状况
12. 下列哪项内容不包括在一般项目中？
 - A. 姓名、性别
 - B. 年龄、籍贯
 - C. 出生地、地址
 - D. 习惯、嗜好
 - E. 民族、婚姻
13. 问诊时应避免下列哪项？
 - A. 先进行过渡性交流
 - B. 先由简单问题开始
 - C. 医生的态度要诚恳友善
 - D. 使用特定意义的医学术语
 - E. 一般由现病史开始
14. 首次病程记录中，不正确的是
 - A. 要求在病人入院后 24 小时内完成
 - B. 应包括主诉及住院日期和原因
 - C. 应包括病例特点的摘要
 - D. 应包括诊断、鉴别诊断及依据的分析
 - E. 应包括具体诊疗计划
15. 询问次要症状主要是为了
 - A. 帮助了解主要症状的性质

- B. 为了考虑不同疾病的鉴别
C. 为了判断患者的预后
D. 帮助了解主要症状的严重程度
E. 了解患者发生了什么合并症
16. 下列哪项不包括在家族史中?
A. 双亲的健康与疾病的情况
B. 兄弟姐妹的健康与疾病的情况
C. 配偶的健康与疾病的情况
D. 已故的直系亲属的死因
E. 父母双方亲属有无遗传性疾病
17. 下列哪项不属于月经生育史内容?
A. 月经初潮的年龄
B. 人工或自然流产的次数
C. 结婚次数和性生活情况
D. 月经周期和经期天数
E. 末次月经日期
18. 20 岁女性患者, 间断咯血 4 年, 每月约发作一次, 同时伴腹痛, 无发热、盗汗, 无胸痛及咳嗽, 无咳脓痰, 必须补充的问诊是
A. 有无冠心病史
B. 月经史
C. 结核病接触史
D. 血中是否有食物残渣
E. 有无鼻出血
19. 男性, 50 岁, 近 1 周常出现胸痛, 每次持续 10~20 分钟, 常在劳累时出现, 与呼吸无关, 感乏力, 必须问诊的是
A. 疼痛缓解方式
B. 疼痛部位
C. 有无外伤史
D. 有无呼吸困难
E. 伴随症状
20. 男性, 20 岁, 近 1 个月出现消瘦, 无咳嗽、盗汗, 无心悸出汗, 无脾气暴躁, 查体心率 70 次/分, 心律齐, 甲状腺 I 度, 质软, 必须问诊的内容为
A. 有无多饮、多食、多尿
B. 有无甲亢家族史
C. 有无结核接触史
D. 有无腹痛
E. 有无腹泻
21. 住院病历应在病人入院后
A. 8 小时内完成
B. 12 小时内完成
C. 24 小时内完成
D. 48 小时内完成
E. 72 小时内完成
22. 首次病程记录必须在病人住院
A. 48 小时内完成
B. 24 小时内完成
C. 12 小时内完成
D. 8 小时内完成
E. 当日(夜)接诊医师下班前完成
23. 门诊病历内容不包括
A. 病史
B. 体格检查
C. 病历摘要
D. 初步诊断
E. 处理措施
24. 关于病程记录的要求, 下列哪项不正确?
A. 危重病人一日数记
B. 一般病人可一日一记
C. 较轻病人 1~2 周一记
D. 病情变化及更改用药必须随时记
E. 新入院或手术后的病人应连续记录 3 天
25. 临床思维方法(考虑诊断)的基本原则以下哪项不正确?
A. 所有临床表现尽量用一种病解释

B. 疾病的诊断主要依据主诉

疾病

C. 先考虑该年龄人群的常见病、多发病

E. 先考虑急症、危重病，后考虑一般的病

D. 先考虑器质性疾病，后考虑功能性

三、名词译释

1. chief complaint

5. personal history

2. history of present illness

6. menstrual and childbearing history

3. past history

7. marital history

4. review of systems

8. family history

四、问答题

1. 问诊的内容应包括哪些？
2. 系统回顾应记录哪些系统的主要症状？
3. 既往史的内容应包括哪些？
4. 现病史包括哪些内容？
5. 体检时一般状况包括哪些？

参考答案

一、填空题

1. 问诊
2. 一般项目，现病史，既往史，个人史，婚姻史，月经生育史，家族史
3. 主要症状，发生时间，20
4. 起病情况与患病时间，诱因，主要症状，伴随症状，病情的发展与演变，诊治经过，病程中一般情况
5. 时间，部位，性质，持续时间和程度，缓解或加重的因素
6. 鉴别诊断
7. 发作
8. 重大疾病，常见疾病（传染病），特殊体质，预防注射情况
9. 呼吸系统，循环系统，消化系统，泌尿系统，血液系统，内分泌及代谢系统，神经系统，肌肉骨骼系统
10. 社会经历，职业与工作条件，习惯与嗜好，婚外性生活史
11. 父母、子女、兄弟姐妹的健康与疾病情况，已故的直系亲属的死因，家族中有无传染病患者，家族中有无遗传病患者
12. 病因诊断，病理解剖（病生理）诊断，疾病分型、分期，并发症

二、中文选择题

1. C 2. D 3. B 4. D 5. D 6. A 7. D 8. E
9. D 10. E 11. E 12. D 13. D 14. A 15. B 16. C
17. C 18. B 19. B 20. A 21. C 22. E 23. C 24. C
25. B

三、名词译释

1. 主诉。医生在问过病史后替患者总结出来的“主要症状+时间”。
2. 现病史。是病史中的主要成分，它记述患者自发病之日起，其主要症状和伴随症状的发生、发展和诊治过程。
3. 既往史。包括有生以来所患的重大疾病，传染病史及预防接种史。还有手术外伤及药物过敏史。
4. 系统回顾。除现存疾病外，按8个系统询问及记录有关症状，以免遗漏诊断。
5. 个人史。包括旅居地、社会经历、职业、经济状况、习惯及嗜好、性病及婚外性生活史。
6. 月经及生育史。包括初潮、经期及规律、痛经史、末次月经、闭经，以及孕数、产数、流产、死胎及计划生育情况。
7. 婚姻史。包括结婚年龄、次数、配偶健康状况，离异或配偶死亡原因。
8. 家族史。直系亲属及兄弟姐妹的健康状况，尤注意传染病史，家属遗传病史及有遗传倾向的疾病。

四、问答题

1. 问诊的内容包括：一般项目、主诉、现病史、既往史、系统回顾、个人史、婚姻史、月经生育史、家族史。
2. 系统回顾应包括八大系统：呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、造血系统、内分泌及代谢系统、神经系统、肌肉骨骼系统。
3. 既往史包括：①有生以来曾经患过的重大疾病（包括各种传染病）尤其与现病史有关的疾病；②外伤手术；③预防接种、过敏（药物和食物）。
4. 现病史包括：①起病情况与患病时间；②主要症状的特点，包括：症状出现的部位、性质、持续时间和程度，缓解或加剧的因素；③发病环境；④病情的发展与演变，包括主要症状的变化或新症状的出现；⑤伴随症状；⑥重要的阴性症状（如不发热，无黑便等）；⑦诊治过程；⑧病程中的一般情况，如食欲及食量的改变，体重的变化，睡眠与大小便的情况等；⑨若患者存在两个以上不相关的未愈疾病时，现病史可分段叙述；⑩凡意外事件或可能涉及法律责任的伤害事故，应详细客观记录，不能主观臆测。
5. 体检时一般状况包括：生命体征及发育、营养、神志意识、查体能否合作、面容、体位、步态等。

(陈琦玲)

第二部分 一般检查及皮肤、淋巴结检查

一、填空题

1. 皮肤粘膜出血的基本病因有三个因素，包括_____、_____及_____。
2. 四肢对称性紫癜伴有关节痛及腹痛、血尿者，见于_____（疾病）。
3. 出血点的直径为_____，紫癜的直径为_____，瘀斑的直径为_____。
4. 稽留热的临床表现为，体温恒定维持在_____℃以上水平，24小时内波动范围为_____℃，常见于_____，_____，_____等疾病。
5. 弛张热的临床特点为：体温常在_____℃以上，24小时内波动范围_____℃，但都在_____水平以上，常见于_____，_____，_____等疾病。
6. 不规则热型在临床常见于_____，_____，_____，_____等疾病。
7. 正常脉搏波由_____、_____、_____三部分构成。
8. 用血压计检测奇脉时，在_____时，收缩压较_____时低10mmHg以上。
9. 检查脉搏应注意查_____、_____、_____、_____、_____。
10. 临床可出现奇脉的疾病主要有_____、_____、_____、_____等。
11. 脉搏呈骤起骤落样，临床称为_____脉，产生机制主要是_____增大所致，最常见于_____（疾病）。
12. 无力型体型主要表现为_____，_____，_____，_____，_____等。
13. 成人男女身体脂肪分布个体差异最小的地方是_____或_____部位。
14. 临床上常用来描述营养状态的三个等级是_____，_____，_____。
15. 体质指数计算公式为_____。
16. 按其病因，可将肥胖分为_____和_____两类。
17. 营养不良的常见原因有_____，_____，_____等方面。
18. 胡萝卜素过多引起的皮肤黄染与黄疸主要鉴别在于前者在_____和_____部位一般不出现黄染。
19. 药物（如呋喃类）引起的巩膜黄染与黄疸的主要鉴别在于_____。
20. 药物过敏所致的皮疹可表现为_____，_____，_____等；猩红热的皮疹多为_____；伤寒的特征性皮疹为_____。
21. 产生蜘蛛痣及肝掌的病理机制是_____，临床常见于_____及_____疾患。
22. 游走性的皮下结节可见于_____，无明显局部炎症，生长迅速的皮下结节应考虑有_____的可能。

23. 淋巴结检查内容应包括 _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ 及 _____ 等项。
24. 浅表淋巴结检查的顺序应是 _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ 及 _____, 以免漏查。
25. 淋巴结急性炎性改变的检查特点有 _____, _____, _____, _____, _____, _____。一般可发现引流区的急性炎症感染。
26. 粘液性水肿面容常见于 _____, 二尖瓣面容常见于 _____ 等疾患。
27. 伤寒面容的特点为: 表情 _____, 反应 _____, 呈 _____ 状态。
28. 脊柱疾病常采用 _____ 的体位, 以减轻脊背肌的紧张度。右侧胸腔积液患者常采用 _____ 的体位, 以利于呼吸代偿。
29. 急性左心室功能不全患者常强迫采用 _____ 体位, 此体位可减轻患者症状的机制为 _____, _____, _____, _____ 等。
30. 冠心病心绞痛发作时常采用 _____ 的体位, 而紫绀型先天性心脏病出现呼吸困难时常自动采取 _____ 的体位, 以缓解症状。
31. 大骨节病或进行性肌营养不良患者常出现 _____ 步态, 而脊髓痨患者常可见 _____ 步态。

二、中文选择题

- 正常人应用口测法的体温范围是
 - 36.0~37.0℃
 - 36.1~37.0℃
 - 36.2~37.1℃
 - 36.3~37.2℃
 - 36.5~37.5℃
- 正常人肛测体温一般比口测值高
 - 0.1~0.4℃
 - 0.2~0.5℃
 - 0.3~0.5℃
 - 0.3~0.6℃
 - 0.3~0.7℃
- 常用腋测法所测的体温正常值为
 - 36.0~37.0℃
 - 36.1~37.1℃
 - 36.2~37.2℃
 - 36.3~37.4℃
 - 36.5~37.5℃
- 关于正常人体温的描述, 下列哪项正确?
 - 24 小时内体温波动小于 0.5℃
 - 上午体温一般高于下午
 - 老年人体温低于青年人
 - 女性月经前期体温低于正常
 - 幼儿体温波动小于成年人
- 下列哪项发热的病因不属于抗原-抗体反应?
 - 大面积烧伤
 - 风湿热
 - 血清病
 - 药物热
 - 结缔组织病
- 关于自主神经功能失常所致发热的特点, 下列哪项不正确?
 - 多为低热
 - 可持续数月甚至数年
 - 热型极不规则

- D. 日体温波动在 0.5°C 以内
E. 伴有其他自主神经功能失调表现
7. 关于外源性致热原所致的发热机制，下列哪项提法不正确？
A. 无菌性坏死组织属于外源性致热原
B. 抗原-抗体复合物属于外源性致热原
C. 直接作用于体温调节中枢
D. 通过激活血液中的中性粒细胞释放内源性致热原
E. 通过激活嗜酸性粒细胞、单核细胞释放内源性致热原
8. 下列哪种物质不属于内源性致热原？
A. 白细胞介素-1
B. 炎性渗出物
C. 肿瘤坏死因子
D. 干扰素
E. 前列腺素 E_2
9. 下列哪种因素引起的发热属于非致热原性发热？
A. 颅脑外伤
B. 无菌性坏死组织吸收
C. 微生物病原体侵入
D. 炎性渗出物
E. 抗原-抗体复合物
10. 下列哪项病变的发热不属于非致热原性发热？
A. 脑出血
B. 癫痫持续状态
C. 甲状腺功能亢进
D. 阿托品中毒
E. 无菌性坏死组织吸收
11. 临床常见导致弛张热的病变，下列哪项不是？
A. 伤寒
B. 败血症
C. 风湿热
D. 干酪性肺炎
E. 化脓性炎症
12. 临床最常用检查脉搏的部位是
A. 颞动脉
B. 颈动脉
C. 桡动脉
D. 肱动脉
E. 股动脉
13. 常检查脉搏至少触摸动脉搏动时间应为
A. 10 秒钟
B. 15 秒钟
C. 20 秒钟
D. 30 秒钟
E. 1 分钟
14. 下列检查脉搏的方法，哪项是正确的？
A. 以示指、中指和环指指腹平放于桡动脉处
B. 以拇指、示指指腹平放于桡动脉处
C. 以示指和中指指腹平放于桡动脉处
D. 以中指和环指指腹平放于桡动脉处
E. 以示指指腹平放于桡动脉处
15. 关于正常成人的脉搏的叙述，下列哪项不正确？
A. 脉率的快慢受年龄、性别的影响
B. 各类心律失常均可出现脉律不规则
C. 脉率可在吸气时增快
D. 心房颤动时脉律可绝对不规则
E. 脉率可与心率不相等
16. 脉搏的强弱与下列哪项因素最有关？
A. 脉律
B. 脉率
C. 脉压
D. 心率
E. 血粘度

17. 心搏量减少时，脉搏检查最可能出现下列哪种现象？
- 脉律不整
 - 脉率减慢
 - 脉搏紧张度增高
 - 无脉
 - 强度减弱
18. 下列哪种疾病一般不出现水冲脉？
- 心力衰竭
 - 甲状腺功能亢进
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 动脉导管未闭
 - 严重贫血
19. 交替脉可在下列哪种疾病中出现？
- 心力衰竭
 - 甲状腺功能亢进
 - 主动脉瓣狭窄
 - 先天性心脏病室间隔缺损
 - 严重贫血
20. 患者女性，28岁，发现左桡动脉搏动消失。既往有风湿病史。最可能的诊断是
- 先天性畸形
 - 大动脉炎
 - 动脉硬化
 - 血栓栓塞性脉管炎
 - 夹层动脉瘤
21. 奇脉可出现在下列哪种疾病？
- 主动脉瓣关闭不全
 - 缩窄性心包炎
 - 扩张型心肌病
 - 高血压性心脏病
 - 病毒性心肌炎
22. 下列哪项不是判断成人发育正常的指标？
- 头部长度的1/7~1/8
 - 头围为身高的1/7
 - 胸围为身高的1/2
 - 坐高约等于下肢的长度
 - 双上肢展开的左右指端距与身高一致
23. 下列内分泌疾患与人体发育的关系，哪项不正确？
- 腺垂体功能亢进——巨人症
 - 儿童垂体功能减退——侏儒症
 - 成人垂体功能减退——Cushing综合征
 - 甲状腺功能减退——呆小症
 - 丘脑-垂体-性腺功能提前——性早熟
24. 下列哪项符合超力型体型的表现？
- 身高普遍较高
 - 颈部较长
 - 肩宽伴下垂
 - 腹上角大于 90°
 - 下肢长度大于坐高
25. 当体重至少低于正常体重的多少比例时，临床称为消瘦？
- 5%
 - 10%
 - 15%
 - 20%
 - 25%
26. 按WHO标准，BMI下列哪项可称为肥胖？
- 男性或女性均为大于25
 - 男性大于25，女性大于23
 - 男性大于27，女性大于25
 - 男性大于25，女性大于27
 - 男性大于29，女性大于27
27. 下列哪项不符合肢端肥大症面容的特征？

- 点?
- 头颅增大
 - 面部变宽
 - 下颌增大并向前突出
 - 唇舌肥厚
 - 耳鼻增大
28. 苦笑面容最常见于
- 肺炎球菌肺炎
 - 脑脊髓膜炎
 - 震颤性麻痹
 - 乙型脑炎
 - 破伤风
29. 面具面容最常见于
- 肢端肥大症
 - 甲状腺功能减退
 - 肠伤寒
 - 震颤性麻痹
 - 流行性脑脊髓膜炎
30. 下列哪项疾病与体位的关系不正确?
- 强迫仰卧位——急性腹膜炎
 - 强迫俯卧位——脊柱疾病
 - 强迫侧卧位——胆道蛔虫症
 - 角弓反张位——破伤风
 - 端坐呼吸——左心功能不全
31. 下列哪种疾病在患病时一般采用辗转体位?
- 心绞痛
 - 急性阑尾炎
 - 大量胸腔积液
 - 胆石症
 - 主动脉夹层
32. 剪刀步态最常见于哪种疾病患者?
- 震颤性麻痹
 - 小脑疾病
 - 巴比妥中毒
 - 脑性瘫痪
 - 佝偻病
33. 醉酒步态最常见于哪种疾病患者?
- 小脑疾病
 - 佝偻病
 - 脊髓痨
 - 腓总神经麻痹
 - 大骨节病
34. 下列哪项不是胡萝卜素含量增多所致皮肤黄染的部位?
- 手掌
 - 足底
 - 前额
 - 鼻部
 - 口腔粘膜
35. 关于皮疹的描述, 下列哪项不正确?
- 玫瑰疹多见于斑疹伤寒
 - 斑疹常见于风湿热
 - 丘疹常见于药物疹
 - 荨麻疹常见于皮肤变态反应
 - 斑丘疹常见于猩红热
36. 关于玫瑰疹的描述, 下列哪项正确?
- 为一多形性丘疹
 - 直径一般小于 2mm
 - 用手指按压可使皮疹消退
 - 多见于四肢、手掌部
 - 常见于药物过敏反应
37. 关于荨麻疹的描述, 下列哪项正确?
- 为皮肤发红的一种斑疹
 - 为皮肤局限性水肿
 - 用手指按压可使皮疹消退
 - 直径一般为 2~3mm
 - 为迟发型皮肤变态反应
38. 判断为紫癜的皮下出血区直径应为

- A. 小于 2mm
 - B. 2~3mm
 - C. 3~5mm
 - D. 5~7mm
 - E. 大于 7mm
39. 蜘蛛痣的产生机制是
- A. 皮肤小静脉末端分支性扩张所致
 - B. 皮肤小动脉末端分支性扩张所致
 - C. 皮肤毛细血管扩张所致
 - D. 皮肤毛细血管瘤
 - E. 皮肤的小动静脉瘘
40. 关于蜘蛛痣分布的区域, 下列哪项正确?
- A. 面部、颈部、手掌部
 - B. 前胸部、上腹部、肩部
 - C. 面部、四肢、肩部
 - D. 上臂部、背部、腹部
 - E. 面颈部、手背部、前胸部
41. 下列哪项描述不符合风湿小结的特点?
- A. 位于关节附近
 - B. 多见于在长骨骺端
 - C. 一般为圆形结节
 - D. 质地较硬
 - E. 有压痛
42. 位于指尖、足趾、大小鱼际肌腱部粉红色结节伴压痛, 最可能是
- A. 风湿小结
 - B. 绦虫囊蚴结节
 - C. 结节性多动脉炎
 - D. Osler 小结
 - E. 结核结节
43. 下列哪项指标对诊断风湿热活动最有意义?
- A. 皮肤出现环形红斑
 - B. 血沉增快
 - C. 关节痛
 - D. ASO 滴度增高
 - E. CRP 阳性
44. 左锁骨上淋巴结主要收集的淋巴液来自
- A. 气管
 - B. 咽喉
 - C. 胸膜
 - D. 肺
 - E. 食管及胃
45. 右锁骨上淋巴结主要收集的淋巴液来自
- A. 肺
 - B. 甲状腺
 - C. 咽喉
 - D. 乳腺
 - E. 食管及胃
46. 患者女性, 50 岁, 发现左腋窝淋巴结肿大, 质地硬, 表面不光滑, 有粘连, 无压痛, 最可能的诊断应是
- A. 肺癌转移
 - B. 胃癌转移
 - C. 乳癌转移
 - D. 结核病
 - E. 淋巴瘤
47. 下列所述的特点哪项不符合恶性肿瘤淋巴结转移的物诊表现?
- A. 质地坚硬
 - B. 表面不光滑
 - C. 可在皮下活动
 - D. 局部淋巴结融合
 - E. 可有压痛
48. 下列哪项不符合淋巴结结核最常见的临床表现?
- A. 呈多发性
 - B. 可相互或与周围组织粘连
 - C. 质地可稍硬, 也可触及波动感

D. 可破溃形成瘘管

E. 最好发于腋窝及腹股沟淋巴结

三、英文选择题

1. Which of the following statements is true concerning the measurement of blood pressure?
 - A. The bladder should encircle approximately 80% of the circumference of the limb
 - B. A cuff that is too small will give an artificially low reading
 - C. Readings from two arms generally vary by more than 20mmHg in a normal patient
 - D. It is not necessary to fully deflate the cuff before repeating a measurement
 - E. The pressure at which Korotkoff sounds disappear should be read as the systolic blood pressure
2. A 47-year-old woman is referred to your office for treatment of stage 2 hypertension. Which of the following descriptions is the criteria for moderate or stage 2 hypertension?
 - A. A diastolic blood pressure reading of 155mmHg
 - B. A diastolic blood pressure reading of 190mmHg
 - C. A diastolic blood pressure reading of 95mmHg
 - D. A diastolic blood pressure reading of 105mmHg
 - E. A diastolic blood pressure reading of 115mmHg
3. A 23-year-old man attends a party where he drinks three glasses of wine. In a short period of time, he develops facial erythema and experiences severe facial flushing. Which of the following is the most likely diagnosis?
 - A. Alcohol dehydrogenase deficiency
 - B. Glucuronyl transferase deficiency
 - C. Aldehyde dehydrogenase deficiency
 - D. Angioedema
 - E. Photosensitivity reaction
4. Which of the following statements is true regarding adult body mass index (BMI)?
 - A. Overweight is defined as a BMI of 20-24kg/m²
 - B. Obesity is defined as a BMI of over 30kg/m²
 - C. Morbid obesity is defined as a BMI of over 35kg/m²
 - D. Moderate malnutrition is defined as a BMI of below 18kg/m²
 - E. Normal BMI is defined as 18.5-24kg/m²
5. A 31-year-old man presents to the emergency room 3 days after undergoing a hernia repair operation. He is febrile and hypotensive. The symptoms began with the sudden onset of a diffuse, maculopapular rash that was pruritic and erythematous. On cutaneous examination, the erythroderma involves the palms and soles and is beginning to desquamate. The