


牛病治療法

徐劍虹編著

上海傳書局出版

牛的骨骼部位圖



牛的骨骼名稱

1. BW. 第一胸椎 13Bwv. 第十三胸椎 D. 肩骨 E. 尺骨 G. 頸前骨 1. H. 第一腰椎 7. H. 第七腰椎
H. 腰椎 I.M. 肩前骨 K. 肩骨 Kn. 肩蓋骨 1L. 第一腰椎 GL. 第六腰椎 O. 腹骨 (A. 上腳骨) R.
第一肋骨 6R. 第六肋骨 13. R. 第十三肋骨 RKn. 肋軟骨 S. 腹帶 Sch. 腹骨 Schs. 劍狀軟骨
Schs. 腹蓋骨 1. Schw. 第一尾椎骨 Se. 上橈子骨 Se'. 下橈子骨 Si. 坐骨 Sp. 楔骨 Spr. 楔齒
St. 胸骨 U. 下頸骨 VF. 腕骨 VM. 腕前骨 W. 腕骨 1,2. 及 3VZ. 第一、第二、第三指骨 1. 雜狀突
起 2. 雜狀突起 3. 下顎骨 4. 頸孔 5. 頸上突 6. 頸下突 7. 層脾棘 7'. 層脾 8. 層脾軟骨 9. 上
肺附頭 10. 上頸大結節 11. 頸下筋之附着部 12. 三角筋粗短部 13. 上頸伸筋上頭 14. 風蝶突起
15. 尺骨雜狀突起 16. 橫骨之纏輪 17. 脊砧節 18. 頸砧節 19. 外弧形線 20. 坐骨棘 21. 坐骨結節
22. 股骨頭 23. 大轉子 24. 發育不全的第三轉子 25. 小轉子 26. 臀窩 27. 股骨外上頭 28. 腹骨頭
29. 腹肉溝 30. 腹骨外上頭 31. 股骨外帶車突起




牛的表層諸筋部位圖



牛的表層諸筋名稱(一)

- a. 頸項牽筋 a'. 頸有上臂牽筋及三淺魚筋 b. 上唇下掣筋 c. 瞼筋 c'. 頸筋又深筋 d. 下唇下掣筋
e. 頸骨筋 f. 咬筋 f. 咬筋 g. 前頭筋 g'. 眼臉輪匝筋 h. 術狀筋 i. 耳下掣又下耳筋 kk'. 內轉耳筋
筋 l. 短裏耳筋 m. 頸部骨筋筋 m'. 腦部骨筋筋 n. 橫肩胛筋 o. o', o'', o'''. 肩筋骨 o. 頸骨後頭筋
o' 頸骨乳頭筋 o''. 頸骨腱 o''''. 頸骨部 p. 胸骨頭筋 p'. 胸骨乳頭筋 q. 胸骨舌骨筋 r. 深胸筋
s. 深胸骨 t. 腹背筋 u. 下齡筋起始 v. 外斜腹筋 v'. 外斜腹筋之腱 w. 內斜腹筋 x. 後上斜筋 y.
背腰筋膜 z. 離骨筋 l. 三角筋之筋膜 2. 三角筋肩胛部 2'. 三角筋肩胛部 3. 三頭肌筋外頭 3'. 三
頭肌筋長頭 4. 前腹筋膜張筋 5. 上腹筋 6. 橫側腹伸筋又大腹前伸筋 7. 中腹筋 8. 腹斜肌筋 9. 深
骨筋內部 9'. 深骨筋外頭 10. 10'. 最大筋又二頭股筋 11. 平腹橫筋 12. 腹筋膜 13. 腹直肌筋 13'.
內頭肺筋 14. 肋橫脈 15. 肝下膜 16. 膜下膜 17. 肋橫膜 18. 腹脾筋 19. 脊髓突起 20. 胸骨 21.
腹結節 22. 坐骨結節 23. 腰蓋骨 24. 25. 腎尾筋 26. 外轉尾筋 13R. 十三肋骨

牛的表層諸筋部位圖



牛的表層諸筋名稱(二)

①前腿及指外側的諸筋(左前肢) a. 機側腕伸筋 b. 同有第三指伸筋 b'. 上筋腱 c. 繩指伸筋 c'. l. 筋腱 d. 同有第四指伸筋及其腱 e. 尺側腕伸筋 e'. 上筋腱 f. 長指外鵝筋 f'. 深指風筋腱之尺骨頭 g. 尺膜筋 h. 中骨間筋 i. 風腱 i'. 自中骨間筋至風腱之腱 k. 自中骨間筋至伸腱之腱 8. 筋嘴 j. 副腕骨 12'. 第三腕前骨結節

②前腿及指內側的諸筋(左前肢) a. 二腹筋下端 b. 上膜筋的下端 c. 機側腕伸筋 c'. 上筋之腱 d. 尺部外鵝筋之腱 o. 週前圓筋 f. 機側風筋筋(內腕前風筋) f'. 外筋之腱 g. 尺側腕圓筋(中腕前風筋) g'. 上筋腱 h. 淺指風筋淺頭 h'. 上筋腱 i. 淺指風筋的深頭 i'. 上筋之腱 i'. i'. 淺指腱 k. 深指風筋之上腱頭 k. 深指風筋尺骨筋 1. 深風腱 n. 腱頭 o. 中骨間筋 o'. 上筋之腱 p. 同有第三指伸筋之腱 q. 三頭膜筋之內頭 1. 上導骨 2. 犀嘴 3. 機骨 4. 腕骨 5. 腕前骨 6. 橫掌腱膜帶 7. 第一指骨關節之輪狀韌帶 8. 內頭後腱

③下頸部及足部左側諸筋(後肢)

④上筋之腱 d. 尾趾伸筋之深頭 d'. 上筋之筋 e. 長腓伸筋之淺頭 e'. 上筋之腱 f. 同有第四指伸筋 f'. 上筋之腱 g. g'. 深趾屈筋 g. 長指屈筋 g'. 後腕骨筋 g''. 深風腱 h. 二頭肌筋筋之外頭 h'. 同西列司之腱 i. 比目魚筋 k. 淺風腱 l. 中骨間筋 l'. 上筋之腱 m. 自中骨間筋至淺風腱之腱 1. 外直膝蓋韌帶 2. 中直膝蓋韌帶 3. 內直膝蓋韌帶 4. 外側膝蓋韌帶 5. 6. 伸腱之橫韌帶 7. 第一指骨關節輪狀韌帶 8. 第一指骨部輪狀韌帶 9. 腓骨筋 10. 跟骨結節(外附骨結節) 11. 跟骨 12. 跟腱外側韌帶

目次

第一篇 內科

| | |
|---------|----|
| 第一章 消化器 | 一 |
| 第一節 口腔病 | 一 |
| 第二節 咳嗽病 | 二 |
| 第三節 嘴好病 | 三 |
| 第四節 胃腸病 | 四 |
| 第五節 腹膜病 | 五 |
| 第二章 呼吸器 | 一一 |
| 第一節 鼻腔病 | 一一 |
| 第二節 喉頭病 | 一二 |
| 第三節 氣管病 | 一五 |
| 第四節 肺病 | 二七 |
| 第三章 循環器 | 二二 |
| 第一節 心臟病 | 二二 |
| 第二節 血液病 | 三一 |

| | |
|----------|----|
| 第四章 泌尿器 | 三五 |
| 第一節 膀胱病 | 三五 |
| 第五章 運動器 | 三八 |
| 第一節 敗骨病 | 三八 |
| 第二節 圓筋病 | 三九 |
| 第三節 高牛土疾 | 四一 |
| 第六章 神經系 | 四二 |
| 第一節 腸質血 | 四二 |
| 第二節 脾充血 | 四三 |
| 第三節 暈熱病 | 四四 |
| 第七章 中毒 | 四六 |
| 第一節 個科中毒 | 四六 |
| 第二節 藥物中毒 | 四七 |

第二篇 外科

| | |
|----------|----|
| 第一章 創傷 | 四九 |
| 第一節 挫傷 | 五四 |
| 第二節 火傷 | 五五 |
| 第三節 成臼 | 五七 |
| 第四節 捻挫 | 五九 |
| 第五節 脊骨骨折 | 六〇 |
| 第六節 鋸骨骨折 | 六〇 |
| 第七節 腰痛 | 六一 |
| 第八節 脱關節炎 | 六二 |
| 第九節 角脫落 | 六三 |
| 第一章 肿瘍 | 六三 |
| 第一節 乳瘡腫 | 六四 |
| 第二節 腫瘍 | 六五 |
| 第三章 食道閉塞 | 六六 |
| 第四章 蜂窩織炎 | 六八 |

第三篇 產科

| | |
|------------|----|
| 第一章 產前 | 七一 |
| 第一節 膜脫 | 七一 |
| 第二節 子官歇兒尼亞 | 七二 |
| 第三節 子宮捻轉 | 七四 |
| 第四節 亂癥 | 七八 |
| 第五節 婦娠浮腫 | 七八 |
| 第六節 流產 | 七九 |
| 第七節 陰胎術 | 八二 |
| 第二章 難產 | 八三 |
| 第一節 胎勢不正 | 八三 |
| 第二節 胎向不正 | 八九 |
| 第三節 胎位不正 | 九〇 |
| 第三章 產後 | 九一 |
| 第一節 胎盤停滯 | 九二 |
| 第二節 子宮脫 | 九五 |
| 第三節 產褥麻痺 | 九九 |

| | |
|----------------|------------|
| 第四節 產褥熱 | 一〇二 |
| 第五節 不能起立 | 一〇四 |
| 第六節 子宮出血 | 一〇四 |
| 第七節 產後陣痛 | 一〇五 |
| 第八節 乳房炎 | 一〇五 |
| 第九節 乳頭病 | 一一〇 |
| 第四章 不妊症 | 一一二 |
| 第一節 子宮外膜炎 | 一一三 |
| 第二節 子宮腔部炎 | 一五五 |
| 第三節 黃體囊腫 | 一五五 |
| 第四節 卵巢囊腫 | 一七七 |
| 第五章 犠牛病 | 一一八 |
| 第一節 初生兒假死 | 一一八 |
| 第二節 初生兒便祕 | 一九 |
| 第三節 牛牛下痢 | 一九 |
| 第四節 牛牛脾帶炎 | 二〇 |

第四篇 眼科

| | |
|-------------------|------------|
| 第一章 結膜病 | 一二二 |
| 第一節 加答兒性結膜炎 | 一二三 |
| 第二節 結膜實質炎 | 一二三 |
| 第二章 角膜病 | 一二五 |
| 第一節 表層性角膜炎 | 一二五 |
| 第二節 角膜皮膚 | 二六 |
| 第三章 瞳膜損傷 | 一二六 |
| 第四章 眼窩骨折 | 一二七 |
| 第五章 牛盲症 | 一二八 |
| 第五篇 寄生蟲 | |
| 第一章 消化器寄生蟲 | 一二九 |
| 第一節 胃蟲 | 二九 |
| 第二節 肝蛭 | 三〇 |
| 第二章 循環器寄生蟲 | 一三一 |

體發熱

一三一

第三章 眼寄生蟲

一三三

第一節 淚蟲

一三三

第二節 牛絲狀蟲

一三三

第四章 皮膚寄生蟲

一三五

第一節 斑癩

一三五

第二節 烫性匐行疹

一三六

第三節 蟲病

一三七

第六篇 藥物

第一章 家畜藥品用量比較表

一四一

第二章 藥品用量表

一四一

第三章 家畜年齡與用量比例

一四一

第四章 調劑用具及容量表

一四二

第五章 牛病常用藥方

一四二

第七篇 其他

第一章 生理狀態

一五五

第二章 牛病診斷

一五七

第三章 牛病看護

一六四

【附】看護公約

一六七

牛病治療法

獸醫士徐劍虹編譯

第一篇 內科

第一章 消化器

第一節 口腔病

一、加答兒性口炎，即口腔加答兒，紅斑性口炎，單純口炎等，所謂口粘膜之加答兒性炎症。


原因 初發的原因——外傷（為尖銳粗硬之飼料、異物，齒面不正，粗暴之口腔檢查等因）化學的刺激物（吐酒石、昇汞、石炭酸、礦砂等）有毒植物，高熱度之飲食物，生微飼料，（蔬菜微、苜宿微）水銀中毒等。其他如乳房疾患及口蹄疫之病牛乳所哺育之犢亦有發生。續發的原因——消化器病及熱性病之經過中。其他隣接部位發生炎症，因全身營養障礙而發生本病者。

病狀 輕症者最初口粘膜之知覺過敏而乾燥、增溫，舌面生灰白苔，唇類粘膜潮紅。

唾液起初減少，後則增加，口內有甘臭味。重症者，唇齒齦頰之粘膜潮紅、腫起、流唾液、食慾減退。


治療法 調節

食物、飼以綠餌、及新鮮乾草、及麥麩等，重症者，則以清水，醋水（一—一〇）食鹽水、硼酸水（二—三%）有臭氣者，則以來蘇兒水（〇·五—一%）、唾液，粘



圖一 左內臟位置

a.脊梁 b.食道 c.氣管 d.第一肋骨 e.心臟 f.肺臟 g.胸骨
h.胃 i.後助骨 j.直腸 k.膀胱 h₁.第一胃 h₂.第二胃



圖二 右內臟位置

a.脊梁 b.食道 d.第一肋骨 e.心臟 g.胸骨 h.胃 j.直腸
l.子宮 m.腸 h₁.第一胃 h₂.第二胃 h₃.第三胃

液分泌旺盛者，則以單寧酸、明礬液等洗滌之，消毒藥則以 *Kaliunpermanganicum*，

Tryptophleavin Solatio Lingüli, 等為一般所常用。

二、水疱性口炎，即為口腔粘膜之上皮層下發生漏溜漿液之水疱。

原因 因生蠶之飼料而起。

病狀 口腔粘膜潮紅灼熱，知覺過敏，於唇、頰、舌、口蓋等部份發生水疱。潰破後則成鮮紅色之爛斑，八——〇日後，即痊癒而無痕跡。因水疱潰破後而覺疼痛故食慾減少。水疱之外，並有加答兒性口炎之症候，粘膜潮紅而流涎。亦有時於乳房四肢發生丹毒性皮膚炎者。

治療法 與加答兒性口炎同。

第二節 唾腺病

流涎症：因唾液之分泌增加，及唾液之嚥下發生困難而起，但並非一獨立之症，乃為種種疾病之一症候而已。

原因 因口腔及咽頭粘膜之炎症，唾腺之實質性炎症，異物嚥下障礙，產褥麻痺，藥品中毒（水銀、尼古丁，）等而發生。

病狀 唾液流於口邊而成泡沫，或垂於口角。咽頭麻痺者，則口內有多量唾液瀦

溜，強使開口，則有多量惡臭唾液流出。

治療法 主以 Atropinum 「〇·〇一—〇·〇一」行皮下注射有一時之效。口內頻頻以消毒，收斂劑洗滌之。

第三節 嗜好病

舐病：本病爲不食普通飼料，而好食消化不良之異物，或舐之。

原因 確實之原因不明，大概係因消化器之疾病，如慢性胃腸加答兒，或係骨軟症之原因，舐癖之症候，乃係缺乏「唯他命」之原因。

病狀 起初食慾及反芻減退、便祕，繼而食慾常常改變，終而嗜好異物，如石壁、栓棒、木柵、門窗等均喜嗜咬嚼，在野外則好食惡草，真正之食物則不喜愛，有易驚駭性，對其脊柱迫壓之，則知覺過敏。如此症狀繼續二四個月後，食慾更爲之一變而好食異物，胃之運動及反芻微弱，受胎力減退，易流產，往往併發「骨軟症」。糞便初爲乾固而有粘液，後則柔軟而有惡臭。體溫微昇（〇·五十一·五度）脈細而少。（一七〇—一八〇）呼吸如常，漸加疲瘦，遂陷於惡液質而餓死。

經過 非常緩慢，爲二十四個月，有長及一年者。

預後，如不將原因除去而陷於消化不良者則難治療。

治療法 原因療法為主。即轉換飼料及實行放牧，投以健胃藥，如以唯他命，（普通綠草）則更為有效。

〔方〕人工泉鹽

杜松子末

二五〇·〇
一〇〇·〇

右一日間適宜分服之
〔方〕食鹽

龍胆末

五〇〇·〇
一〇〇·〇

〔方〕希鹽酸

苦味丁蟲

二五〇·〇
二〇·〇

〔方〕食鹽

杜松子末

二五〇·〇
二五〇·〇

水

一〇〇·〇

每次飼食給與一把
水

爲使其食慾變更可以：

〔方〕鹽酸阿瀉嗎啡

〇·一——〇·一三
一五·〇

〔方〕鹽酸阿瀉嗎啡

〇·〇六——〇·〇八
一〇·〇

水

一水

〔方〕鹽酸阿瀉嗎啡
右同上（小牛）

預防法

農場施以硝石肥料，飼以新鮮乾牧草，並改善牧場之排水設備。

第四節 胃腸病

一、急性胃腸炎答兒（見圖三）

原因 為飼養失宜。即爲過食，飼料之冷熱，配合不均，(偏食)變敗，不潔，冬季放牧，感冒，勞動過度，及長途驅逐等。續發性者爲急性病之感染。

病狀 食慾缺乏，沈鬱，曲背，反芻

作用衰退，垂耳，茫然凝立，被毛聳立結膜潮紅。第一胃運動減弱，左謙部膨大而粘硬，打診則發濁音。通便遲滯，量少，乾固而帶暗色，甚臭。乳量減，熱度稍昇，脈搏小而硬次數增加。

經過 輕症於十日內可以轉佳，重症者則轉變胃腸可以致死。

治療法 嚴行除去原因，注意食物，使胃得以休養，給與少量青草、乾草、或麩汁。按摩左腹，須除去宿糞。

〔方〕桂鹽散
水

1000.0

以上一日二——三次反復服之

