

家用成药常识

中国医药公司江苏省公司編



江苏人民出版社

家用成药常識

中国医药公司江苏省公司編

江苏新华书店出版业许可証出〇〇一〇

江苏人民出版社出版

南京湖南路七号

新华书店江苏分店发行 江苏新华印刷

*

开本 787×1092 耗1/32 印张 2 15/16 字数 5

一九五七年二月第一版

一九五七年二月南京第一次印刷

印数 1—13,000

統一書号：T14100·57

定 价：(5)二 角

615
C63

前 言

我們为了配合成藥下乡，曾于一九五五年初編写了一本“常用藥品下乡手冊”，当时主要是給各地供銷社營業員作为业务学习資料。該手冊着重介紹一般常用成藥常識，对提高群众使用成藥知識是有一定帮助的，因此也受到很多人的欢迎。在实现了农业合作化后，人民的生活水平日益提高，对医药用品更为需要。在这新情况下，我們便將“常用藥品下乡手冊”加以刪改，編写成这本书，供农业社保健員，农村中、小学教师，区乡干部，文化館(站)干部以及广大农民和城市居民参考。

这本书所介紹的成藥，其中有39种是中央卫生部核定处方的，另外还包括本省各地常用的成藥和卫生用品。为了方便起見，根据藥品的应用范围，划分为几大类，然后分別說明各种藥品的成份、含量、应用范围、用法及用量、注意事項等。

各种不同的藥品具有各种不同的效用，必須确知疾病，才可向供銷社、藥房購買藥品，对症下藥，并按本书規定的用法、用量或仿單說明使用，这样可以治疗或預防一些常見的疾病。如果弄不清是什么病或不懂成藥的效用，切勿随便使用，应当請医生診治，以免延誤治疗。

中國医药公司江苏省公司

目 录

解热止痛藥	(1)
一 解热止痛片	(1)
二 阿斯匹林片	(3)
三 小儿退热片	(4)
四 水楊酸鈉片	(5)
治瘧疾藥	(7)
一 止瘧片	(7)
二 奎宁丸	(8)
三 小儿瘧疾片	(9)
止咳祛痰藥	(10)
一 止咳祛痰片	(11)
二 咳嗽糖漿	(12)
三 小儿止咳糖漿	(12)
四 鹽酸麻黃素片	(13)
治腸胃病藥	(14)
一 胃痛片	(14)
二 健胃片	(16)
三 酵母片	(17)
四 小儿消食片	(18)
五 小苏打片	(19)
六 止瀉片	(20)
七 大黃苏打片	(21)

八 輕瀉片·····	(22)
九 潤腸果子糖·····	(23)
抗菌消炎藥 ·····	(24)
一 消炎片·····	(24)
二 小兒消炎散·····	(25)
三 止痢片·····	(26)
四 青霉素片·····	(28)
滋補營養藥 ·····	(29)
一 維生素甲丁膠丸·····	(29)
二 維生素甲丁滴劑·····	(31)
三 麥精魚肝油·····	(32)
四 乳白魚肝油·····	(32)
五 鹽酸硫胺片·····	(33)
六 抗壞血酸片·····	(34)
七 補血片·····	(35)
八 口服葡萄糖·····	(37)
九 丁維葡萄糖·····	(38)
十 小兒健身片·····	(39)
十一 乳酸鈣片·····	(40)
十二 葡萄糖酸鈣維生素D片·····	(41)
婦女用藥 ·····	(42)
一 調經片·····	(42)
二 媽媽多·····	(43)
三 生乳藥·····	(44)
驅蛔蟲藥 ·····	(45)
一 宝塔糖·····	(45)

二	驅蛔虫片.....	(46)
夏令藥.....		(48)
一	十滴水.....	(48)
二	人丹.....	(49)
三	清涼丹.....	(50)
四	清涼油.....	(51)
喉頭含服藥.....		(51)
	薄荷喉症片.....	(51)
外用藥.....		(53)
一	紅藥水.....	(53)
二	紫藥水.....	(54)
三	碘酊.....	(55)
四	癬藥水.....	(56)
五	牙痛水.....	(57)
六	耳底藥水.....	(58)
七	青霉素軟膏.....	(58)
八	磺胺嘧啶軟膏(消治龍藥膏).....	(59)
九	剋癩藥膏.....	(60)
十	瘡藥膏.....	(61)
十一	凍瘡膏.....	(62)
十二	磺胺粉.....	(63)
十三	疥子粉.....	(64)
十四	甘 油.....	(65)
十五	松节油搽劑.....	(66)
十六	酒精.....	(66)

眼藥	(68)
一 眼藥水	(68)
二 消炎眼藥膏	(69)
三 眼藥膏	(70)
治疥藥	(71)
一 疥瘡膏	(71)
二 苯甲酸苯擦劑	(72)
消毒殺菌藥	(73)
一 滴滴涕油劑	(73)
二 滴滴涕乳劑	(75)
三 滴滴涕粉	(76)
四 六六六粉	(77)
五 六六六乳劑	(79)
六 臭藥水	(79)
七 來蘇兒	(80)
八 樟腦丸	(81)
衛生用品	(81)
一 脫脂棉	(81)
二 脫脂紗布	(82)
三 紗布綳帶	(83)
四 膠布	(83)
其他用藥	(84)
一 糖精	(84)
二 豬胃藥(家畜農藥)	(85)
附錄一 藥用單位	(87)
附錄二 老幼劑量折算表	(88)

解 热 止 痛 藥

这类藥物的主要作用是：改变人体体温，調節机能，使表面血管擴大而使体温散發，促使熱度下降，故能解熱。此外，也有止痛作用，所以叫做解熱止痛藥。

— 解热止痛片

主要成份：每片含：阿斯匹林0.2268克，非那西汀0.162克，咖啡因0.0324克。每片重0.5克。

性状：本品是白色，无臭，略有酸而帶苦味的藥片。

应用范围：主要用于神經性头痛，胸部疼痛，伤风感冒，关节痛。有鎮痛、发汗、退热等作用。

說明：

1. 热病俗称发燒，医学上叫发炎，也叫发热。病人服藥后，身体热度(溫度)漸漸降低，并止疼痛。

2. 人体的正常溫度，随各人年齡大小而略有不同，一般兒童的体温較成人稍高些，男人的体温比女人高一些。成人的正常体温，大約在攝氏表36.5度到36.9度之間。体温超过正常溫度，通常称为发热。发热在攝氏37度到38度間为微热，在38度到39度間称为中等热，在39度到41度左右称为高热。总之，

凡是体温超过摄氏37度的，就是属于病态。

3.解热止痛片中含阿斯匹林和非那西汀，都是解热药；用于流行性感冒、支气管炎，不但能解热，同时对因发热而引起的头痛、神经痛等，有镇痛作用。咖啡因是一种兴奋强心药，能解除病人的疲劳。这三种药配合在一起，是一种良好的解热止痛药。

用法及用量：成人每天3次，每次1片。如果服用1片后仍不止痛，可过半小时后再服1片，一昼夜连续服用4—6片为止。六十岁以上老年人及15—18岁的青少年，服成人用量的 $\frac{3}{4}$ 。12—15岁，服成人用量的 $\frac{3}{5}$ 。饭后用温开水吞服。

注意事项：

1.本品是一种“剧药”，服用时不可超过上述规定用量，如果服用过量，会发生中毒现象，如呕吐、发疹块、下痢，甚至虚脱等等。又因为片中含有咖啡因成份，服多后会使人精神过度兴奋而夜间睡不着，因此要注意用量。

2.12岁以下小儿最好服用“小儿退热片”。

包装：每瓶12片或每袋2片。



保管方法：此药在空气中或在日光下，容易分解、风化而失去效用，所以不可与空气和日光接触，必须放在干燥避光处保存。

二 阿斯匹林片

主要成份：每片含阿斯匹林0.5克。

性狀：阿斯匹林片是白色、无臭、微帶酸味的小圓片。在潮湿空气中易分解成醋酸与水楊酸，失去原有治病作用。

应用范围：本品用途很广，对伤风、感冒、头痛、发烧、关节炎等，都可以用它治疗。

說明：

1. 阿斯匹林是最普通的解热鎮痛藥，此藥对感冒不但能退热，并且对发烧所引起的头痛、肌痛、关节痛都有鎮痛作用。

2. 阿斯匹林的特点：作用緩和；入腸后，遇腸液就开始分解，生成水楊酸及醋酸鹽，被腸吸收后产生解热鎮痛作用。

用法及用量：成人每次服1片，每天不可超过3片。60岁以上的老年人及15—18岁的青少年服成人用量的 $\frac{3}{4}$ 。12—15岁每次服半片，每天不可超过一片半。飯后用溫开水吞服。

注意事項：

1. 阿斯匹林是一种酸性藥物，不可与碱性藥物（如小苏打等）同时服用。

2. 有的人服阿斯匹林片后身上发皮疹，气喘，血管神經性浮腫等。服阿斯匹林片后有这种反应的人，可以改用其



他藥品。有哮喘病的人不宜服這種藥。

3. 如果服後不退熱，應請醫生診治。

4. 患持續性的高熱者，如肺病、傷寒等，不可服用本品。

包裝：每袋裝2片，每50袋裝一盒。

保管方法：此藥受潮後容易分解，應當保存在乾燥避光的地方。

三 小兒退熱片

主要成份：每片含：阿斯匹林0.0567克，非那西汀0.041克。

性狀：小兒退熱片是白色、無臭、略有酸而帶一點苦味的小圓片，久露在空氣中容易潮解。

應用範圍：小兒傷風發熱，輕微頭痛而沒有嚴重的病症，可用小兒退熱片。如果用此藥片1—2天後不見效，必須請醫生診治。

說明：

1. 一般的傷風感冒症狀：喉嚨發干疼痛，鼻子發癢，打噴嚏，鼻子不通，煩躁不安，輕微發熱，胃口不開等。小兒如有以上病狀可用小兒退熱片醫治。

2. 發熱的疾病很多，例如腹部疼痛所引起的發熱，胸部疼痛發熱，腹瀉發熱等。如果小兒不是因為傷風感冒所引起的發熱，應該趕快請醫生診治，不可隨便服用小兒退熱片。

用法及用量：5個月到1歲的小兒，每天服3次，每次 $\frac{1}{3}$ 片。1—2歲，每天3次，每次 $\frac{2}{3}$ 片。2—4歲，每天3次，每

次1片。4—6岁，每天3次，每次1.5片。6—8岁，每天3次，每次2片。



注意事項：

1. 此藥不可多服。多服后，有时会发生嘔吐，发疹(风疹块)，下痢，甚至会发生虚脱。所以一定要按照規定用量服用，或听从医生指导使用。

2. 在服藥期，不可同时服用其它碱性藥品，如小苏打片等。

3. 不滿5个月的嬰兒禁止服用本品。

包裝：每管或瓶20片，每袋4片。

保管方法：放在阴暗干燥地方，密閉保存。

四 水楊酸鈉片

主要成份：每片含水楊酸鈉0.3克或0.5克。

性狀：本品为无色或微显淡紅色的藥片，微帶特殊的臭气，略有甜咸味，能溶化于水中，在空气中易吸收潮气，遇光后容易變質。

应用范围：本品主要用于风湿病，有鎮痛退热作用。对神經炎、流行性感冒、咽头炎及扁桃腺炎，也有治疗作用。

說明：

1. 风湿病有急性和慢性兩種。慢性病症：病人很少发热，关节疼痛不很剧烈，关节表面紅腫也不明显，往往因为活动时

間太多，天气潮湿寒冷等而发作或疼痛加重。急性病症：有时发高烧（体温达摄氏38度至40度），一般的数星期后体温才渐渐下降；在发烧时常有面色发红，胃口不好，大便不通，小便发黄，全身大汗，关节发红、肿痛，成对称的大关节常同时发炎等病状。

2. 治疗风湿病，需用水杨酸钠较大剂量，才能完全解除风湿病的疼痛与发热症状，但是此药有毒性反应，在使用时最好由医生来决定用量。

用法及用量：

1. 本品用于一般的病症，每天可服3次，每次1—2片，与等量的小苏打（碳酸氢钠）同时服用，以防在胃内分解时，胃壁受刺激，另方面使尿不致呈酸性，以免在尿内分解出柳酸而刺激肾脏。

2. 本品用于风湿病，每天用量5—10克，分为6次服用，每4小时服一次，或1—2小时服1克至1.2克，服用7—8次后停药1天或半天，再继续服用，直至症状消失后两星期为止。

注意事项：在服用此药时如有微毒性反应，例如恶心、食欲不振、耳鸣等，可不必停药；如果在服药时遇有较严重的毒性反应，如呕吐、耳聾、心悸等症状，应该减少剂量，或改用其他药物治疗。

包装：分500片或1000片瓶装。

保管方法：放在密封容器内，并要放在避光、避热的地方保存，以防变质。

治 瘧 疾 藥

凡瘧原虫寄生于人体所產生的病症，称为瘧疾。
能治療或預防瘧疾的藥物，称为治瘧疾藥。

一 止瘧片

其他名称：鹽酸氯胍片、百乐君片、氯苯胍片。

主要成份：每片含鹽酸氯胍0.1克。

性狀：本品白色，
无臭，味苦，能溶化在水
中，見日光顏色变深。


应用范围：

1. 本品为現在治疗
惡性瘧疾最好的藥，对于惡性瘧原虫的各个生活阶段都有杀
灭作用，所以能够根治惡性瘧疾。

2. 本品用于預防瘧疾病的傳染，也是目前最普遍应用的
一种有效藥。

說明：

1. 瘧疾病俗稱打摆子或冷熱病。根据瘧疾的寄生虫来分
类瘧疾共分3种：一种是間日瘧，就是隔1天发作1次；一种
是3日瘧，是隔兩天发作1次，這兩种都叫良性瘧，它們发作
時間都是有一定規律的；另外还有一种惡性瘧，发作時間沒
有規律。



2. 止瘧片對治療惡性瘧效用最好，但是作用較慢，因此對嚴重急性瘧疾發病時，應該先用奎寧或阿的平把病勢壓下後，再用百樂君來治，這樣就可根除。

3. 止瘧片如果作預防用，最好是在夏秋兩季瘧疾流行期間使用。

用法及用量：成人治療用量：第1天服4次，每次1片；以後每天3次，每次1片；止瘧後再服用7—14天（每兩天服1次，每次1片），以防止復發。60歲以上的老人及15—18歲的青少年，服成人用量的 $\frac{3}{4}$ 。12—15歲服成人用量的 $\frac{3}{5}$ 。8—12歲，服成人用量的 $\frac{1}{2}$ 。8歲以下的最好服用小兒瘧疾片（優奎寧）。

注意事項：此藥片是一種劇藥，如果用量過大，可能發生噁心，嘔吐，腹瀉，尿中含血等現象。小兒和懷孕婦女不宜服用。8歲以下的小兒最好用小兒瘧疾片。孕婦最好服用阿的平。

包裝：每管30片或12片裝。

保管方法：本品見光後容易變質，故須放在密閉的、不透光的棕色瓶或藍色瓶中保存。

二 奎寧丸

主要成份：每粒含重硫酸奎寧0.12克。

性狀：本品為白色無臭的糖衣丸劑。

應用範圍：預防和治療瘧疾。

用法及用量：成人每天服3次，每次2至3粒，連服5—7

天后停止服用。如果病勢仍未好轉或者復發，則須停服几天后再連服7天，按照以上用量及用法至病痊愈為止。不可中途停止。小兒用量可依年齡酌減，詳見老幼劑量折算表；如果能買到“小兒瘧疾片”，還是採用小兒瘧疾片為好。

注意事項：

1. 本品對子宮有刺激作用，孕婦忌用，防止流產。

2. 本品如果長期服用或用量太大，能發生耳鳴、眼花、嘔吐、發疹等現象，因此必須按照規定用量或遵照醫生處方服用，不可亂用。

3. 奎寧這種藥的原料大部分是國外進口的，而且副作用也較“止瘧片”為大，在一般情況下應盡量採用止瘧片。

包裝：分100粒、500粒、1000粒瓶裝三種。

保管方法：本品露在空氣中容易風化變質，故保管時須嚴密封塞，避光，避熱，避潮。



三 小兒瘧疾片

主要成份：每片含碳酸乙酯奎寧(優奎寧)0.1克，每片重0.2克。

性狀：本品是白色，無臭，幾乎無味的小圓片，在水中稍能溶化，見光顏色變深。

應用範圍：主要用于瘧疾(俗稱打擺子)。



說明：此藥片比其他抗瘡藥毒性低，而且沒有強烈的苦味，很適合小兒服用。

用法及用量：每天3次。1歲以下每次服半片。1—2歲，每次1片。3—4歲，每次一片半。5—6歲，每次2片。7—8歲，每次3片。服用時可將藥片磨碎放在湯匙里，用溫開水沖服。

注意事項：

1.服用此藥時，不可同時喝茶、咖啡及吃鐵質補血藥等，以免此藥發生變化而減低治病作用。

2.此藥雖較其他奎寧類藥物毒性低，但是服量過多，也會發生嘔吐、發疹、耳鳴（耳朵里嗡嗡的響），甚至有虛脫現象，因此一定要按照規定的用量或醫生處方服用。

包裝：每瓶15片。

保管方法：此藥見光後容易起變化，保存時應該避光，放在棕色或藍色瓶中。

止咳祛痰藥

此類藥能使咽喉粘膜滑潤，可以減輕因受刺激所引起的咳嗽。