

中獸醫診斷學

游正心編著

畜牧獸醫圖書出版社

凡 例

1.此書的編写，是初次有系統的来敘述診斷学上合理的部分。

2.本書分为九編：第一編述明中兽医診斷学之概論，第二編为一般檢查，第三編为望診，第四編为聞診，第五編問診，第六編为切脉，第七編为触診，第八編为跛行診斷，第九編类症鉴别。

3.在每編中的主要关键上，为了解釋明晰起見，多附有参考图。

4.凡元亨疗馬集原文中不合理处的解釋时，而有采用价值的，加以适当的修改。論法不合理的，作附注提出，如造父八十一难經和十八大病論。

5.原書中的五臟論，及五運六气、五行生剋、刀砭血忌等是老中的老了变成癱瘓，不堪再用，所以尽皆删去。

6.許多中兽医同志，誤認為骨眼症与馬腹絞痛有关，施行不合理治疗，本書郑重提出糾正的意見，以期取消此种錯誤观点。

7.五臟論等文中，凡有参考价值的，均尽量摘出写在这書中。

目 錄

第一編 中兽医診斷学概論

- 一、中兽医診斷学的意义····· (1)
- 二、中兽医診斷学的特色····· (1)
- 三、中兽医理論指导的八大証····· (3)
- 四、診斷提綱····· (5)

第二編 一般診查

- 一、标記····· (8)
 - 1. 牲畜种类····· (8)
 - 2. 性別····· (8)
 - 3. 年齡····· (8)
 - (1) 馬的年齡鉴别····· (9)
 - 附：参考图····· (11)
 - (2) 牛之年齡鉴定····· (12)
 - (3) 綿羊及山羊年齡之鉴定····· (13)
 - 4. 毛色····· (14)
 - 5. 旋毛特征····· (15)
 - 附：旋毛参考图····· (17)
 - 6. 种类····· (16)
- 二、体态····· (16)

1. 病畜的姿勢·····	(17)
2. 營養狀況·····	(20)
3. 結構·····	(21)
4. 性情·····	(22)
三、皮膚·····	(23)
1. 被毛狀態·····	(23)
2. 皮膚濕度·····	(24)
3. 皮膚顏色·····	(25)
4. 皮膚狀態·····	(26)
5. 皮膚腫脹·····	(26)
四、體溫·····	(27)
1. 皮膚溫度·····	(28)
2. 發熱·····	(29)

第三編 望診——視診

第一章 望診概論·····	(31)
第二章 舌色·····	(31)
一、從舌色決生死·····	(32)
二、看臥蚕·····	(32)
附：參考圖·····	(31)
第三章 外貌·····	(33)
第四章 舉動·····	(33)
第五章 面容·····	(34)
第六章 呼吸·····	(34)
第七章 腹圍·····	(35)

第八章	姿勢	(35)
第九章	步样	(36)
第十章	異常動作	(36)
第十一章	鼻粘膜	(37)
第十二章	眼	(38)
第十三章	附：定症歌	(39)
第十四章	附：十八大病論	(46)
第十五章	附：造父八十一難經	(47)

第四編 聞診

第一章	聞診概論	(56)
第二章	呼吸	(56)
一、	呼吸次數	(56)
二、	呼吸聲音	(57)
三、	呼吸方式	(58)
四、	呼吸困難	(59)
1.	吸氣困難	(59)
2.	呼氣困難	(60)
第三章	氣味	(61)
一、	氣息惡臭	(61)
二、	口中氣味	(62)
第四章	聲音	(62)
第五章	咳嗽	(63)
一、	咳嗽的性質	(64)
二、	附：王良陰嗽論摘要并加注解	(66)

第六章 腸音	(68)
--------	--------

第五編 問診

一、問病已若干日	(71)
二、問病的起因	(71)
三、問病症类型	(71)
四、問病畜数	(72)
五、問曾否治过病畜	(72)
六、糞便	(72)
七、尿	(73)

第六編 切診亦称脈診

一、脉的生理	(74)
二、三部三关的診斷法	(75)
附：参考图	(75)
三、診脉分类法	(76)
四、診脉法和診脉指法	(76)
五、脉搏	(77)
(一)脉数	(77)
1.数脉	(77)
2.迟脉	(78)
(二)脉的节律	(78)
1.整齐脉	(78)
2.澀脉	(78)
3.促脉	(78)
4.結脉	(78)

5. 代脉·····	(79)
(三) 脉的性質·····	(79)
1. 浮脉·····	(79)
2. 沉脉·····	(79)
3. 实脉·····	(79)
4. 虚脉·····	(80)
5. 洪脉·····	(80)
6. 細脉·····	(80)
7. 弦脉·····	(81)
8. 緩脉·····	(81)
六、附：內臟应病之脉·····	(81)
七、附：診脉歌·····	(84)
附：参考图·····	(85)

第七編 触診

一、心臟的触診·····	(86)
二、消化系統触診·····	(87)
(一) 腹部·····	(87)
(二) 起臥入手論·····	(88)
(三) 咽与食道之触診·····	(91)
三、呼吸系統触診·····	(92)
四、排尿器官触診·····	(93)
五、阴門触診·····	(94)

第八編 点痛論(跛行診斷)

附：蹄头痛·····	(100)
------------	-------

第九編 类症鑑別

- 一、骨眼····· (102)
- 二、姜芽····· (103)
- 三、起臥症类鑑別····· (103)

第一編 中獸醫診斷學概論

一、中獸醫診斷學的意義

元亨疔馬集中，對於牲畜的診斷，是很重視的。關於診斷的文獻：有師皇脈色論、定証歌、八証論、點痛論、起臥入手論，等。在脈色論中談出有診斷價值的是望、聞、問、切四項。又提出“察病而有巧者望聞問切也。凡察獸病，先以色脈為主，再令相其步行，听其喘息，觀其肥瘦，察其虛實，勞飲喂之多寡，究谷料之有無，然後定奪其病”。至於八証論，系將牲畜整個的病理變化，分為八個類型，再由八個類型中，分成若干的小分類，再進行分類的療法。定証歌是以病理的變化，由於外觀上的望診，而決定是某種疾病，再施用某種適宜的療法，編者在下面各章中要一一寫出。

中獸醫診斷病症，是從整個的生物體病理生理機能變化作出發點，通過病理的生理機能的變化，表現在臨床病理現象的綜合判斷。也就是說並不完全依靠排除病原為對手，而是以引起這種病原的整個生物體的生理機能的修復為目的，來進行治療的。

二、中獸醫診斷學的特色

1. 注重身體各部的生理機能，是否能維持自然的現象，即

古人所談，形病脉不病，脉病形不病；如跛行病发于前肢或后肢，在外觀上的檢查，为外形有病，但再經過內部檢查，而不現病态。此謂形病脉不病。續发性的心臟肥大，和先天性的血友病，在分系的內部檢查，呈現大血管狹隘，但在未发病前，不見何等病征，此謂脉病形不病也。

2. 仲景提出症狀上的特点“发病口渴，不惡寒者，为溫病。假如惡寒輕，发热重，为溫病，惡寒重发热輕，口不渴为伤寒，再加上脉紧身痛，更可証明。又如中风伤寒分別，在有汗及无汗之类”。

3. 再參合阴阳、表里、寒热、虛实、邪正等病情，將中医所用术语解釋如下：

(1) 阴阳：这二字可作代表式的符号看，但其所代表者，有时指具体的物質，或指抽象的屬性，有时指疾病的增进与衰沉，有时指患者的兴奋与麻痹。所指虽各不同，皆以阴阳二字代表之。

(2) 表里：大抵指病位的場所，和病情的趋势而言。凡疾病酝酿于皮肤肌肉間，病情有向外趋势的，曰表。相反的，酝酿于臟腑間，病情集中于內部的，曰里。此專指疾病而言，若是實質暴显于外表的是表，蘊藏于內部的是里。

(3) 寒热：有慢性与急性充血与貧血的分別；又有体温上升与下降的变化；更有生体机能兴奋与抑制的區別。

(4) 虛实：患者身体瘦弱，精神萎靡，是名曰虛。諸症方張，病机亢进，是名曰实。所謂虛是正氣虛，实为邪氣实也。又患者体中排泄机能太过者，亦謂之虛，生理上发生障碍滯塞，

亦謂之實。

(5)邪正：凡病理变化，所产生的生理障碍物，和生理反常作用，均謂之邪。所謂正，即指病者各部机能尙能維持正常現象。

三、中兽医理論指導的八大証

元亨疔馬集中，把許多疾病歸納成为八个类型証，再由此八个类型証中再加以分析檢查，決定出这一病是属于那个类型証。就可以按这个类型証来进行治疗。茲分述八个类型証。

1.寒証：临床症狀反映出整个生物体的生理机能衰沉的称为寒証。元亨疔馬集中的胃寒、胃冷、冷痛、冷腸、瀉瀉、伤水起臥、脾氣痛、脾絕、姜芽、水谷并、起臥等症，都属于寒証一类。症狀多为脉搏沉迟，按之无力，耳鼻和四肢下部感冷，口粘膜青黃，腹內听診腸蠕動音活潑亢进，而发較重嘔嘔嗚嗚等音，不时发起疝痛、惡寒、战慄、出汗、感冷、排出不消化的軟糞，口內存蓄清涎。

2.熱証：临床症狀反映出整个生物体的生理机能亢进的，称为熱症。元亨疔馬集中的熱痛、肺壅、心黃、伤料、肚脹等症，都是属于熱症一类。症狀多是脉搏洪数，口粘膜鮮紅，而充血，摔行步样蹣跚，身体較熱而发汗，小便减少、大便燥結。

3.虛証：临床症狀反映出生物体的生理机能不振作，同时兼有體質虛弱的現象，或在大瀉、大汗、大出血后的虛弱，統謂之虛証。元亨疔馬集中的慢症、宿水停臍、肺敗、肺絕、腎虛、慢脾黃、脾絕等症，均属于这一类。症狀为毛焦糠吊，肌肉

弛緩，身體消瘦，步行不穩，易于仆倒，怠于行步，鼻流濃汁，喘咳連發，四肢浮腫，精神缺少，脈搏遲細無力。粘膜發白無光。

4. 實証：凡生物體的生理機能在病原刺激尚未除去前，仍保健壯現象的，謂之實証。元亨疔馬集中的草噎、傷料、前結、中結、后結、板腸結、喉骨脹、渾睛蟲等症，均屬於此類。症狀為痛苦不安，脈搏強大，口粘紅澤，體質和營養都還好。

5. 表証：這是生物體的皮膚肌，和感覺器官的生理機能受到損害，如鼻膜卡他、肌肉痙攣等謂之表証。元亨疔馬集中的揭鞍風、項脊悽，肝熱、肺寒、舌瘡、脫肛、肺風毛燥。症狀多為在頭即重，在眼即昏，在鼻即塞，在耳即聾，在喉即閉，在肌肉有搖擗，在骨即痛，在皮膚即生瘡疥，在脾胃即脫肛，脈搏浮，口粘膜蒼白，鼻鳴流涕，有汗或無汗。

6. 里証：由於疾病的機轉，引起生物體的內部，生理機能受到擾亂，謂之里証。元亨疔馬集中的慢腸黃、腰黃、膝黃、腎黃、偏次黃等，為里証的代表。症狀為脈搏沉遲，眼結膜充血，臥多立少，食欲減少，惡寒戰慄，便秘晚期下痢，四肢厥冷，精神萎靡。

7. 邪証：生物體的生理機能受到極度的擾亂，而引起整個生物體的中樞神經失常的謂之邪証。元亨疔馬集中的心黃，心熱風邪、脾虛濕邪，均為邪証的代表。症狀是精神恍惚，遍體流汗，渾身肉顫，頭項偏斜，步行如痴，東西亂撞，眼急驚狂，頭垂于地。

8. 正証：體形健康，在整個的生物體的生理機能，不呈現任何病理機能的變化，謂之正証。在事實正証是與邪証的襖

托。

除八个类型証外，又有人認為心、肝、脾、肺、腎五臟各有虛實寒熱表里邪正之分，如腎虛、肺寒、心熱、脾寒等等。在臨床診斷時，再運用望、聞、問、切等診斷方法，來審定疾病是屬於那一個类型的証。然後再按証分別治療。如虛則補之（補充營養物質和興奮的藥物，用以激發精神調節修復機能）實則瀉之，如通利二便，藥物以誘導下劑。或以白針放血，誘導血液循環的障礙，調整血壓借以收到消炎的作用。寒証用熱藥，如芳香健胃劑，驅風健胃劑，營養強壯劑等。熱証用冷藥，如苦味健胃劑，解熱劑，誘導緩下劑等。表証用解表藥，如解熱劑，消炎劑等。里証用峻下劑，下痢時用收斂劑，強心利尿劑，消炎消腫劑。邪証用穩心劑，如天麻、硃砂，全蠍等的鎮痙鎮靜劑，和防風荆芥類的解熱鎮靜等劑。

四、診斷提綱

同一種疾病，可以發現許多症狀；同一症狀，可以見于許多不同的疾病。所以當診斷時必須有一適當明確的標準。如航海家用指南針，賴以辨認方向。

中獸醫診斷以症狀為主，症狀的發生為抵抗病害和神經機能失去領導調節機能而引起。此中藥治療疾病是調整生理機能的抗体，以維持自然的生理機能。但因患者體質的不同，抵抗力的強弱，病者的機轉有盛衰，故雖同一疾病，而所發生的症狀亦不能相同，在治療上，以攻邪為主，或以輔正為先，須在診斷上作決定。

中兽医常用虛、实、寒、热、表、里、邪、正、标本等字来表示是什么症，和治疗方法。

1. 表里寒热虛实

表症指风寒刺激，毛窍閉塞，体温郁滯的症。里症，指排泄功能失职，糟粕停积的証。热症，指体温亢甚，放散的功用失职。血液中酿成最高的温度，故周身血管及心臟 均異常緊張，遂現充血症狀。寒症指体温低降，心臟衰弱，血行迟緩，周身有貧血的趋向，甚者下痢不止，汗出不收，將体温耗散，此为寒症中最危急的，邪实壅滯謂之实。正气衰弱謂之虛。

2. 虛实邪正

內經：“邪气盛則实，正气夺則虛”。凡病理变化所产生的生理障碍物及生理反常作用，均謂之“邪气”。又凡異物的加害和病害的壅滯，皆所謂“邪气盛則实”。体内各部机能維持正常現象謂之“正气”。凡病邪所停滯之处，皆为自然治疗所不及。故內經謂“邪之所湊，其气必虛。”

3. 标本緩急

內經：“急則治其标，緩則治其本。”这是治疗，即是治疗上应有先后緩急一定的程序；如有感冒性病症的咳嗽，散表为先，无感冒性病症的咳嗽，宣肺为要。因停滯而致便瀉不暢，急宜疏里。因滑脫而致洞瀉不止，又宜收斂。又如惡寒、发热、无汗的表症。应当发汗。如心臟衰弱，脉搏沉細，四肢逆冷，則宜

强心助气，而以发汗佐之。又如腹满，便秘，应当通便。若舌干、少津、虚烦、自汗、神疲、食少等，又宜先用滋阴润肠之法，而以通便佐之。

第二編 一般診查

一、標記

1. 牲畜種類

許多疾病僅侵害一種動物，而不侵害他種動物：如馬的鼻疽，牛的傳染性胸膜炎，亦有因身體的生理機能之不同，而發生特殊散發性病的。如馬的胃破裂，腦積水和喘鳴症等。牲畜種類與用藥亦有關係，如反芻獸（牛、羊、駱駝、鹿等）對於汞劑很敏感，貓對含石炭酸劑很敏感。

2. 性別

性別對於一部分疾病的出現頗有影響，雄馬的腹股溝赫爾尼亞，其病症類似腸絞痛。閹牛易患尿道結石，妊娠在診斷上與治療上均極重要。

3. 年齡

一部分疾病，僅在幼畜或多在幼畜發生。如幼駒的腸入陰（腸套疊）常比壯馬為多，老馬因多年的使役，多患內臟慢性病，如心焦（腦積水）哮喘症等。老齡與預後亦有重要性，在同一情況下，幼畜之預後常較老畜為佳。又年齡與用藥劑量大小

有关,故年龄对于治疗疾病上,是非常重要的,茲將年龄鉴别法述于次:

(1)馬的年龄鉴别(包括驃駟)

一岁:乳門齿及乳中齿生出者。

二岁:乳門齿齿窝消失,乳中齿前后緣磨灭,乳隅齿長齐。

三岁:乳門齿搖动,乳中齿齿窝消失。乳隅齿前后緣磨灭。

四岁:下顎乳門齿脫落,换成永久門齿(俗称两个牙)

五岁:下顎乳中齿脫落,换成永久中齿(俗称四个牙)

六岁:下顎乳隅齿脫落,换成永久隅齿(俗称边牙口)

七岁:下顎門齿齿窝磨灭(或称齿窝消失)

八岁:下顎中齿齿窝磨灭。上顎隅齿,燕尾出現。

九岁:下顎隅齿齿窝磨灭。而上顎隅齿,燕尾明显。

十岁:上顎門齿齿窝磨灭。

十一岁:上顎中齿齿窝磨灭。而上顎隅齿燕尾消失。

十二岁:上顎隅齿齿窝磨灭。

十三岁:下顎門齿,咀嚼面近似圓形,齿星明了出現。第二次燕尾出現。

十四岁:下顎中齿咀嚼面近似圓形,齿星明了出現。

十五岁:下顎隅齿咀嚼面近似圓形,齿星明了出現。

附注:在十三岁、十四岁、十五岁时,上下顎切齿,斜向于前方,其接合呈角度,横縱徑为五比四。

十六岁:下顎門齿齿星位于中央。