

大眾衛生常識之五

可怕的花柳病

唐明晴編著



蘇南人民出版社出版

大眾衛生常識讀之五

可怕的花柳病

唐興發編著

蘇南人民出版社出版

書號：(錫)0082

可怕的花柳病

編著者 唐 明 晴

出版者 蘇南人民出版社
無錫師古河十號

發行者 蘇南分店
無錫公園路卅一號

印刷者 蘇南新華印刷廠
無錫南門外南禪寺

1—3,000 (錫1) 1951年6月

敬告讀者

一、我們出版這一套「大衆衛生常識」，是爲了貫徹中央人民政府的文化教育方針——新民主主義的（民族的、科學的、大衆的）文化教育方針；也是執行我們蘇南地方出版社出版方針（出版蘇南地方性的爲蘇南人民大衆所迫切需要的通俗讀物）的具體工作。

二、因此，「大衆衛生常識」是以廣大人民，特別是工農大衆作爲主要對象的。因爲工農大衆雖然在共產黨和人民政府的領導下，在政治上已經成爲國家的主人翁；經濟上也獲得了初步的改善；而文化上的翻身却還在開始。我們覺得：工農大衆今天對文化知識的要求是迫切的，而醫藥衛生知識方面却是更加迫切要求的；他們長期在帝國主義和封建反動勢力的統治下，由於生活的困苦，使他們無法獲得必要的衛生知識和必需的衛生條件。許多工農大衆既不知道預防疾病，生了病以後也只好求神拜佛把香灰當作萬應靈丹。這種情況是需要用大力來加以改進的。在幫助工

農大衆改進這種情況時，我們希望這些小冊子能起它一定的作用。

三、因爲我們做大衆化的文化工作，剛在開始，所以在編寫這些小冊子時，雖然注意到通俗化的問題，但在某些地方，還覺得做得不夠，這一點當在以後的工作中，和作者共同努力，求得改進。

四、這套「大衆衛生常識」的所以能夠出版，完全是蘇南軍區衛生部幾個同志努力的成績，他們在工作中忙裏偷閒把它編著成功了。這種爲人民服務的精神，是值得我們學習，也值得我們感謝的。

蘇南人民出版社 三月十二日

目 錄

寫在前面.....	(1)
梅毒.....	(3)
淋病	(22)
軟性下疳.....	(31)
第四性病.....	(35)
花柳病的預防.....	(37)
有關幾種防治藥的補充說明.....	(40)

寫 在 前 面

『花柳病』是遠在三百年前，由歐洲流行散佈開來的，經過科學家們悉心研究，在一九〇五年時，蕭定氏發現了梅毒的螺旋菌，一九〇六年到一九〇七年中，又有人發明了檢查梅毒的驗血法，一九〇八年到一九〇九年德國人厄利希又發明了治梅毒的特効藥「六〇六」，到第二次世界大戰時，配尼西林的發現，在治花柳病方面，又開闢了一條新的道路，正由於科學家不斷的努力，科學技術上的不斷進步，才給予這個人類的大害以嚴重的打擊。

『花柳病』產生的根源，主要是由於不潔和混亂的性交而染上的，它是所有傳染病中最可怕的一種，惡性的多是死路一條，慢性的會使人常年以致終身都感到痛苦，更足畏懼的是它能叫人絕代，例如淋病能破壞人的生育機能；有梅毒的婦女如果懷孕，往往幾個月就要流產，有的侥幸生育下來，也多數是一塊爛皮肉，活不了多少天。極少數的雖然能夠成長，但是嬰兒的血液裏，早就藏有無數的梅毒細菌。

至於花柳病在我國的流行，也是比較嚴重的，

這是由於舊中國長期在反動、腐敗的國民黨統治者手裏，造成了社會秩序極度的混亂和社會的貧窮，大小城市到處設有妓院，而妓院也就成為花柳病最大的一個批發所。我國究竟有多少人患花柳病呢？目前雖然沒有確實的全面的數字統計，但以解放後，在上海三萬個妓女調查情況中約有百分之六十五染有花柳病，而上海市患花柳病的人，據估計也有五、六十萬之多，這就是由於國民黨長時期反動統治的結果，而娼妓的數目及花柳病的病人，是大大地超過歷史上任何時代。

一九四九年十一月，北京封閉妓院的決議中曾指出：『妓院是舊統治者和剝削者摧殘婦女精神與肉體，侮辱婦女人格的獸性野蠻制度的殘餘，傳染梅毒淋病，危害國民健康極大。』從這個決議裏，我們可以明瞭封閉妓院，不但是能夠消滅花柳病的傳染，同時，也使無數被壓迫的姐姐妹妹站起來。當然這還只是全國性封閉妓院的一個典型的開端，今後還需大力地進行，並且還需要展開羣衆性的衛生教育，使廣大人民認識健康的重要。

這裏，我僅就手頭已有的材料，編寫了這本『可怕的花柳病』，由於本人在這方面的知識有限，並且不太熟悉，在某些地方尚需要請教專家指正。但爲了能引起普遍地重視，也就只好先予付印，希望跟大家共同研究。

唐明晴一九五一年四月

梅 毒

花柳病通常包括梅毒、淋病、橫痃、第四性病四種。這四種病各有不同，首先是傳染的病毒不同，因此發出來的病勢也不同，病的結果，病的醫治也都有些差別，其中最厲害的是梅毒。

一 梅毒是由梅毒螺旋菌傳染的

傳染梅毒的細菌，是一種有鞭毛樣突起的螺旋菌，形體很小，像螺旋的形狀，每個細菌螺旋的數目，六個到二十四個不等。它的運動很活潑，通常有三種運動狀態；在顯微鏡下，可以見到它有時像蛇行，有時像水的波動，有時又像在旋轉。

這種病的傳染，絕大多數人是由於不潔性交的緣故，其他也有因為接吻。醫務人員接觸了患有梅毒的病人，也可能被傳染。此外，如病人衣服上潮溼的排泄液，某些場所公用的茶杯、毛巾、馬桶……也同樣有傳染的危險，不過梅毒螺旋菌的生活力很低，很難抵抗乾燥及肥皂的殺菌力，也不能生存在新鮮的環境中，由於這些特點，梅毒才沒有變成普遍化的傳染

病。

二 談談楊梅瘡

由於梅毒而生的瘡，一般人都叫它楊梅瘡（因為在皮膚和粘膜上發生的潰瘍和疹子好像楊梅）。不過凡是得了梅毒的人，不一定個個都生楊梅瘡，例如有的人生了隱性梅毒，除了在他的血液裏有梅毒螺旋菌，而身體外面却顯不出楊梅瘡來。總的說起來，染了梅毒的人，絕大多數是要生楊梅瘡的，根據梅毒各期不同的發展，一般把它分成三期，即早期、隱伏期、晚期。也有的把它分成下面的幾期，比較容易辨認。

第一期楊梅瘡：大多發作在男女的生殖器上，時間常在傳染了病菌之後的十天到三個月。在男子生殖器上的，初起時大多是一個小的破疙瘩，過幾天脫了皮就變成瘡，有血水滴出來，不痛也不癢，長大後，四邊就硬起來，男人的包皮本來是可以伸縮的，但是生了楊梅瘡之後，就不容易向後拉了。這樣，雖然看不見瘡，用手在包皮外面摸，還能摸出瘡的硬結，有的時候雖然摸不出，那是因為包皮全部發硬的緣故（一般由於不衛生引起的包皮發炎，也有腫硬的，但可注意發生的原因不同）。同時，在腹股溝（大腿根上方）的淋巴腺（註一）也會腫起來，平常都稱為橫痃，淋巴腺腫既不痛也不癢，一個一個的腫硬不連在一起，

外面的皮也不發紅，這種情形，也是染上了第一期梅毒的特徵之一；由於生殖器上呈現以上硬性的病變，所以又叫做硬性下疳。

患在女子外生殖器上的第一期楊梅瘡，性質和男子的完全相同，例如它可以使陰戶發生硬腫，就像男子包皮的硬腫一樣；瘡附近的淋巴腺腫，也和男子的一樣。但是生在女子生殖器內部的，大多數是糜爛的，看上去現灰紅色，並且發生水腫，却沒有什麼硬結。

第一期楊梅瘡，除掉能生在生殖器上，也能生在眼皮、耳朵、喉嚨口、嘴唇（附照片）、女子奶頭的左右、肛門等處。這些大都是因為毒素的轉移，或者是直接接觸了患部而被傳染的，例如接吻、雞奸等，在這些地方生的瘡，和其他的有些不同，不單是不痛不出血，而大都是裂口，再過一個時期就發生硬的變化，靠近的淋巴腺也腫大起來。



有時在手指頭上也可能傳染第一期楊梅瘡，這種情形大多數是醫務人員在接觸患有梅毒的病人，或者是由於直接撫摸過瘡部的緣故。

第二期楊梅瘡：梅毒大約在第一期之後，一到三

個月，便進入第二期，這時候毒已侵入血液和淋巴腺，因此就在皮膚上發出一些紅斑，早期出現的顏色有如玫瑰紅。有人稱做玫瑰紅斑。大多發生在軀幹上（人除去頭部及四肢之外的身段，就叫軀幹）。比較遲一點發出來的疹（小疙瘩），全身都有，大小不一，不痛不癢，有的很小，生在毛孔處，叫毛週圍楊梅瘡；有的是一團一團的，中間有大的疙瘩，四周繞着許多小疙瘩，叫花朵式的楊梅瘡；有的大小如豆，患在臉上，叫結節性楊梅瘡；再遲一點發生的，是帶鱗屑的疙瘩，叫丘疹鱗屑性楊梅瘡；有的人由於體力弱，或者由於梅毒的毒力特別強，就會發生膿疱性的楊梅瘡；如果生在頭皮上，就會長得很高，結很厚的瘡蓋，像黃水瘡，很不容易認出是楊梅瘡，有的時候，在頸項上生一些瘡，瘡蓋也很厚，而且底寬尖子窄，很像一座寶塔，又叫蠟壳瘡（蠟壳是產生在淺海泥沙中的一種軟體動物，外面壳子是硬的，並且高底不平）。生這種楊梅瘡的人，身體常常很壞，外表看上去，就像生了重病的樣子。另外還有一種生在各部粘膜上，例如嘴的裏面、喉嚨上面、肛門四邊、或者在陰部，因為這些地方既潮濕又溫暖，對於梅毒螺旋菌的繁殖是最合適的，所以這些地方最容易傳染楊梅瘡。還有的人在腳趾間也會生第二期楊梅瘡。

除掉以上的種種病勢之外，還有其他的病狀，例

如全身的淋巴腺腫大、脫頭髮、聲音嘶啞、眼睛怕光、眼力減弱、關節疼痛、頭暈、頭痛、四肢無力、不想吃飯等嚴重病情。

第三期楊梅瘡：離開第二期梅毒大約一兩年之後（或者三年以上），便發生第三期楊梅瘡。第三期楊梅瘡有兩種：一種是一圈一圈的，中間的皮膚正常，四邊有一粒粒的軟疙瘩，顏色是暗紅的。仍然是不痛不癢，疙瘩在發出來以後幾個星期，或者幾個月就破成瘡，大



多生在頭皮、臉、眼（附照片）、肩膀、胸腰等處。這一類叫結節性潰爛性楊梅瘡；一種是先成圓形或者長圓形的疙瘩，生在皮裏，用手捫住不很痛，外面的顏色是紅的，大多生在小腿和臉上。過了幾星期或者幾個月，因為瘡部的營養不夠，也就潰爛成瘡。這種瘡有特別的形狀，多半是圓的中間露出紅白的肉，或者成為很深的洞，上面的組織都是污濁的，瘡附近的淋巴腺並不腫大，這一類稱為樹膠樣腫（或稱樹膠瘤）。以上兩種，有的時候會同時發生。

第四期楊梅瘡：梅毒發展到最後，便到了第四期；這一期過去也有人稱為副梅毒，或是異性梅毒，發作的時候，大約早在得了梅毒的第三年，遲在十年

以後，這種發作的早遲，當然也是根據各個病人與梅毒螺旋菌的強弱等具體情況而決定的。到第四期時，因為梅毒螺旋菌更嚴重地傷害了神經，或者傷害了血管的關係，身體的組織便會受到破壞，它可以發生在人體的任何部位，例如皮膚、粘膜、骨頭（鼻樑骨、頭骨、胸骨、肩胛骨、小趾前骨）、關節骨（特別是全身的大關節）、肌肉、大血管、呼吸器（喉、氣管、肺）、消化器（食管、胃、腸、肝）、泌尿器（腎——俗稱腰子、膀胱——俗稱尿泡）、五官（眼、耳、鼻、舌、喉）、神經等方面，總之，到了第四期的時候，梅毒在人身上真是無孔不入。

三 發生在幾處比較特殊部位的梅毒

喉梅毒：在梅毒到了第二期以後的幾個星期，有些病人的喉嚨便發炎，或者生灰白色的紅疹，而成淺的潰爛。到了第三期的時候，成樹膠樣腫的最多。第三期的病狀有兩種：一種是發生得比較慢，不覺得什麼痛苦。一種是疼痛得很厲害，聲音也變啞，並且有膿臭一樣的痰吐出來。在說話或者嚥東西的時候，更加疼痛。這是由於化膿破潰之後，傷害了聲帶（發出聲音的一種組織）的緣故，再發展下去又會引起水腫，於是呼吸就困難了，甚至有把人悶死的危險。就是設法治好了，結果也落下一個疤，以致終身說話受

到阻礙，而且呼吸困難，一直到死爲止。

肺梅毒：得了梅毒之後，大約經過十幾年，或者幾十年，在肺子的中部或者底部，便生孤立的或者是多數的，豌豆大或胡桃大的樹膠樣腫。肺梅毒發作後，漸漸有長久的乾咳，開始時有粘痰，以後咳出來的痰很濃，現紅色或褐色。這種情形很像患肺癆病，所不同的是病人生過梅毒，在發作的過程中不發熱，病人咳出的痰，長久查不出結核桿菌（致病的細菌）。

腦梅毒：腦梅毒，大多數在得了梅毒之後，三年到十年以後發生。大多數因爲在第一、二期梅毒時，因爲病狀不重，又沒有得到徹底的醫治，拖到後來而引起的。腦梅毒，在壯年的男女中發生得比較多，發生以後，一般的病狀是頭痛，在夜間痛得更兇，常有嘔吐、頭昏眼花、失神、抽筋、精神癡呆、記憶力減退等；也有昏睡、狂躁不安、煩渴及尿多的現象。當梅毒的毒素在腦子裏麻痺了腦神經的時候，又會影響目力減退，及眼睛的神經發炎等，這是因爲視神經（管理眼睛看東西的神經）受到影響的緣故，其他如嗅神經（管理嗅味的）、聽神經（管理聽聲音的）……也有受害的可能。萬一腦膜、神經、血管都同時受了毒害，那末發出來的病狀就更加複雜了，而且最容易引起突然的死亡。如果毒素侵犯到說話的總機——言語中樞，病人連話也不能說了。如果毒素引起了一處大

血管發炎——動脈炎，使大血管變狹了，阻礙了血的流通，這樣也就阻礙了那一部分血流行區腦子的機能，這時便發生頭痛頭昏，眼睛發花，知覺失常，說話受到阻礙，感情容易起變化，種種複雜的現象。假使血又塞住了不能流行，加上沒有其他地方能供給那部分腦子需要的血，人就要發生中風。並且在受害血管的領域內，有半身知覺麻木、半盲（一隻眼睛成瞎子），或者成為半身不遂等的殘廢。

指毒性的關節炎：發生在關節的梅毒，病狀的變化也有兩種：一種是多數的關節有腫脹，壓上去就痛，在運動的時候也有些不能自如等等的病狀，痛在夜裏更加厲害；一種是在骨頭的一頭先發生樹膠樣腫，再侵害到關節，這一種不單在夜裏疼痛厲害，關節的運動也會受到阻礙。

胃梅毒：梅毒到了胃子以後，可能使胃子變硬變厚，因此，胃子也小了，吃不了多少東西，病的變化結果常常把胃子變成環形，所以有人叫這種胃子為葫蘆胃。這一種似乎也是年青患有梅毒的病人比較多。



鼻梅毒：鼻腔（鼻孔內）發生初期硬結，以後一步步發展，鼻子裏而流出來的鼻涕

過多，或是鼻孔裏的粘膜腫起來，這樣造成鼻孔阻塞，有時候也會潰爛，流出來的鼻涕有一股很難聞的腐臭。如果在梅毒第三期，鼻子便會腫大，後來又潰爛，再進一步侵害了鼻骨，結果變成馬鞍一樣的塌鼻子，還有更加難看的，成為鼻孔朝天、開天窗的醜像。這種鼻子不單是叫人破相，而且以後連呼吸和聞味，也都很不方便。

此外如果耳朵發生了梅毒，嚴重的可以變成聾子，眼睛有了梅毒也可以變成瞎子，特別可怕的是心臟及主動脈（人體內部最大的一根血管），發生了梅毒，很快就會使人送命。

妊娠梅毒及先天性梅毒：有梅毒的女人，在懷孕以後五個月左右便會由胎盤（衣包）把梅毒傳給孩子。因此常常發生流產、小產、死胎等結局，雙親在得了梅毒之後兩三年內便有遺傳給孩子的危險，父親得梅毒之後，五年到十年傳染的危險性漸漸減少，甚至消失。然而母親得了梅毒之後，經過二十年仍舊有遺傳的危險性。

有梅毒的母親常發生流產等等的緣故，是因為羊膜（漿泡）水腫，胎盤變大。嬰兒生出幾天以後在手掌及腳底生天庖瘡（就像一種大膿泡），臉上、陰部、肛門、大腿等處生紅色的疹子，鼻子的炎症更加現得早。並且有漿水樣的像血色的鼻涕，其他肝和各處的