



医马浅说

賈昇講述 賈香亭執筆



山西人民出版社

內 容 提 要

这是一本兽医启蒙读物，是为乡村兽医、农业社饲养员和技术员编写的。

作者根据古人和自己多年的经验，向初学兽医者讲述了诊断、治疗骡马病的知识和具体方法。内容包括：诊断和治疗骡马病的方法；偏次黄、噪黄等九种黄病的治法；尿结、暑热痛等七种起卧病的治疗方法；治粪结、梁疮、胃寒吐草等二十七种杂病的效验方和其他治疗方法；灌药和用药知识。书后附有骡马常用针灸图。

医 馬 淺 說

賈 昇 講述

賈 香 亭 執筆

*

山西人民出版社出版（太原并州西街十三号）

山西省書刊出版业營業許可証晉出字第二号

太原印刷厂印刷 新华書店山西分店发行

*

开本：787×1092 1/32 • 1 $\frac{1}{8}$ 印张 • 21,000字

一九五八年四月第一版

一九五八年六月太原第一次印刷

印数：1—7,084册

統一書号：16088 • 47

定 价：一角二分

前 言

我今年八十三岁了。从二十二岁时起就着手研究医馬工作。在六十年的过程中，投师訪友以及自己的鑽研，頗費了一些精力，也摸索到一些医疗的經驗，因此在山西汾阳、孝义一带也博得了一些虛名。

在旧社会里，我把这工作只認為是一种謀生的职业，所以对于我摸索到的一些医疗經驗，除家人以外，秘不告人。自解放以来，不断地受到党和政府的教育，才逐漸地了解了“为人民服务”的重大意义。特別是在一九五六年，看到“人民日报”上刊登出“珍貴祖国民間兽医經驗”的文章以后，更进一步体会到党和政府对兽医工作的重視、关怀，以及兽医工作者在祖国偉大的社会主义建設中的責任和作用。因而我愿意把自己摸索到的一些方法貢獻出来，和兽医界同志們共同研究。尚祈多提意見，指正缺点！

賈 昇

一九五八年二月、

目 录

一 診斷馬病的方法	(1)
(一) 切脉搏	(1)
1. 馬脉的跳動情况	(1)
2. 病馬的脉象	(1)
3. 馬脉的属脏	(2)
4. 切馬脉的地方和方法	(2)
5. 几种死症的脉象	(3)
(二) 观舌色	(3)
(三) 看形象	(4)
二 治疗馬病的方法	(4)
三 最常見的两大类馬病	(5)
(一) 黃病的識別和治疗	(5)
1. 偏次黃	(6)
2. 喉黃	(7)
3. 后謙黃	(8)
4. 遍身黃	(8)
5. 膝黃	(9)
6. 腸黃	(10)
7. 肚底黃	(10)
8. 心黃	(11)
9. 內黃	(12)
(二) 起臥病的識別和治疗	(13)
1. 尿結	(14)
3. 暑热痛	(15)
3. 停水痛	(15)
4. 糞結	(17)

5. 冷痛…………… (13)
 6. 腸黃起臥…………… (19)
 7. 腸入陰…………… (19)
- 四 治其他病症驗方及一些治療方法…………… (19)
1. 治馬糞結、尿結、虛寒起臥及陰寒草慢等病
效驗方——通關散…………… (19)
 3. 治馬梁瘡效驗方——梅花散…………… (20)
 3. 治馬胃寒吐草驗方——暖胃散…………… (20)
 4. 治馬料傷五橫痛驗方——神曲散…………… (21)
 5. 治馬鼻內流膿不止效驗方——白合散…………… (21)
 6. 治馬咳嗽連聲不息，口吐白沫，鼻內流有稀膿
效驗方——白朮散…………… (21)
 7. 治馬肝臟受寒效驗方——平肝散…………… (22)
 8. 治馬肺熱咳嗽、氣喘、鼻流清膿鼻涕效驗方
——白芨散…………… (22)
 9. 治馬屢次肚痛效驗方——十全至寶散…………… (23)
 10. 治馬火腫前腿效驗方——逐瘀散…………… (25)
 11. 治馬閃傷內腎效驗方——巴戟散…………… (24)
 12. 治馬閃傷後腿以及腰胯疼痛效驗方——沒藥散…………… (24)
 13. 治馬傷力太過，身軀極瘦，雖大量喂草喂料亦不
上廐特別效驗方——加減大七傷散…………… (24)
 14. 治馬不起臥，出氣喘息聲如鋸木效驗方——葶瀝
散…………… (25)
 15. 治馬跌打損傷效驗方——舒筋神效散…………… (25)
 16. 治馬毛焦、氣喘、肚扇；脈細而微數效驗方
——蛤蚧散…………… (26)
 17. 治馬肺風毛燥效驗方——何首烏散…………… (26)
 18. 治馬癬疥脫毛外用方——巴豆散…………… (26)
 19. 治馬夏季受暑，上吐下瀉，舌色紅，脈極微細
效驗方——神朮散…………… (27)
 20. 治馬打鼻效驗方——蘭根散…………… (27)

21. 治馬脫肛效驗方——川練子散…………… (27)
22. 治馬腿拐效驗方——香附散…………… (28)
23. 治馬感受陰寒減少吃草驗方——七寶散…………… (28)
24. 治馬眼目紅腫、迎風流淚效驗方——龍胆瀉肝
散…………… (29)
25. 治馬破傷風、揭鞍風或受重陰風效驗方
——天麻散…………… (29)
26. 針馬出血后止血藥粉——止血散…………… (30)
27. 快走止血法…………… (30)

五 灌藥和用藥須知 …………… (31)

附：驃馬常用針穴略圖

一 診斷馬病的方法

診斷馬病的方法，主要有三種，即“切脈搏”“觀舌色”“看形象”，另外的輔助方法就是向飼養的人了解得病前後的一般現象。所說的三種方法是互相聯系的，不是孤立的，如果單凭一種就判斷病症，那是很容易出錯誤的。特別是單凭現象判斷病症，更是危險的。因為有一種“假象”，它和病的實質恰恰相反。如果不運用三種方法聯系起來診斷，就很容易被“假象”所迷惑，把病看得翻了，甚至助長了病勢，或者促成死亡。在這一點上，從我的經驗中體會，尤其重要的在於“切脈”。所以“切脈”這一方法，在三種方法中占着首要的地位。茲將三種方法分別說明如下：

（一）切脈搏

1. 馬脈的跳動情況

馬脈的跳動，按人的呼吸計算，沒有病的馬，一呼一吸跳動三下到四下，按時間計算，一分鐘跳動三、四十下。如果跳動的次數或多或少，和這情形不同的，就是病脈；如果跳動的次數和這相差得很多的，就是很重的病，甚至於是死症。

2. 病馬的脈象

馬的脈搏不象人脈那樣容易診斷。今分浮、沉、遲、

數、滑、澀六大脉象簡叙如下：

(1) 浮脉——手輕按脉管得見，重按則不見，“如水漂木”。其應病在表，浮表有力為實，脉數為表熱，無力則為表虛。

(2) 沉脉——重按得脉，如石沉水底，主病在里，沉而無力則為里虛病。

(3) 迟脉——亦叫緩脉。一般指下跳的慢，次數減少，多主勞傷氣虛陰寒病。

(4) 數脉——為急速脉象，主陽，熱性病、傳染病等見之。

(5) 滑脉——往來流利，如珠滾盤中，多應熱症實症。

(6) 澀脉——往來澀澀，不利為澀。主虛，氣血衰弱。

其治法：寒者熱藥，熱者涼藥；虛則補，實則瀉，有熱中風則表，無熱受陰則滋陰。

至於運用之妙，又存乎其人，又待於臨症推敲與其他兩種方法的相互配合了。

3. 馬脉的屬脏

馬脉的屬脏和人脉一樣。左邊的三部是心、肝、腎，右邊的三部是肺、脾、命（即右腎）。

4. 切馬脉的地方和方法

切脉方法，一般的是站在馬的左邊（和拉馬的人貼近），用左手的食指、中指、無名指三個指頭，先切左邊的三部脉，後切右邊的三部脉（切的時候，大驃馬指頭拉开一

点，小驃馬指头靠攏一点）。切左边的脉，垂下手去就可按到；切右边的脉，須将左臂从馬脖頸下边探过去，再用指头向上，才可以按到右边的脉位。至于切脉的地方，就在馬的脖根的左右两侧，食道两旁的两道低洼的地方。切脉的时候用三个指头用适中的力量緩緩按下去。切的时间，一般的每部脉总需要四分鐘左右（因为有的病脉时间短了不容易考察到）。另外，在切脉之前，必須讓馬先休息一会儿，否則就切不到真实的脉象，也就是說万不要在馬才干完活或奔跑才定之后进行切脉。

5. 几种死症的脉象

（1）脉搏跳动得非常急，一呼一吸跳七八次的；
（2）指下似有似无的（脉經里叫“虾游脉”）；（3）脉来就如硬棍碰指的（脉經里叫“彈石脉”）；（4）跳动三次一息，五次一息，或两次一息，一次一息的（脉經里叫“雀啄脉”）。上述四种脉象都是死症的脉象，不論发现四种里边的任何一种，都是不能治疗的病，医务人员临症诊断的时候，必須严密注意。

（二）观舌色

所謂“观舌色”，就是看馬舌上的浮色。和病状結合起来一般的可分为三类：紅而帶黃的是火症、实症；白而帶青的是寒症、虛症；白如枯骨，青如煤炭，或紅如死血的和黑如煮豆色的，都是当日的死症。另外又有一种在舌边上有血紅点子而帶有青色的，也多是不能治疗的病症。

观舌色时須注意的是秋天驃馬吃上青草，冬天吃上煮黑豆。吃上这些东西舌色就要受到影响，因此就需要注意，不

要因这些染色而被迷惑。如果遇有这些染色，診斷的重点方法就应该放在“切脉搏”和“看形象”上了。

(三) 看 形 象

病馬的形象是和病症相結合的。病症不同，所表現的形象就不一样了。在这里不能作总的介紹，到后边所提到的病症中，再分別說明。

二 治疗馬病的方法

治疗馬病的方法，一般的分“灌药”和“扎針”两种。扎針又分为“火針”和“血針”。所謂“火針”，就是用棉花裹在針上，蘸上葫油，用火点着，待燒得針紅了，用小鉄鉗很快地把棉花拊去，把針扎在应扎的針穴上。所謂“血針”，就是因症制宜，用大小不同的針头，在不同的針穴上去扎，使它流出不同数量的血液。火針和血針的作用是：火針属于溫补，血針属于开泻。至于灌药，那就是临症配制，不能一概而論了。

上述两种方法，有时可以并用，有时可以独用，但一般的总是以灌药为主，扎針为輔。如果是紧急起臥病和腰腿疼痛病，那又是以針为主以药为輔了。

另外还有一种“灸熨”的方法。这种方法就是用热白酒噴在一定的地方，上面垫上蒲紙用热熨斗熨燙。且噴且燙，每次需要白酒四两。这种方法多用于閃伤腰膀或前后腿拐的病症。

三 最常見的两大类馬病

(一) 黃病的識別和治療

所謂“黃病”，按咱們中醫說就是一種熱毒內積日久而生的病症。一般的在馬身上的某一個地方就發生了癰腫。這種癰腫，用手按去似腫非腫，軟古囊囊地很象是一塊粘糊輕活的絮棉。它和其他疮腫不同，不是硬的。用針扎開就流黃色的粘液，所以把它名之為“黃病”。但是也有一種外部毫無表現，只在內部作怪的，這是一種極厲害的黃病。我們行馬醫的人需要在脈搏上、舌色上、形象上特別細心考察，否則，就最容易使我們遭到失敗或發生錯誤。

黃病發生多在春、夏、秋三季。夏季多，春秋次之，冬季很少，但也有發生的，這也需要我們行馬醫的人特別注意。

黃病的現象在沒有發現以前很不容易察覺。一般的首先是減草（俗名叫做“慢草”，就是說馬吃的草量比平時逐漸減少了，但并不是一下就完全不吃，而是慢慢地吃得少了。所以如果是在一個槽上喂着三、四頭騾馬，就要特別細心發現是哪一頭減草）。其次是在站立的時候低着頭、牽拉着兩耳，兩眼眯眯瞪瞪，就如喝醉酒和痴呆了的樣子；出氣的時候後腹上吊；有的很緩慢地走前縮後，尾巴左右擺動，如果人不注意就很容易把它認為是困乏了。最後就是發現在外部的癰腫（如果沒有癰腫的就要特別注意考察研究前兩種現象和從脈搏里進行判斷）。

黃病的脈象一般的都是“洪數”，在“洪數”跳動的過程中隔三、五下又略停一下。另外又有一種脈象細而遲澀，渾身沒有癰腫的地方，舌色干黃，出氣粗而後腹上吊，兩目痴瞪，減草，沒有腸鳴泄瀉的現象。這一種黃病如果僅以一般的舌色和脈搏考証，很容易認為是寒症，誤用上熱藥，這樣就會加重病勢或者促成死亡。豈不知這是一種極重的黃病。按中醫的醫理說，是一種陽極生陰的重病。這一種黃病和寒症不同的特點是：寒症的舌色一般是青白的，這種黃病的舌色是干黃的；寒症出氣後腹不上吊，這種黃病出氣粗而後腹上吊；寒症兩目不痴瞪，這病兩目是痴呆的；寒症多有腸鳴泄瀉的現象，這病沒有。這種黃病外面雖沒有癰腫，但內部的黃毒是多的。它的脈象極容易迷惑人。我們進行醫療工作的人必須注意與寒症不同的特點進行判別，特別是在冬季，更要注意。

黃病是一種內熱病，它與騾馬的生活環境也是有關係的。注意厩槽的涼爽和飼草飲水的清潔，可以減少這病的發生。這種病里有幾種是帶有傳染性的，如果發現這種黃病就必須迅速地隔離。黃病一般的是發展很迅速的，只有少數幾種發展的比較慢些，所以一發現了這一種病就必須立即醫療，否則就很容易釀成危險。

黃病的種類按脈經上所指的有幾十種，但就我的經驗，最肯見而且也最容易發生的有下列幾種：

1. 偏次黃

症狀：（1）癰腫在肺胸旁邊，或左或右，或左右都有，或大或小。（2）吃草減少，舌色赤黃，站立的時候，低垂著頭，兩目痴呆，就象很瞌睡的樣子，出氣粗而且後腹

上吊。这种黄病带有傳染性。

脉象：有的緩慢，有的洪数，有的似有似无。其緩慢的还可以治疗，那种似有似无或洪数的就都不能治疗了。

治疗方法：这种黄病发生在心肺，是一种极重的黄病。脉来緩慢，多少减一些草的十个之中可治疗的一两个；如果多少不吃草的，就万难治疗了。治疗方法：

灌济世消黄散

炙冬花三錢 明知母三錢 川 軍四錢 秦 艽三錢
川貝母三錢 条黄芩三錢 川黃柏三錢 天花粉三錢
白葯子三錢 黃葯子三錢 川五金五錢 連 壳三錢
川 連三錢 山梔子三錢 东木通三錢 粉 草三錢
元明粉五錢（另包） 滑石三錢（另包）

鷄蛋清三个、蜂蜜二两、童便一茶杯为引。

2. 噪 黄

症状：馬表現出来的样子和偏次黄相同，其不同的地方就是臃肿发生在噪部。这种黄病带有傳染性。

脉象：一般的都是洪数的，又在跳动的过程中在三十次或二十次当中有一次稍微略停一下。

治疗方法：这种黄病发生于肺脏，是比偏次黄稍輕的一种黄病。如果治疗及时而又得法，十个之中可以治好六七个。其治疗的具体方法是：灌前面所介紹的济世消黄散，不过要加减一下，就是把前方中的秦艽去掉，加上元參五錢，麦冬四錢，山豆根五錢，大生地五錢。

3. 后臃黄

症状：精神短少，减草，两目也有痴呆的现象，舌色是红的，呼吸不显粗，最大的特点就是臃肿发生在后腿根处，有的影响得两条后腿也浮肿起来。这种黄病带有传染性。

脉象：洪大而数。

治疗方法：这种黄病发生于肺脏及胃，也是一种重黄症。其吃草稍减少的，治疗及时而又得法，十个之中可治好三四个；一口草也不吃的，虽治疗及时，十个之中也难治好一两个。治疗的具体方法是：

灌重剂降气消黄散

明知母五錢（酒炒） 川黃柏五錢（酒炒） 广木香錢半
香 附四錢 条 芩四錢 川 連三錢 梅 蒼朮三錢
丹 皮四錢 浙貝母五錢 玉 金五錢 黃葯子四錢
白葯子四錢 川 軍五錢 生 地五錢 川牛夕三錢
元明粉五錢（另包） 祁滑石四錢（另包）

鷄蛋清四个、蜂蜜二两、香油一两、童便一杯为引。

4. 遍身黄

症状：不减草，没有两目痴呆的现象，呼吸不粗，舌色稍黄。其特点是臃肿多发生在背部，肿的大小不一，有的如拳头大，有的如核桃大；有的发生一块，有的发生三、四块甚至五、六块。

脉象：就是稍数一些，没有什么其他很大的特殊现象。

治疗方法：这种黄病发生于皮肤，看着很凶，但没有多大的生命危险。可是如不治疗，拖延日久，毒气内攻，也会有生命危险。即使没有生命危险，背部也要生溃烂的疮

毒。其治疗的具体方法是：

(1) 灌遍身消黄散

生黄芪四錢 口防风三錢 蟬 股三錢 川 軍五錢
明知母三錢 浙貝母三錢 条 芩三錢 梔 子三錢
黄葯子三錢 白葯子三錢 玉 金四錢 甘 草三錢
連 壳四錢 元明粉四錢(另包) 祁滑石三錢(另包)

米泔水一盅、鷄蛋清四个、蜂蜜二两为引。

(2) 馬膘肥的可針顴脉穴放血，馬消瘦的，單純灌葯就可以把这癰肿消散了。

5. 膝 黄

症状：最大的特点是癰肿发生在前后腿的膝上，其癰肿大小不一。不减草，沒有目痴、气粗的現象，也不吊腹，也沒有两耳奔拉的現象，舌色正常（粉紅色的）。

脉象：比一般沒有病的脉稍微洪大一些，但是不数。

治疗方法：这种黄病的发生原因是积毒流窜到了膝部，无生命危險，但是如果治疗不得法，日子一久，容易把腿坏了。具体治疗的方法是：

(1) 灌加味降气消黄散

明知母三錢(酒炒) 川黄柏三錢(酒炒) 广木香一錢
条 芩三錢 香 附三錢 川 連二錢 梅蒼朮三錢
川牛夕三錢 連 壳四錢 木 通三錢 川貝母三錢
桂 枝錢半 銀 花三錢 炮甲珠三錢 皂角刺三錢
汾草梢二錢

鷄蛋清三个、蜂蜜二两、童便一盅为引。

(先讓馬把草吃饱，然后再灌。)

(2) 針蹄头穴：穴在四蹄的蹄壳上边和毛边相接处的

上方。两前腿毛形是“川”字式，穴在中間的地方；两后腿毛形是“八”字式，穴在正中。黃病在哪一条腿的膝上，就針那一条腿的蹄头穴。出血多少，看癰腫的大小而定，一般的須出一茶杯（这病万不要用針扎癰腫的地方或用“穿黃”的办法）。

6. 腸 黃

症状：經常背臥，臥的时候是大展身体平着臥，腹內疼痛时就来回滾动或緩起緩臥。这种病的最大特点是拉稀和便下来的糞臭气特别大，而且在糞內和糞的表皮上多有白色粘液。舌色多黃。

脉象：洪大，而且不定在跳動二十次三十次的过程中有一次稍息一下。

治疗方法：这种黃病发生腸部，多因飲水不到、剧烈重役所致，若不及早治疗，很容易酿成大腸臃爛，促成死亡。若能及早治疗，而且治疗得法，也很容易收效。治疗的具体方法是：

灌理腸消黃散

柯子肉四錢 杭白芍四錢 川玉金四錢 苏紅梔三錢

黃 芩三錢 川 軍四錢 川黃連二錢 川黃柏三錢

元明粉四錢（另包） 滑 石三錢（另包）

香油二兩为引。

（灌藥前不要讓馬吃草。）

7. 肚底黃

症状：稍微减少吃草，呼吸不粗，舌色紅而帶黃。最大的特点是癰腫发生在肚底，其癰腫大者如面盆大，小者如

拳头、核桃大。这种黄病带有傳染性。

脉象：初按时不感觉什么，以后就逐渐感到洪数，并且很有力量。

治疗方法：这种黄病是内部热毒聚积于腹部，其病势有的看着很凶，但没有死亡的危險。不过拖延日久，很容易酿成腹部臃烂，膿血模糊，影响到干活。初起来的时候用下法治疗：

(1) 灌加减降气消黄散

連 壳四錢 明知母三錢(酒炒) 黃 柏三錢(酒炒)
 广木香錢半 香 附三錢 黃 芩三錢 梅 薈三錢
 黃 蘗子三錢 玉 金四錢 白 朮子三錢 川 軍四錢
 生口芪三錢 浙貝母三錢 卜 荷二錢 甘 草二錢
 鷄蛋清三个、蜂蜜二两、童便一茶杯为引。

如果多日不散者，須加銀花四錢、穿山甲三錢、皂角刺二錢。

(2) 这种黄病初起来的时候不可用針刺破，过三四天以后，就可用走馬針(就是随便不按針穴而在病处乱扎)在癰肿了的地方乱刺一气，讓毒液流出，如过两、三天还散不了癰肿，可以再刺。如多日不散，恐其属阴，就須用热熨斗在癰肿的地方拖熨，拖熨之后，再用走馬針乱刺，并再灌前药。

8. 心 黄

症状：遍身出汗，两眼直視，就象发了瘋的样子，见人咬人，見物咬物，狂奔怪叫，就是山岳鴻沟都阻擋不住它，有的仅吃少許的草，有的就完全停止了吃草。舌色大紅。呼吸特別粗。