

2007 年版

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试

模拟试卷

主 编 姜 安 丽 钱 晓 路

资格考试



人民卫生出版社

2007年版 国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试

模拟试卷

主 编 姜安丽 钱晓路

副主编 李芳芳 马秀芬 王玉升 桑未心 申翠华

编 者 (以姓氏笔画为序)

马秀芬	王玉升	申翠华	余剑珍	张 清
张美芬	李芳芳	陈荣凤	姚跃英	姜安丽
党世民	徐卓立	桑未心	钱晓路	黄怀宇

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

2007 年版国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试 模拟试卷/姜安丽等主编. —北京:人民卫生出版社,2007.1

ISBN 978-7-117-08374-4

I. 2… II. 姜… III. 护理学-护士-资格考核-习题
IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 150704 号

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

2007 年版

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试
模 拟 试 卷

主 编:姜安丽 钱晓路

出版发行:人民卫生出版社(中继线 010-67616688)

地 址:北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编:100078

网 址:<http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线:010-67605754 010-65264830

印 刷:潮河印业有限公司

经 销:新华书店

开 本:787×1092 1/16 印张:10.5

字 数:239 千字

版 次:2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978 7-117-08374-4/R·8375

定 价:18.00 元

版权所有,侵权必究,打击盗版举报电话:010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

由卫生部教材办公室策划、人民卫生出版社出版的 2005 年版和 2006 年版国家护士执业考试辅导用书具有科学、权威、实用的特点，帮助很多考生顺利地通过了执业资格考试，是一套得到社会、考生、市场广泛认可的很好的考试辅导用书。在此基础上，为使图书规模和结构更合理、进一步优化各品种功能，突出权威性和指导性，力求为考生提供“合理、针对性强、实用性强、高效”的复习辅导用书，卫生部教材办公室启动了 2007 年版的修订工作，

本次修订继续坚持“两按照一针对”的原则，即：**严格按照**考试大纲要求的知识点编写，不漏写，不超纲；**严格按照**考试的命题重点编写，突出重点、淡化一般知识点；**针对**考生复习量大、复习时间紧的特点，突出内容结构的逻辑性，便于考生记忆或启发回忆。同时，本次修订的具体方法为：①全套用书以考试大纲为依据，以卫生部规划的中职、高职高专护理学专业教材为蓝本。②图书内容不拘泥于考试大纲的编排体例，根据知识的系统性和内在联系对大纲的知识点进行合理整合。③知识点的阐释和习题的解析以“能理解、好记忆、够考试”为度。④根据护理学科的特点，加强了人文学科的相关内容。

2007 年版辅导用书包括三种，分别是：

1. 国家护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试——考点精编
2. 国家护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试——习题精选与答案解析
3. 国家护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试——模拟试卷

与同类图书相比，本套用书具有以下鲜明特点：

1. 内容科学、权威，参考性和实用性强。

为提高本套书的考试指导效能，卫生部教材办公室特聘请了第二军医大学、复旦大学护理学院、河北省承德卫生学校、黑龙江省卫生学校、山东省立医院、上海交通大学护理学院、上海市职工医学院、天津医科大学护理学院、中山大学护理学院、西安交通大学职继学院、广州卫生学校、福建省厦门卫生学校、原中国人民解放军北京军医学院等重点医学院校的数十名熟悉国家护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试的资深专家承担 2007 年版辅导用书的编写工作，深刻剖析考点，详细解析重点和难点，并精心编制了模拟试卷，从而帮助考生达到事半功倍的复习效果。

2. 图书品种的不同内涵为具有不同复习习惯的考生提供了多种选择。

《考点精编》整合、精解考点，使考点得到系统、精练的阐释，便于考生记忆；并且，在每一个考点后根据大纲的要求，分别用“★”表示“了解”，“★★”表示“熟悉”，“★★★”表示“掌握”，以便考生在全面复习时能抓住重中之重，合理安排复习时间。《习题精选与答案解析》提供覆盖所有考点的习题，同时提供重点习题的答案解析，便于考生在作题时复习和巩固考点。《模拟试卷》全真模拟考试，有助于提高考生的应试能力。无论考生习惯于以复习基本知识为主，或以作题为主，或边复习基本知识边作题，都可以选择到适合自己的品种。

3. 图书篇幅合理，各学科比例和国家护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试试题的比例一致。

本套用书避免“内容泛滥”和“题海战术”。我们在广泛调研的基础上，确定国家护士执业考试与护理专业初级（士）资格考试《考点精编》90万字左右，模拟试题3套，习题精选1500~2000道题，共约150万字。该规模科学、合理，有利于节省考生的精力、时间和费用。

卫生部教材办公室

2006年12月

国家护士执业考试与护理专业初级(士)资格考试

试题题型和应试方法

国家护士职业考试与护理专业初级(士)资格考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。选择题的类型众多,但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成:①题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示;②选项,也称备选答案,由4~5个用字母标明、可供选择的词组或短语组成。每个科目中的试题类型分为A₁、A₂、A₃、A₄、B₁、X型题。

为了帮助考生更好地了解考试题型,顺利通过考试,我们将各题型的特点及应试方法介绍如下:

(一) A₁ 型题:单句型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例1 溶血反应尿液呈酱油色是因为尿中含:

- A. 白细胞
- B. 红细胞
- C. 蛋白
- D. 胆红素
- E. 血红蛋白

正确答案:E

3. 特点及答题方法 每道题由一个题干和五个备选答案组成,其中只有一个最佳答案,为正确答案,其余均为干扰答案。干扰答案或完全不正确或部分正确,或相互排斥。回答问题时,应找出最佳的或最适当的答案,排除似乎有道理而实际不恰当的答案。

(二) A₂ 型题:病历摘要型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例2 病人沈某,误服敌敌畏后,神志不清,家属送来急诊就医,需立即洗胃,你准备

的洗胃液是:

- A. 2%~4%碳酸氢钠溶液
- B. 3%过氧化氢钠溶液
- C. 0.1%硫酸铜溶液
- D. 5%醋酸溶液
- E. 蛋清水或牛奶

正确答案:A

3. **答题方法** 每一道考题是由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成。回答此类试题,要全面分析题干中所给出的各种条件,分清主次,选择正确答案。

(三) A₃ 型题:病历组型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例 3 女性 65 岁,清晨起床发现右侧肢体瘫软,血压降低,初诊为脑梗死。

1. 病人因脑梗死需输液治疗,应选用下列何种溶液

- A. 5%~10%葡萄糖溶液
- B. 50%葡萄糖溶液
- C. 5%葡萄糖氯化钠溶液
- D. 5%碳酸氢钠
- E. 右旋糖酐注射液

正确答案:E

2. 病人在输液过程中需加添溶液及药液时,以下哪项不符合要求

- A. 倒液进溶液瓶要紧贴输液瓶口,以免液体外溢
- B. 往输液瓶内加安瓿药时,应将药液吸入注射器内
- C. 往输液瓶内加药时,一定要取下注射器的针头
- D. 往输液瓶内加药时注射器的乳头应距输液瓶口约 1cm 处注入
- E. 加完药液后,需轻轻摇动输液瓶,使药液混匀

正确答案:A

3. 输液过程中,发现溶液不滴,护士在处理中以下哪项不妥

- A. 压力过低,可抬高输液瓶位置
- B. 静脉痉挛,可适当变换肢体位置
- C. 针头斜面紧贴血管壁,可调整针头位置
- D. 针头阻塞,应更换针头重新穿刺
- E. 针头滑出血管外,另选血管重新穿刺

正确答案:B

3. **特点及答题方法** 每一道题先开始叙述一个以病人为中心的临床场景,然后提出2~3个问题,每个问题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。每一个问题均与开始叙述的临床场景有关,但测试点不同。而且问题之间是相互独立的,每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。回答这类问题,要注意每个测试要点的区别,找出临床场景中能回答这个问题的相关部分。

(四) A₄ 型题:病历串型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例4 某高中女生,感冒后发热2天,热退后感心悸、胸闷、乏力,脉率45次/分,心律不齐,心电图部分P波后无QRS-T复合波,P-R间期固定,临床诊断为病毒性心肌炎,收入监护病房。该同学再三要求出院,担心住院影响学业。

1. 该同学的心律失常属

- A. 第一度房室传导阻滞
- B. 第二度房室传导阻滞Ⅰ型Ⅱ
- C. 第二度房室传导阻滞Ⅱ型
- D. 第三度房室传导阻滞
- E. 交界区性早搏

正确答案:C

2. 该同学首位的护理问题是

- A. 焦虑
- B. 舒适改变
- C. 活动无耐力
- D. 潜在心脏骤停
- E. 缺乏康复保健知识

正确答案:D

3. 对该同学采取的护理措施中,最重要的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 消除不良情绪
- C. 给易消化、富含蛋白质饮食
- D. 预防呼吸道感染
- E. 指导保健知识

正确答案:A

4. 住院第五天,该同学在病床上突然发生晕厥、四肢抽搐、心音消失,数秒后心音恢复,抽搐停止,逐渐转醒,应首先考虑

- A. 低血糖

- B. 阿-斯综合征
- C. 癫痫小发作
- D. 直立性低血压
- E. 癔病性晕厥

正确答案:B

5. 护士应提醒病人不可用力大便,因该动作在生理上引起的哪种反应可导致严重心律失常

- A. 兴奋交感神经
- B. 抑制交感神经
- C. 兴奋迷走神经
- D. 抑制迷走神经
- E. 增加肠腔内压力

正确答案:C

3. 特点和答题方法 每一道题先开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床场景,然后提出 3~4 个问题,问题之间是相互独立的,每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。每一个问题均与开始的临床场景有关,也与新增加的信息有关。回答这类问题,要以试题提供的信息为基础,提供信息的顺序对回答问题十分重要。

(五) B₁ 型题:配伍题

1. 答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次,多次或不被选择。

2. 例题

例 5 (78~79 共用备选答案)

- A. 无痛血尿
- B. 脓尿
- C. 血红蛋白尿
- D. 尿道出血
- E. 乳糜尿

78. 肾结核者出现

79. 膀胱癌者出现

正确答案:78. B 79. A

3. 特点及答题方法 每组题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个题干组成,答案在前,题干在后。答题时要求为每一个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不用。

(六) X型题:多重选择题

1. 答题说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例 6 肺炎球菌性肺炎的诱因是

- A. 受凉、淋雨
- B. 过度劳累
- C. 酒醉
- D. 精神紧张
- E. 营养不良

正确答案:ABCD

3. 每一道题由一个提干和五个备选答案组成,正确答案不止一个,答题时注意所给出的条件。

目 录

模拟试卷一

基础知识卷.....	(1)
相关专业知识卷	(11)
专业知识卷	(22)
专业实践能力卷	(33)
答题卡	(45)
参考答案	(53)

模拟试卷二

基础知识卷	(55)
相关专业知识卷	(65)
专业知识卷	(76)
专业实践能力卷	(87)
答题卡	(97)
参考答案.....	(105)

模拟试卷三

基础知识卷.....	(107)
相关专业知识卷.....	(117)
专业知识卷.....	(128)
专业实践能力卷.....	(139)
答题卡.....	(149)
参考答案.....	(157)

模拟试卷一

基础知识卷

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 高血压病致病理性改变的器官一般不包括
A. 眼底
B. 脑
C. 心脏
D. 肾脏
E. 肝脏
2. 颈静脉怒张多见于
A. 右心衰竭
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 高血压
D. 二尖瓣狭窄
E. 甲状腺功能亢进
3. 色甘酸钠主要用于
A. 控制哮喘发作
B. 预防哮喘发作
C. 改善通气功能
D. 抗感染
E. 止咳化痰
4. 心包积液病人常有的脉搏是
A. 水冲脉
B. 短绌脉
C. 奇脉
D. 交替脉
E. 不整脉
5. 可以继续使用洋地黄药物的情况是
A. 视力模糊
B. 室性早搏二联律
C. 原有的心房颤动变规律起来
D. 恶心呕吐
E. 心率快达 100 次/分钟以上
6. 相对危险性最大的心律失常是
A. 室上性阵发性心动过速
B. 二度房室传导阻滞
C. 室性早搏二联律
D. 心房颤动
E. 室性阵发性心动过速
7. 吸气性呼吸困难的发生机制是
A. 上呼吸道狭窄
B. 细小支气管狭窄
C. 肺组织弹性减弱
D. 麻醉药抑制呼吸中枢
E. 呼吸面积减少
8. 呼吸衰竭的主要诱因是
A. 过度劳累
B. 精神紧张
C. 呼吸道感染
D. 营养不良

- E. 长期吸烟
9. 产生盐酸的胃黏膜细胞是
 - A. 表层柱状上皮细胞
 - B. 黏液细胞
 - C. 主细胞
 - D. G 细胞
 - E. 壁细胞
10. 肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是
 - A. 有利于腹水消退
 - B. 增加回心血量
 - C. 减轻心脏负荷
 - D. 减轻呼吸困难
 - E. 降低腹内压力
11. 抢救糖尿病酮症酸中毒首要的和关键的措施是
 - A. 防治诱因
 - B. 使用小剂量胰岛素
 - C. 补液
 - D. 纠正电解质及酸碱平衡失调
 - E. 纠正脑水肿
12. 库欣病的病因是
 - A. 垂体分泌 ACTH 过多
 - B. 异位 ACTH 分泌过多
 - C. 肾上腺皮质腺瘤
 - D. 肾上腺皮质腺癌
 - E. 不依赖 ACTH 的肾上腺大结节性增生
13. 肝性脑病昏迷病人,其饮食护理最重要的是
 - A. 注意水电解质平衡
 - B. 增加糖的供应,降低血氨生成
 - C. 供给足够热量,减少蛋白质生成
 - D. 暂停蛋白质供应,减少氨的生成
 - E. 每天饮水大于 2L 以增加排泄
14. 甲亢病人甲状腺肿大的特征是
 - A. 弥漫性对称性肿大
 - B. 质软、表面光滑
 - C. 质硬、表面有结节
 - D. 固定、不活动
 - E. 触及震颤和听到血管杂音
15. 肾性水肿最先出现于
 - A. 眼睑、颜面
 - B. 胸腔、腹腔
 - C. 足踝、胫前
 - D. 背部、骶部
 - E. 会阴部
16. 再生障碍性贫血的发生机制为
 - A. 造血原料缺乏
 - B. 骨髓造血功能低下
 - C. 急性失血
 - D. 严重感染
 - E. 红细胞破坏
17. 出现交叉性瘫痪时病变部位在
 - A. 大脑皮质
 - B. 脑干
 - C. 内囊
 - D. 小脑
 - E. 脊髓
18. 高渗性脱水的原因不包括
 - A. 高热
 - B. 长期禁食
 - C. 呼吸增快
 - D. 大量输注葡萄糖
 - E. 长期昏迷而未补液
19. 以迅速扩充血容量为目的时,下列液体中应选用
 - A. 低分子右旋糖酐
 - B. 0.9%氯化钠

- C. 5%葡萄糖等渗盐水
D. 10%葡萄糖液
E. 5%碳酸氢钠
20. 以下说法不正确的是
A. 金黄色葡萄球菌感染容易局限
B. 溶血性链球菌感染容易扩散
C. 铜绿假单胞菌对大多数抗生素不敏感
D. 大肠埃希菌感染脓液臭味
E. 脆弱拟杆菌感染脓液恶臭
21. 哪种溶液不可用来冲洗伤口
A. 70%乙醇
B. 0.9%氯化钠
C. 3%过氧化氢
D. 0.02%高锰酸钾
E. 0.5%PVP-碘
22. 甲状腺功能亢进属
A. 代谢性疾病
B. 自身免疫性疾病
C. 遗传性疾病
D. 先天性疾病
E. 内分泌失调性疾病
23. 急性乳房炎常见于
A. 未婚女性
B. 妊娠妇女
C. 产后3~4周的哺乳期妇女
D. 产后6个月的哺乳期妇女
E. 未哺乳妇女
24. 腹外疝的主要病因是
A. 腹腔感染
B. 营养不良
C. 长期吸烟
D. 遗传因素
E. 腹壁缺损和腹内压增高
25. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是
A. 腹腔内有无原发病灶
B. 病原菌的种类不同
C. 有无并发休克
D. 腹痛的性质不同
E. 有无腹内脏器损伤
26. 胃癌最多发生于
A. 胃窦部
B. 贲门部
C. 胃后壁
D. 胃大弯
E. 胃小弯
27. 急性阑尾炎的主要病因是
A. 细菌侵入
B. 急性肠炎
C. 肠道蛔虫
D. 急性腹膜炎
E. 阑尾管腔梗阻
28. 乙状结肠扭转多见于
A. 长期负重者
B. 习惯性便秘者
C. 排尿困难者
D. 晚期妊娠者
E. 饱餐后剧烈运动者
29. 直肠癌最主要的转移途径是
A. 直接蔓延
B. 腹腔内种植转移
C. 腹腔内播散
D. 淋巴转移
E. 血行转移
30. 肛瘘常发生在下列哪种治疗后
A. 痔注射疗法后
B. 肛裂切除术后

- C. 血栓外痔剥离术后
D. 肛管周围脓肿切开引流术后
E. 内痔切除术后
31. 门-腔静脉交通支中,最重要的是
A. 胃底、食管下端交通支
B. 直肠下端交通支
C. 腹壁交通支
D. 腹膜后交通支
E. 肠系膜血管交通支
32. 下列胆色素结石形成的原因中,应除外
A. 大肠杆菌产生 β -葡萄糖醛酸酶增多
B. 结合胆红素被水解
C. 结合胆红素与钙离子结合
D. 胆红素钙是胆色素结石的重要基础
E. 胆道蛔虫引起
33. 下列哪项不是血栓闭塞性脉管炎的因素
A. 长期吸烟
B. 气候寒冷潮湿
C. 性激素失调
D. 下肢活动较少
E. 自身免疫功能紊乱
34. 泌尿系结石的形成与下列哪种因素无关
A. 痛风
B. 长期卧床
C. 饮水不足
D. 尿路梗阻
E. 代谢紊乱
35. 良性前列腺增生的发生主要与下列哪项因素有关
A. 前列腺炎
B. 习惯性便秘
C. 泌尿系感染
D. 泌尿系结石
E. 男性激素代谢失衡
36. 后尿道损伤的常见原因是
A. 骑跨伤
B. 骨盆骨折
C. 膀胱镜检查致伤
D. 手术误伤
E. 插尿管损伤
37. 骨折按病因分类,其中不妥的是
A. 创伤性骨折
B. 压缩性骨折
C. 疲劳性骨折
D. 撕脱性骨折
E. 病理性骨折
38. 急性血源性骨髓炎病人健康史调查中,无重要意义的是
A. 发病近期有化脓性感染病史
B. 发病近期有局部损伤史
C. 发病近期有感冒病史
D. 营养状况不良
E. 从事体力劳动
39. 肘关节脱位常见类型是
A. 前脱位
B. 后脱位
C. 外侧方脱位
D. 内侧方脱位
E. 半脱位
40. 有关排卵的描述,正确的为
A. 排卵发生在下次月经来潮前 14 天
B. 排卵应在月经周期的中间
C. 每个月经周期必须排出一个卵子

- D. 自青春期起便周期性规律排卵
E. 排出的卵子直接进入输卵管
41. 最易引起脐带脱垂的先露衔接不良的胎先露是
A. 面先露
B. 颏先露
C. 额先露
D. 臀先露
E. 前凶先露
42. 慢性宫颈炎最常见的病理表现是宫颈
A. 息肉
B. 出血
C. 腺体囊肿
D. 肥大
E. 糜烂
43. 关于生长发育的规律,以下提法哪项是错误的
A. 生长发育是一个连续的过程
B. 在量的增长过程中发生质的改变
C. 各器官系统发育速度不平衡
D. 神经系统的发育是先慢后快
E. 有一定的个体差异
44. 幼儿期是指
A. 生后 29 天~1 周岁
B. 1~3 周岁
C. 2~5 周岁
D. 3~5 周岁
E. 4~6 周岁
45. 出生时体重为 3.1kg,生后 9 个月的体重应为
A. 6.5kg
B. 7.0kg
C. 7.5kg
D. 8.0kg
E. 8.8kg
46. 新生儿破伤风病原体入侵的途径主要为
A. 皮肤
B. 黏膜
C. 脐部
D. 胎盘
E. 呼吸道
47. 鹅口疮的病原体为
A. 链球菌
B. 葡萄球菌
C. 变形杆菌
D. 白色念珠菌
E. 乳酸杆菌
48. 可经饮水传播的小儿传染病是
A. 乙型肝炎
B. 乙型脑炎
C. 细菌性痢疾
D. 血吸虫病
E. 钩端螺旋体病
49. 金某,男性,70 岁,诊断为高血压性脑出血。提示颅内仍出血不止的是
A. 持续高热
B. 呈潮式呼吸
C. 血压增高、脉搏缓慢而充实
D. 两侧瞳孔等大
E. 意识障碍进行性加重
50. 范某,因急性心肌梗死住院,现胸痛难忍、呼吸急促。此时首优护理诊断是
A. 冠心病 与心肌梗塞有关
B. 胸痛 与心肌缺血缺氧有关
C. 缺氧 与心肌梗塞有关
D. 焦虑 与胸痛有关

- E. 心肌梗死
51. 王某, 男性, 62 岁高血压心脏病史 7 年, 近 3 个月每当稍快行走或梳洗时, 感到心悸、气短。该病人目前属于
- 心功能一级
 - 心功能二级
 - 心功能三级
 - 心功能代偿期
 - 心功能四级
52. 白血病患者, 高热 39℃, 有咳嗽、咳痰、抽搐一次。最适合的降温措施是
- 遵医嘱给抗生素
 - 遵医嘱给退热药
 - 乙醇擦浴
 - 大血管处放冰袋
 - 冰水灌肠
53. 某尿毒症病人, 用 5% 碳酸氢钠溶液纠正酸中毒, 静脉滴注将完毕时突然出现手足抽搐。最可能的原因是
- 脑水肿
 - 低血磷
 - 低血钙
 - 碱中毒
 - 低血钾
54. 女性病人, 30 岁, 因甲亢服药无效, 拟在颈丛神经阻滞下行甲状腺大部分切除术, 术前不宜选用
- 苯巴比妥钠
 - 哌替啶
 - 阿托品
 - 氟哌利多
 - 地西洋
55. 某女士, 26 岁, 孕 52 天行人工流产术, 若术中不慎损伤穿破阴道后壁, 最可能伤及邻近器官是
- 直肠
 - 阑尾
 - 膀胱
 - 尿道
 - 输尿管
56. 某孕妇, 妊娠 53 天少量阴道流血, 诊断为“先兆流产”, 使用药物“黄体酮”保胎, 其作用是运用孕激素功能中的
- 使子宫内膜由增生期转为分泌期
 - 使宫颈闭合, 黏液减少变稠
 - 降低子宫肌肉对催产素的敏感性
 - 抑制输卵管的蠕动
 - 对下丘脑、垂体的负反馈作用
57. 楼老太太, 绝经 9 年, 主诉外阴烧灼感数周, 近日分泌物呈脓血样。诊断为老年性阴道炎, 最常用的治疗方案是
- 大剂量抗生素
 - 碱性溶液冲洗阴道
 - 酸性溶液冲洗后用小剂量雌激素
 - 酸性溶液冲洗加甲硝唑
 - 阴道泡腾片加克霉唑
58. 瑶瑶, 体重 9.2kg, 身高 75cm, 头围 46cm, 胸围 46cm, 牙齿 8 枚, 其年龄约为
- 8 个月
 - 10 个月
 - 12 个月
 - 16 个月
 - 18 个月
59. 一个 2 个月婴儿体重 4kg, 每日给 8% 糖牛奶 440ml, 如用奶粉代替, 每月需奶粉多少千克
- 1.25
 - 1.65