

中医学校試用教材

# 中医妇科学中級講義

成都中医药学院妇科教研组 编

北京中医学院 南京中医学院 上海中医学院

广州中医学院 成都中医学院

肇庆、烟台、石家庄等中医学校

代表会議 审訂

人民卫生出版社

## 編 写 說 明

中华人民共和国卫生部为了解决中医学校的教材問題，于1960年3月間在上海召开中医高級教材审查會議期間，組織北京中医学院、南京中医学院、上海中医学院、广州中医学院、成都中医学院等五个中医学院编写一套中医中級教材。并对这套中医中級教材的編写目的、基本內容要求，作了明确的指示。各学院按照指示精神，分头积极进行編写。同年9—10月間各学院先后編成初稿，分发各地中医学院、中医專科学校、中医学校征求意见。經汇集整理后，又作了一次全面的修改。卫生部遂于1961年4—5月間在成都召开了中医中級教材审查會議。在这次会议中，除了有主編單位的代表参加外，并有河南、安徽中医学院，苏州、蕪湖中医專科学校，重庆、烟台、石家庄、河間、复县、博罗等中医学校，江阴卫生学校，晋江医士学校的代表參加，經反复討論，修訂审定后，交由人民卫生出版社出版，作为当前中医学校、卫生学校中医班、中医学徒班的試用教材。

本試用教材，計有：中国医学史中級講义、語文講义、內經中級講义、中藥学中級講义、中医方劑學中級講义、伤寒論中級講义、温病學中級講义、中医診斷學中級講义、中医內科學中級講义、針灸學中級講义、中医外科學中級講义、中医伤科學中級講义、中医妇科學中級講义、中医兒科學中級講义、中医眼科學中級講义、中医喉科學中級

講義、中醫各家學說及医案選中級講義等。

本試用教材的各科內容，是根据中醫學校的教学實際情況，用現代語言敘述了中醫的基本理論知識和臨証經驗，并密切地注意了各科之間的有機联系和理論联系實際的問題，務求達到系統、簡明的基本要求，以适应当前中醫学校教學上的需要。

由于我国医学科学和医学教育事業正在迅速发展，中西医結合研究的新成就和教學實踐中的新經驗，正在不斷增長，因而，本試用教材必須隨時修訂、补充，并加以提高，使之逐步成为合乎教科書水平的中醫中級教材，更好地为社会主义建設服務。为此，热望全国中西医教師們、各地讀者們多提宝贵意見，共同完成這項光榮任務。

中醫中級教材审查會議

1961年5月

# 目 录

緒 言 .....	1	第六节 崩漏 .....	30
总 論			
第一章 妇女的生理病理特点 .....	2	第二章 帶下病 .....	32
第一节 生理特点 .....	2	第一节 白带(包括赤白带) .....	33
第二节 病理特点 .....	6	第二节 黃帶 .....	34
第二章 診斷概要 .....	8	第三章 妊娠病 .....	35
第一节 問診 .....	8	第一节 憋阻 .....	36
第二节 切診 .....	9	第二节 胎动不安、胎漏、墮胎、小产 .....	37
第三节 辨証 .....	10	第三节 妊娠腹痛 .....	40
第三章 妇女卫生概說 .....	12	第四节 轉胞 .....	41
第一节 經期卫生 .....	12	第五节 子淋 .....	42
第二节 孕期卫生 .....	13	第六节 子肿 .....	43
第三节 臨产的护理 .....	13	第七节 子癟 .....	44
第四节 产后卫生 .....	14	第八节 子煩 .....	46
第四章 治法概要 .....	14	第九节 子嗽 .....	47
第一节 調氣血 .....	14	第十节 子懸 .....	48
第二节 和脾胃 .....	15	第十一节 胎死不下 .....	49
第三节 养肝腎 .....	15	第十二节 難产 .....	50
各 論			
第一章 月經病 .....	16	第四章 产后病 .....	51
第一节 月經不調 .....	17	第一节 胎衣不下 .....	51
第二节 經行吐衄 .....	23	第二节 产后血晕 .....	52
第三节 經前便血 .....	24	第三节 产后腹痛 .....	53
第四节 痛經 .....	25	第四节 恶露不下 .....	54
第五节 經閉 .....	26	第五节 恶露不絕 .....	55
		第六节 产后发热 .....	56
		第七节 产后发痉 .....	57

第八节 产后大使难	58	第一节 不孕	63
第九节 产后小便频数与不禁	59	第二节 瘢瘕	65
第十节 产后小便不通	60	第三节 肝躁	66
第十一节 乳汁缺乏	61	第四节 阴痒	66
第十二节 乳汁自出	62	第五节 阴挺	67
<b>第五章 妇科杂病</b>	<b>63</b>	第六节 阴吹	68

## 緒　　言

妇科学是預防和治疗妇女特有疾病，保障妇女健康的一門學科。

妇女的一般疾病，基本与男子相同，其治疗方法亦包括在临床各科中。但妇女有月經、胎产等不同于男子的生理特点，因而产生了一些特有的疾病，所以在診斷、預防、治疗等方面，必須进行专门学习。

妇科学的范围，包括經、帶、胎、产、杂病五个部分。本講义就是根据这个范围编写的。全书分总論、各論两部分。总論中着重叙述女子的生理、病理特点，指出妇科疾病的病机和診斷、治疗的基本原則。各論中分別叙述月經、帶下、妊娠、产后、杂病等常見疾病的病因、証状、治法和常用方药。在編写方法上，着重理論联系实际，使学者通过学习，能系統地掌握妇科的辨証施治規律，临証时能灵活地运用理、法、方、药来治疗疾病。

妇科学虽是一門专科，但与其他各科是相互联系不可分割的。因此，在学习时必须与各科相互参考，以貫串祖国医学的系統性，并在掌握講义內容的基础上，进一步学习有关著作，不断提高，为保障妇女健康，加速社会主义建設而努力。

# 總論

## 第一章 妇女的生理病理特点

### 第一节 生理特点

#### 甲、女子胞

女子胞一名胞宮，又名子宮，它的位置在小腹的正中綫，膀胱的后面，直腸的前面，是女子生理上的特殊器官。“內經”称它为“奇恒之府”，主月經和胎孕。它与冲脉和任脉有密切的联系，胞所以能够发挥它的生理作用，主要是受冲任的影响。“內經”上說：“任脉通，太冲脉盛，月事以时下。”，就說明了它們的密切关系。

此外，胞的脉絡又上通于心，下通于腎，和心腎也有联系。心生血，腎藏精，心腎功能正常，精血能达到胞中，则月經胎孕正常；如果胞脉阻塞，可以使心氣不能下达于胞，发生經閉；或腎氣不能上榮于舌，出現子癥。

总的說來，胞虽為“奇恒之府”，但不是孤立的，它与脏腑、經脉都互相联系，尤其和冲、任、心、腎的联系更为密切。通过这些联系，胞才能发挥它的正常作用，这是学习妇科学首先應該了解的。

#### 乙、冲、任、督、帶

冲、任、督、帶是奇經八脉的一部分，它們在妇女的生理上，有着重要的作用，其中以冲、任的功用更为显著。

冲脉是总領十二經气血的要冲，起自胞中，上行至头，下行到足，前行于腹，后行于背，是五臟、六腑、十二經脉气血会聚的地方，

古人称它为：“五脏六腑之海”或是“十二經之海”，又有称为“血海”的。妇女血海满盈，就能上行成为乳汁，下行成为月經。

任脉起自会阴，經過胞中，沿腹向上行，是全身阴脉总汇的地方，有总任一身阴脉的作用，古人称它是“阴脉之海”。因为它与胞宫相連接，又有主持女子生育的功能。

督脉亦从会阴出发，沿着脊柱向上行，有总督全身阳脉的作用，古人称它是“阳脉之海”。

帶脉环繞腰部一周，它的主要作用是約束其它經脈，加强經脈間的相互联系。

冲、任、督、帶，虽然各有不同的作用，但它们又是密切联系的。冲脉、任脉都与胞中发生联系，冲是血海，任主胞胎，任脉暢通，冲脉旺盛，二脉相互資生，就会产生月經；有月經就有受孕生育的能力，这就是冲、任二脉在妇女生理上的特殊作用。

督、帶二脉又与冲任相通；督、任、冲三脉都要通过会阴部，在这里相互联系。帶脉因为有約束一身經脈的作用，循行全身的經脈都要和它联系，冲、任、督三脉都有絡脉和它相通。古人把冲、任、督、帶的关系說成是：“三脉（冲、任、督）同起而异行，皆絡于帶脉”。就这样使它们紧密联系，相互影响，构成一个有机联系的系統。这个系統对于妇女的月經、生育等有直接的关系。

### 丙、月 經

健康的女子一般到14岁左右，就开始出現月經，月經的周期約为1月一次，日期大致不变。古人因为它每月到期即来，和月的到期必圓，經常不变一样，所以叫它是月經，又叫月信或月水、信水。

产生月經的机理，主要在于腎氣和冲、任的作用。腎藏精，主持人体的生长发育，女子到7岁左右，腎氣逐漸旺盛，身体上发生显著的变化，开始更換牙齿，这时头发也开始长得更好。到了14

岁左右，肾气更加充沛，五脏、六腑都发育得更完善，生殖机能成熟，冲脉、任脉开始发挥它的作用。这时血海满溢，就出现月经。

产生月经的主要机理，虽是在于肾气和冲、任，但月经是血所化，它的主要成分是血，而血和五脏又有着密切的关系。从五脏的功能来说，心主血，肝藏血，脾统血，又是生化血液的源泉；肾除了藏精和主持生长发育而外，又主髓，精髓又能化成血；肺虽然与血的生化没有直接关系，但血的流行，一定要依靠气来推动，而肺主持周身的气，所以血的正常运行，和肺气也有密切关系。可见五脏分别担任着血的生化、储藏、统摄、调节、运输等重要工作，与血直接相关。因此，五脏的功能正常，则血脉通暢，血海才能充盈，月经也才能按期来潮，所以在产生月经的机理上，五脏也有着重要的作用。

正常的月经，平均约28天来一次（可能差错2—3天），排血时间一般是3—5天，排出量约50—100毫升，颜色呈暗红色，初来时较淡，逐渐加深，最后又转淡红，一般不凝结，无血块、无特殊臭味。

月经除了妊娠和哺乳期而外，都是有规律的按期而来，另外，也有每两个月来一次的，叫做“并月”，3个月来一次的，叫做“居经”（又叫“接季”或“季经”），1年才来一次的叫做“避年”，终身不来月经又能受孕的叫做“暗经”，受孕以后仍然按期排出少量月经，并不影响胎儿的叫做“激经”（又叫“盛胎”或“坼胎”），这些都是生理的特殊现象，并非疾病。

在月经来潮及行经时，可能有轻微的小腹及腰背坠胀，头昏痛，乳房作胀，全身疲倦，饮食减少，情绪容易波动等现象，一般在月经过后自然消失，不属病理范围。

月经在初潮和经绝时期，往往出现不规则的情况。初潮期常有周期延迟或停闭2—3月的，如果没有特殊的症状，可以不必治疗，短期内即可达到正常。经绝期常有月经周期延长，或时先时后，并可能伴有发烧，多汗，失眠，容易发怒，食欲不振等现象，这种

情況應該給予治療。如果周期不規律而流血量多，或是月經已停忽然又來，都應該注意有無惡症存在，當早作詳細檢查，以免耽誤病情。

## 丁、妊娠

胎孕的形成是男女之“精”的結合，“精”是構成人体的基本物質，它具有生殖和生長發育的能力。人的精是儲藏在腎的。男女兩性在發育成熟以後，腎精充足，這時兩性相交，兩精結合，就可以構成胎孕。

受孕以後，生理上起了一些特殊變化。首先由於要供給胎儿的營養，就必須分一部分血來養胎，從全身的氣血來說，就形成了血分不足，氣分相對有餘的現象，這是妊娠的主要生理特點。

妊娠的生理現象，還有月經停止，陰道分泌物增多，乳房逐漸膨大，乳頭和乳暈的顏色加深，並有圓形顆粒突起。在妊娠初期，可以擠出一些乳汁，面部前額及腹部中綫有色素沉着，呈棕褐色。在妊娠3個月後，隨著胎儿的發育，子宮逐漸增大，小腹開始膨隆。4個月後，孕妇可以自覺胎動。在妊娠初期常有食欲異常，喜吃酸味飲食，並有輕度的恶心作嘔，晨起頭昏。末期常有小便頻數，大便祕結。

## 戊、臨產和產後

受孕到了280天左右（約9個半月）就要生產。正常的生產過程，是一種生理的自然現象，一般沒有什麼痛苦。在臨產時，先出現腰部及腹部陣陣作脹，小腹亦感到重墜，這是子宮開始收縮，促使胎儿娩出的現象，這種墜脹開始較輕，間歇的時間亦較長，以後愈來愈緊，漸至肛門墜脹，產戶窘迫，象大小便都急樣子，這時產門全開，胎儿头部首先露出，接着全身逐漸娩出产妇體外。在胎儿娩出以後，約10—15分鐘，小腹部又開始發生墜脹，阴道繼續流

血，随着腰墜和流血，胎衣逐渐娩出，整个产程到此才算结束。

由于生产时的疲乏和出血，使体内的阴血驟虛，津液不足，阴虛不能潜阳，阳气就易浮散，腠理不密。因此，在产后的第一天，可能出現輕微的发燒，怕冷，出汗，脉迟緩等現象，这种現象如果迅速消退，不作疾病处理。此外，因产时胞宮的损伤，产后阴道內有恶露流出，先是鮮紅的血液，以后漸淡呈粉紅色，一般在20天左右自止，有些产妇在产后几天内；小腹有輕微陣痛，一般經過15天即可消失，产妇經過40—50天的休息，除因哺乳以致月經暫時停止而外，整个身体都恢复孕前常态。

## 第二节 病理特点

**一、病因** 产生妇科疾病的原因，和其它临証各科一样，不外六淫、七情以及飲食、劳倦、房室等所损伤，但是在这些原因中，妇科仍有它的特点。

从外感六淫來說，往往容易侵害妇女的血分，血受热則流行加速，受寒就凝滞不通。热盛就会迫血妄行，常常引起月經先期、过多、崩漏、經行吐衄、經前便血等病。寒盛就会使血凝結壅塞，容易引起月經后期、量少、痛經、經閉、癥瘕等病。此外风和湿亦常常侵襲冲、任，引起癰聚、白帶、痛經、月經不調等病。

七情的刺激，是妇科疾病的主要因素。在旧社会里妇女遭受重重压迫，常有忧、思、悲、恐、惊等七情的刺激，影响五脏的正常功能，引起疾病。今天妇女获得了彻底的解放，这些由于遭受压迫所致的七情刺激因素已不存在；但是妇女在月經、胎产等时期中情绪容易波动，因此，由七情引起的疾病，临証上仍然多見。

房室不节也是引起妇科病的一个重要因素，因为性生活过度，往往损伤冲、任和肝、肾，产生經、帶、胎、产等方面的疾病。

**二、病机** 妇女疾病的致病因素，虽然以六淫、七情、房室等为主，但是必须引起以下的病理变化，才能发生疾病。

1. 气血不調：这是产生妇科疾病的主要病机之一。因为月經、胎产都和血分有密切关系，在經期、胎产中容易伤血而引起疾病。血与气又有着不可分割的关系，血賴气来运行，气以血作依附，血的虚实、寒热、升降都是随气变化。一般說来，气虛血亦虛、气实血亦实；气寒血就寒，气热血就热；气升血就隨气上升，气陷血就隨气下陷。无论什么因素，只要影响了气或血，引起气血不調，就可以产生妇科疾病。

2. 五脏不和：也是产生妇科病的主要机理之一。妇女以血为本，血的来源又与五脏有密切关系，任何因素，只要影响到五脏的功能，引起血气的病变，就可以产生妇科疾病。例如忧愁思虑伤心，致使心气不通或心血不足，常易发生月經不調、閉經、不孕等病；大怒伤肝，血不循經，或肝郁气滯，阻碍血行，常易引起月經不調、經閉、崩漏、經行吐衄、痛經等病；飲食劳倦或忧思伤脾，脾虛气弱，可以引起中气下陷，失去統摄血液的作用，或运化无力，血虛不足，发生崩漏、帶下、經閉等病；外感六淫或悲哀过度，致使肺气损伤，不能运血，可以引起血虛或血枯，形成月經停閉，身体瘦削，甚至成为痨瘵；久坐湿地或驟然受到惊骇，或性生活过度，都能耗伤肾气，引起月經不調、崩漏、帶下、流产、不孕等病。

3. 冲、任二脉损伤：这是妇科病最主要的机理。冲脉、任脉的功能正常，月經按时来潮，才能怀孕生子，如果受了各种不良因素的刺激，产生了病变，血海不能按时滿盈，胞胎亦无所系，就会引起种种疾病。

气血、五脏、冲脉、任脉，虽是各有不同的作用，但其相互之間又有密切的联系，經、帶、胎、产都为冲脉、任脉所主持，而二脉又必須接受来自脏腑的气血滋养，才能发挥它的作用。因此，无论何种因素，只要影响了其中之一，就可以引起冲、任二脉的病变而发生疾病。

## 第二章 診斷概要

妇女由于有生理、病理上的特点，一般人都把妇科病称为“隐疾”，在临証上亦常有些患者有羞涩心理，不能暢述病情，所以妇科病的診斷方法，虽然和临証各科一样，但又應該根据它特点，着重問診和切診，才能深入地了解病情，掌握資料，以作辨病、治疗的参考。本章根据妇女的特点，講述有关經、带、胎、产的問診和切診以及它的辨証要点。其与各科相同的，则不重述。

### 第一节 問 診

一、問月經 診斷妇科疾病，首先要問她的月經周期是否准确，有无超前或錯后，經量的多少，顏色的深、淺、紅、紫、黑，質的粘稠或稀薄，有无特殊的臭氣，以及月經來時腰、腹、胸、胁有无脹或痛的現象。如果經期超前，經量亦多，顏色紫紅，面色紅潤，口渴喜飲冷飲，这种現象多是熱証。月經錯后，量少，顏色黯紅或淡紅，小腹疼痛有冷感，这些現象多为寒証。月經異常，小腹脹痛不能按，多是實証。隱痛不甚劇，按之即減輕，多屬虛証。月經欲來未來，小腹作脹，多是氣滯。月經將盡或已盡，小腹空痛，多是血虛。月經量多或過期不止，色深紅或紫，有臭氣，多是血熱。經色如黑豆汁，四肢冷，小腹冷痛，多是虛寒。月經停閉2月，晨起恶心作嘔，喜吃酸物，精神疲倦，一般是早期妊娠的現象。停經4月以上，乳房作脹，小腹部膨隆，自覺有微動，是中期妊娠。月經數月不行，头目眩晕，心悸气短，食欲不好，逐渐消瘦，又沒有胎动現象的大多是經閉。

二、問帶下 帶下是妇女常有的現象，如帶下过多，可以引起很严重的疾病。因此，在問診方面除詢問月經情況外，还要詢問

无带下以及带下的顏色、多少、清浊、有无臭气等。一般色白而清稀的多是虛症，色黃或赤，稠粘有臭气，多是实証、热証。如果帶下量多、色白、大如鼻涕，精神疲倦，飲食减少，多是脾湿下注。帶下呈淡黃色或淡綠色，稠粘有臭气，常自觉外阴搔痒发痛，多属湿热蘊积。白带中混杂血液，微有腥臭，多为肝热脾湿。帶下顏色灰白混浊，有异味，有时夹杂血液，多属陰惡之症，应注意仔細檢查。

三、胎产 診斷妇科疾病，除了詢問月經、帶下而外，还要詢問患者是否已經結婚。如已結婚，应进一步詢問是否有生育史，以及生了几胎，有无小产，生产时的情况是否正常，有无难产，出血量的多少，恶露的多少等。如果結婚數年不孕，或已經生育过又數年不孕，經常腰部痠脹以及受孕后經常流产，大多是腎氣虛弱，冲任亏虛的現象。如生产多次或产后失血过多，就应考慮到气血不足的情况。

从以上月經、帶下、胎产的問診所收集的資料中，可以了解患者气血的盛衰，身体的强弱，有什么旧病等，这对分析病情的寒、热、虛、实有很大的帮助。

## 切 診

脉位、脉象、脉势來說，是和臨証各科相同的，但在胎产方面又有她的常脉和病脉，根据脉象結合其它的現象，分析病情，在診妇科疾病方面，确有一定价值。因此，本节将切診問題作一概略的講述。

一、月經脈 妇女在月經將來或正來時，气血比較旺盛，如果没有發燒、头痛、口苦等外感或熱病的現象，右寸出現浮洪的脉搏，這是經期的常脉，不作病脉論。

月經停閉，尺脉微涩，是血虛不足的虛証，如尺脉現滑而又不很匀称，是血实气滞的实証。

崩中漏下，脉应虛大或弦數。如出血很久不止，脉又應該細小

或芤迟，反而出現虛涩或數实脉，當是預后不良的現象。

**二、妊娠脉** 經停2—3月后，脉象和平，沒有弦勁涩伏的現象，而有嘔惡不思食等証狀，或右寸及兩尺滑甚，是早期妊娠的脉象。体弱的妇女，平时脉就微弱，孕后不見滑脉，但觉尺脉連續鼓指，亦是有胎的脉象。怀孕以后，六脉俱見沉細或短涩，或两尺脉弱，常易墮胎，应注意預防流产或早产。

妊娠期中感受风寒，脉應緩滑流利，如見虛涩躁急，就要預防墮胎。胎前腹泻，脉應滑小，反出現洪數脉，亦有墮胎的可能，這些都是妊娠期應該注意的脉象。

怀孕已經足月，脉搏出現浮数散乱或沉細而滑，叫做子經脉，這是临产的脉象。另外，临产时在孕妇中指第三节的两侧到指尖，可以診得脉搏跳动，出現这样的脉搏，就可以作分娩的准备。

**三、产后脉** 生产以后，因为疲倦和出血的关系，脉多虛緩和平，如果脉現洪大弦牢，或出血不止，尺脉又不能上达关部，預后多不良。产后中风或患熱病，脉象應浮弱和緩，反而出現小急悬絕的，亦多預后不良。

以上是妇科中常見的脉象，除掌握这些特点外，還要結合望、聞、問所收集的資料，加以綜合分析，能得到正確的診斷。

### 第三节 辨 診

妇女病的致病因素，常以寒、热、痰、湿及七情所伤为多，这些因素又容易损伤气血。因此，診断妇科疾病必須掌握这些特征，根据八綱辨証的精神，首先分清寒、热、虛、实，再进一步考察其在气在血，属痰属湿，这样就能从复杂的証候中抓住辨証的綱領，进行分析处理。为了便于学习和掌握，扼要列表于下：

妇科病常见证型辨证表

证型	一般症状	妇科疾病特征
虚证	气虚 面色㿠白，头痛头晕，精神倦怠，心悸气短，四肢或全身怕冷，语音低沉无力，唇、舌呈淡紅色，苔白潤，脉緩弱无力。	月經色淡，量多，質稀薄，或先期即來，或過期不止，或崩中下血，或淋瀝漏下。帶下色白，量多而稀薄，少腹下墜。阴挺不收。妊娠轉胞。产后胞衣不下，或小便失禁。
	血虚 面色蒼白或萎黃，皮肤干燥，心悸头晕，肌肉瘦削，唇舌淡紅色，苔薄或无苔，脉細澀或迟。	經色淡紅，或呈黃水样，量少，或后期而至，或停閉不來，腹痛綿綿喜揉按。胎萎不長，或胎動小產，产后易患血暈、發癱，大便難。
实证	气郁 胸脇脹滿不舒、或氣逆上冲，头痛目眩，或嘔苦吐酸，或腹脹大便秘結，舌質正常，苔黃白相兼，脉弦。	月經行而不暢，小腹脹甚而痛，經期或先或后，或無定期。帶下黃白，質稠粘。妊娠易患惡阻，产后易患腹痛。
	血瘀 腹脹滿疼痛，重按有包塊，痛處不轉移，大便色黑，舌色紫暗或有紫色小點，脉弦澀。	經前或經行初期，小腹絞痛，按之更甚，經色紫黑有塊，血块下后疼痛減輕，或月經停閉或小腹有癥瘕。产后易患血暈、惡露不下。
湿证	痰湿 体质多肥胖，面色浮白，头重眩晕，口淡无味，咳吐稀痰，胸部及脘腹作脹，食欲不振，大便稀溏，苔白膩脉滑。	月經多數延期，量多，色淡紅，質稠粘，亦可出現量少或經閉。白帶量多。不易受孕。孕后易患惡阻、子癥。
	寒证 面色蒼白，喜屈身蹲卧或閉目不見人，四肢清冷，爪甲色淡白，舌淡紅，苔白潤，脉沉迟无力。	經色黑黯清稀，狀如烟尘水，小腹冷痛，喜熱喜按，或月經后期，小腹陰部有冷感。帶下色白，清稀而有腥氣。易患不孕。

証型	一般証狀	妇科疾病特征
証 寒	面色青白，手足不温，爪甲略青，心恶欲吐，舌淡紅，苔白厚，脉沉紧。	經色黯黑稠粘，凝聚成块，少腹冷痛，手按之更甚，接触热物，疼痛稍减，或月經停閉，或結为癰瘕。
熱	面紅潮熱，手足心發燒，舌干色鋒，或无苔，或呈花剥苔，脉細數。	經色紅而量少，稠粘无臭氣，少腹熱痛，月經先期而來，或淋漓不止，或吐衄便血。帶下色黃稠粘，或雜有血絲。
証 熱	面紅目赤，口燥唇干，小便短赤，大便燥結，舌紅，苔黃燥，脉滑數有力。	經色深紅或紫赤，量多而稠粘，經期超前，或过多不止，或暴崩下血。
証 熱	面色紅黃垢膩，头眼而重，口舌干膩，胸悶脘脹，自觉痞塞不通，大便溏泄，解时不暢，小便黃少，苔黃膩，脉滑數。	月經超前量多，稠粘而雜有黃滑。帶下黃白，或有臭秽，陰戶灼熱有痒感。妊娠胎漏或易小產。

### 第三章 妇女衛生概說

妇女由于有月經、胎产等生理特点，其病因、病理多属七情和飲食、房室所伤。因此，在預防方面，不仅要避免六淫的侵襲，更重要的是避免七情的刺激，节制飲食、房室，不使伤害正气，以預防发生妇科疾病。

#### 第一节 經期卫生

月經雖是妇女的生理現象，但在行經的时候对机体也有一定