

四川省歷方彙編

第 二 輯

(成都中醫學院師生獻方專輯)

成都中醫學院編

四川人民出版社

四川省醫方彙編

第 二 輯

(成都中醫學院師生獻方專輯)

成都中醫學院編

四川人民出版社

1959年·成都

四川省医方采风录

第二輯

(成都中医学院师生献方專輯)

成都中医学院編

☆

四川人民出版社出版

成都状元街20号

四川省書刊出版業營業許可証出字第一号

四川省新华書店重慶發行所發行 重慶印制第一厂印刷

开本850×1168毫米1/32·142頁·8 $\frac{1}{2}$ 印张·205,600字

1959年11月第一版 1959年11月第一次印刷

印数1—5,000 定价:(7)9角2分

統一書号:14118·33

前 言

自从党号召开展采集百万锦方运动以来，我院全体中医教师受到极大的鼓舞，全院师生员工纷纷献出了自己的驗方和秘方。为了把貢獻出来和搜集起来的驗方秘方集中起来，加以分析和整理，供各地医务工作者作治疗上的研究和临床上的試用，使这些方剂进一步提高、推广，以丰富蓬勃发展的祖国医学的内容，我院全体教师和教研組的同志，在院党委的领导下，发挥了集体的力量，將我所貢獻出来的驗方秘方，作了系統的分析 and 整理，編成“四川省医方采风录第二輯（成都中医学院师生献方專輯）”一書，請四川人民出版社出版，供各地医务工作人員参考和試用。

因为献出来的驗方秘方种类較多，同类方剂疗效也各有差異，为了使讀者对各方的藥理作用和实际疗效有明确的理解和認識，我們在編写中还組織了部分中医教师对各类方剂作了研究和鑑定，并采用了以下分类分析的方法：

（一）凡藥物組合及适应范围准确合理的方剂，是符合临床应用标准的，也是我院需要推荐的，这类方剂，我們把它列为第一类方，并在該方的处方項下，註上“①”一个符号，以資与他类方剂鉴别。

（二）凡运用成方，但藥味剂量有所改变，或适应范围有所发展的方剂，也基本上是符合临床应用标准和我院推荐的方剂，我們則把它列为第二类方，并在处方項下註明“②”的符号，供讀者采用和推广。

（三）凡藥物組合、藥理作用（包括草藥）及适应范围暂时无法鉴别的方剂，我們則把它列为第三类方，并在处方項下註明“③”的符号，同时加上編者按語，仅供讀者临床上的

参考。

至于凡选用成方，无所增减，或虽有增减但临床意义不大，或方药中有显著的不合理的方剂，均未列入本书中，有待于进一步的审查和研究。

由于我们的水平有限，整理的时间也较仓促，书中有疏漏和不妥的地方，还希读者及时提出，以便再版时修订。

成都中医学院

1959年3月

目 录

內科（共三百〇九方）

乙型腦炎（三方）	（ 1 ）
腦膜炎（二方）	（ 2 ）
狂犬病（十六方）	（ 3 ）
破伤风（一方）	（ 8 ）
流行性感冒（一方）	（ 8 ）
瘧疾（十五方）	（ 9 ）
痢疾（十二方）	（ 15 ）
蛔虫病（二方）	（ 19 ）
鈎虫病（九方）	（ 19 ）
头痛（八方）	（ 23 ）
偏头痛（四方）	（ 25 ）
高血压（四方）	（ 27 ）
中风（三方）	（ 28 ）
半身不遂（五方）	（ 29 ）
眩暈（三方）	（ 31 ）
癲狂癩（七方）	（ 32 ）
风湿关节痛（二十一方）	（ 35 ）
身痛、腰痛（四方）	（ 43 ）
胸胁痛（四方）	（ 44 ）
肺結核（二方）	（ 46 ）
肺癰（四方）	（ 46 ）
哮喘（十三方）	（ 48 ）
咳嗽（十三方）	（ 52 ）

吐血（十四方）	（ 56 ）
咳血（三方）	（ 61 ）
衄血（五方）	（ 62 ）
便血（五方）	（ 64 ）
臌脹（二十七方）	（ 65 ）
水腫（十五方）	（ 76 ）
脚气（五方）	（ 81 ）
嘔吐、腹瀉、呃逆（十二方）	（ 82 ）
消化不良（四方）	（ 87 ）
胃痛（九方）	（ 88 ）
胃潰瘍（三方）	（ 91 ）
黃疸（六方）	（ 92 ）
疝气（五方）	（ 95 ）
脫肛（二方）	（ 96 ）
癱閉（四方）	（ 97 ）
小便失禁（四方）	（ 99 ）
淋症（一方）	（ 100 ）
遺精（四方）	（ 100 ）
外感溫熱（四方）	（ 102 ）
二陰（五方）	（ 103 ）
蕁麻疹（四方）	（ 105 ）
補益（五方）	（ 106 ）
中毒、預防、急救（七方）	（ 108 ）

婦科（共八十一方）

月經不調（七方）	（ 111 ）
經閉（七方）	（ 113 ）

痛經 (四方)	(116)
白帶 (六方)	(117)
崩漏 (十九方)	(119)
子癩 (三方)	(125)
子腫 (二方)	(126)
妊娠疾病 (八方)	(127)
難產 (二方)	(130)
產後疾病 (六方)	(131)
子宮脫出 (八方)	(133)
子宮癆 (一方)	(135)
癥瘕 (三方)	(136)
陰痒 (五方)	(137)

兒科 (共五十一方)

發燒 (二方)	(139)
臍風 (一方)	(140)
麻疹 (二方)	(140)
驚風 (二方)	(141)
疳疾 (七方)	(141)
滯頭 (二方)	(144)
口瘡 (七方)	(144)
哮喘 (一方)	(146)
百日咳 (六方)	(147)
消化不良 (二方)	(149)
嘔吐、腹瀉 (二方)	(149)
臍突 (一方)	(150)
疝氣 (一方)	(150)

遺尿 (四方)	(150)
阴腫 (一方)	(152)
夜啼 (一方)	(152)
瘡腮 (八方)	(152)
天泡瘡 (一方)	(155)

五官科 (共九十一方)

眼病 (二十二方)	(156)
鼻病 (三方)	(163)
耳病 (十九方)	(164)
牙病 (二十方)	(170)
口腔病 (八方)	(176)
喉症 (十九方)	(179)

外科 (共二百三十方)

闌尾炎 (三方)	(186)
乳癰 (十六方)	(187)
腦疽 (一方)	(192)
脫疽 (一方)	(192)
阴疽 (四方)	(192)
瘡瘍 (十八方)	(194)
骨瘤 (三方)	(199)
气瘤 (一方)	(202)
瘰癧 (十二方)	(202)
禿瘡 (九方)	(206)
疔瘡 (十八方)	(210)
疥瘡 (三方)	(215)

黃水瘡 (十九方)	(216)
癩瘡 (四方)	(223)
痔瘡 (九方)	(224)
癰症 (十五方)	(226)
疣痣 (二方)	(232)
汗斑 (一方)	(232)
腎囊風 (二方)	(233)
蛇咬傷 (七方)	(233)
創傷 (五方)	(236)
湯火傷 (二十七方)	(237)
凍瘡 (六方)	(246)
跌打損傷 (二十五方)	(248)
梅毒 (十方)	(257)
雜治 (九方)	(262)

針灸科 (共二十一方)

三叉神經痛 (一方)	(265)
眼臉紅爛 (一方)	(265)
喉痹 (一方)	(265)
牙痛 (一方)	(266)
心臟痛 (一方)	(266)
咳嗽 (一方)	(266)
嘔吐 (一方)	(266)
胸腹痛 (四方)	(267)
腰痛 (一方)	(268)
便秘 (一方)	(268)
初生兒身體強直 (一方)	(268)

惊风（附脐风）（五方）	（ 268 ）
小儿腹瀉（一方）	（ 270 ）
疝气（一方）	（ 271 ）

按摩科（共二方）

腹痛、腹泄、昏睡、胃痛等症（一方）	（ 272 ）
腹急痛（一方）	（ 273 ）

內 科 (共三百〇九方)

乙型腦炎 (三方)

第 一 方

适应症：腦炎初起兼有表邪，燒熱嘔吐，項強反張，舌尖赤，中微薄白，昏沉嗜睡，呼之即醒。

处②方：銀花五錢 連翹五錢 芥穗三錢 薄荷三錢 虫退三錢 菊花四錢 黃芩三錢 石決明五錢（微煨，研細末） 生赭石五錢（研細末兌服） 藏青果三錢 鮮蘆根六錢 鮮竹葉一百片 竹瀝一小酒杯

制 法：水煎（不宜久煎），連煎二次，混合搖勻，分四次服。

用 法：病勢急者每二小時服一次，緩者三至四小時服一次。

加減法：舌黃有汗去薄荷、芥穗。

禁 忌：忌糖類、油膩、麥面、辛辣等物。

獻方人：郝紹仁。

第 二 方

适应症：腦炎中期，高燒不退，神昏抽搐，溺黃，舌苔黃，或中黃尖赤，大便秘等。

处②方：銀花五錢 連翹五錢 黃芩五錢 石膏八錢 淮知母四錢 寒水石三錢 虫退三錢 鈎藤五錢 生赭石五錢 玄精石三錢（成細末； 藏青果三錢 石決明四錢（微煨研末） 桑葉二十片 竹葉一百片 翠玉（即青玉）一錢

制 法：水煎。

用法：服如前法。

加減法：吐不止者加竹瀝一小酒杯，另用鮮葱茄四兩、梨汁八兩代茶飲，或用藕汁、西瓜汁、葡萄汁等亦可。

獻方人：郝紹仁。

第三方

适应症：腦炎神昏壅厥，面紅肢冷，小兒急驚，溫熱症神昏語等。

處方：犀角一錢（用玻璃刮下另蒸，兌服） 麥冬六個 銀花五錢
丹參五錢 生地五錢 玄精石三錢 生赭石五錢 黃芩三錢 丹皮
三錢 石羔八錢 石決明三錢（微煨研末） 角參四錢 杭菊四錢 淮
知母三錢 藏青果三錢 翠玉（磨汁兌服）一錢

制法：用水連煎二次，分四次服。

用法：服如前法。

加減法：舌尖赤加黃連，渴加花粉，項強加鈎藤、蟬退。

獻方人：郝紹仁。

編者按：翠玉能鎮壅、清肺、生津，諸果汁能增胃汁，腦炎屬溫熱病，伏熱內蓄，多耗津液，故用清熱、鎮壅、增液之品，以收解熱、熄風之效。以上三方療效顯著。

腦膜炎（二方）

第一方

适应症：腦膜炎，頭痛，發熱，四肢抽搐。

處方：胆草八錢 生地三錢 淡竹叶三錢 羚羊角一錢 犀
角一錢 杭菊二錢 石羔八錢 知母三錢

制法：羚羊角、犀角銼末，其餘煎水。

用法：一日分四次服，服时兑入羚羊、犀角末。

献方人：曾志舜

第二方

适应症：脑膜炎，高热，头部尤热，头顶剧痛作呕，神志不清。

处②方：生石决（捣碎）八钱 淮牛膝六钱 银花四钱 羚羊角一钱（锉细末另煮对服） 白芍八钱 连翘三钱 朱砂一钱半（研细末兑服） 磁石六钱（捣碎） 玉枢丹三分（磨药兑服）

制法：作煎剂。

用法：每两小时服一次，小孩分量酌减。

献方人：李子猷。

狂犬病（十六方）

第一方

适应症：狂犬病已发作者。

处①方：地榆一斤

制法：水煎。

用法：顿服。

献方人：陆闻鸿。

第二方

适应症：被狂犬咬伤，或狂犬病已发作，咬指抓心。

处①方：马钱子十二枚（不必限定此数，更多亦可）

制法：用童便将马钱子浸十日，取出，用酒洗净，刮去毛，入菜油中，加热煎黄，取出研末，密贮瓶中。

用法：輕者每服一枚馬錢子的粉末，重者每服一枚半的粉末，用白開水吞服，即能治愈。

獻方人：陸聞鴻。

第三方

適應症：瘋犬咬傷病。

處方：大黃_{五錢} 桃仁_{二錢} 一朵云（即白夏枯草）_{一兩}
黑竹根_{一兩} 搜山虎_{五錢} 粉糟汁水_{適量}

制法：加水煎作湯劑。

用法：每次服一盞，一天服三次。

獻方人：陸聞鴻。

第四方

適應症：狂犬病已發作者。

處方：胆水（點豆腐用的）_{一兩} 活雄雞_{一只}

制法：將胆水溶於一大碗開水中，將活雄雞用另外的水燙死，留水備用。

用法：先給患者灌溶化的胆水，待吐後，再灌雄雞水，讓其大吐即愈。

獻方人：劉旭輝。

第五方

適應症：狂犬咬傷，自覺心煩，惡人與火，和惡心惡風等症。

處方：木鱉子_{五錢}（去殘存油） 大黃_{三錢} 桃仁_{三錢}

制法：將以上三味研細為末。

用法：常用酒吞服，服後大便瀉，小便變赤即愈。

說明：木鱉有小毒，能毒犬，大黃通利，桃仁去瘀，凡被狂犬咬傷，其毒素由血液侵入人體。故用通利血分及殺犬毒等藥，其病自愈。

第六方

適應症：狂犬病。

處①方：紅豆子（即紅豆樹上結的） 黑竹茹各等分

制法：將上藥焙干，共研為細末。

用法：用火酒沖服，每次服小豆大一粒，日服一次，連服五日後，每隔一日服一次，又如此連服三日後，再每週服一次，連服三週。

說明：每次服後，有頭昏的反應，是無妨害的。

獻方人：吳允斌。

第七方

適應症：狂犬病。

處②方：生大黃三錢 土鱉七枚 桃仁十四枚 蜂蜜二兩 白酒一兩

制法：將大黃、土鱉、桃仁三味杵爛，加蜂蜜兌開水適量，煎後再加入白酒。

用法：一次冷服。

獻方人：黃昱武。

第八方

適應症：狂犬病。

處③方：滑石一兩 前仁四錢 馬前子六錢 甘草一錢

制法：研為細末。

用法：用冷开水或酒冲服，每次一至二錢，小儿減半。

献方人：張鵬文。

第九方

适应症：狂犬咬伤。

处①方：甘草一錢 杏仁八錢 黃柏一兩 細辛五分

制法：共研末。

用法：冷开水調敷伤口。

献方人：張鵬文。

第十方

适应症：狂犬病。

处③方：搜山虎 黑竹根 水倒罐（又名朝天罐）各等分

制法：共研为細末。

用法：每服五至七錢。

献方人：張鵬文。

第十一方

适应症：狂犬病。

处③方：野烟苗 鱉甲三錢

制法：野烟苗冲汁（干者研末），鱉甲煎湯。

用法：鮮野烟汁用鱉甲湯冲服；干者用鱉甲湯送下。

献方人：張鵬文。

第十二方

适应症：狂犬病