

高等學校教材

高等数学
(文科类)

下册

第二版

盛立人 罗定军 主编



化学工业出版社
教材出版中心

013

325/2.2

高 等 学 校 教 材

高等数学(文科类)

下 册
第二版

盛立人 罗定军 主编

沈苏林 吴永康 郭金吉 甘泉 编



化 工 出 版 社
教 材 出 版 中 心

· 北 京 ·

(京)新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

高等数学 (文科类). 下册/盛立人, 罗定军主编. 2 版. —北京: 化学工业出版社, 2005. 7

高等学校教材

ISBN 7-5025-7255-4

I. 高… II. ①盛… ②罗… III. 高等数学-高等学校-教材 IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 085392 号

高等学校教材

高等数学 (文科类)

下 册

第二版

盛立人 罗定军 主编

沈苏林 吴永康 郭金吉 甘 泉 编

责任编辑: 唐旭华

责任校对: 蒋 宇

封面设计: 潘 峰

*

化学工业出版社 出版发行

教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010) 64982530

(010) 64918013

购书传真: (010) 64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京市彩桥印刷厂印刷

三河市宇新装订厂装订

开本 880×1230mm 1/32 印张 10% 字数 327 千字

2005 年 9 月第 2 版 2005 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-7255-4

定 价: 18.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

内 容 提 要

本书为大学文科高等数学教材，分上下两册，上册包括微积分与微分方程，下册包括线性代数、概率统计与实用规划。本书内容精练、篇幅紧凑，尽可能地适应文科学生的特点，用通俗易懂的语言表述基本的数学概念与方法，通过较多的例题阐明用数学方法处理一些应用问题的思路，启发学生学习高等数学的兴趣，使本书更具吸引力和可读性。

本书可作为高等学校文科类专业的教材，对广大社会工作者来说也是一本较好的学习参考书。

目 录

第二篇 线性代数

第八章 行列式与矩阵	1
第一节 行列式的定义与性质	1
1. 二、三阶行列式的定义	1
2. n 阶行列式的定义	4
3. 行列式的性质	7
4. 行列式的展开	11
5. 克莱姆法则	14
第二节 矩阵的概念与运算	17
1. 矩阵的概念	17
2. 矩阵的线性运算	18
3. 矩阵的乘法	20
4. 矩阵的转置	23
5. 一些特殊的矩阵	24
6. 矩阵的分块	27
练习 8	31
第九章 矩阵的秩与逆矩阵	37
第一节 矩阵的初等变换	37
1. 三种初等行变换	37
2. 行阶梯形矩阵	41
第二节 矩阵的秩	44
1. 矩阵秩的定义	45
2. 矩阵秩的性质	46
第三节 逆矩阵	48
1. 逆矩阵的定义	49
2. 逆矩阵存在性	50
3. 用初等行变换求逆矩阵	53

练习 9	58
第十章 线性方程组	61
第一节 线性方程组的解法	61
1. 消元法	61
2. 有解判别定理	67
3. 齐次线性方程组的解	72
第二节 线性方程组解的结构	74
1. 向量组的线性相关性	74
2. 基础解系	82
3. 解的结构定理	86
练习 10	89
第十一章 矩阵的特征值和二次型	93
第一节 矩阵的特征值与特征向量	93
1. 特征值与特征向量	93
2. 特征值与特征向量的求法	94
第二节 相似矩阵	100
1. 相似矩阵	100
2. 矩阵相似的条件	103
第三节 实二次型及其正定性	106
1. 二次型与它的矩阵	106
2. 二次型的标准形	108
3. 正定二次型	114
练习 11	120

第三篇 概率论与数理统计初步

第十二章 随机事件及其概率	124
第一节 随机事件与概率	124
1. 随机事件	124
2. 事件的运算	125
3. 频率的稳定性	127
第二节 古典概型	130
第三节 乘法公式	133
1. 条件概率	133
2. 乘法公式	134
3. 全概率公式与贝叶斯公式	135

第四节 独立性	136
第五节 独立试验概型	139
练习 12	140
第十三章 随机变量及其分布	142
第一节 随机变量的概念	142
第二节 离散型随机变量及其分布	143
1. 离散型随机变量的概率分布	143
2. 几种常见的离散型分布	144
第三节 连续型随机变量及其分布	147
1. 连续型随机变量的概率密度函数	147
2. 几种常见连续型分布	148
第四节 分布函数	151
1. 分布函数的定义	151
2. 分布函数的性质	151
3. 正态分布的计算与 3σ 准则	153
第五节 随机变量函数的分布	155
1. 离散型随机变量函数的分布	155
2. 连续型随机变量函数的分布	156
第六节 二维随机变量的分布	158
1. 联合分布	158
2. 离散型随机变量	158
3. 连续型随机变量	159
4. 边缘分布	161
第七节 随机变量的独立性	164
1. 独立性定义	164
2. 随机变量函数的分布	165
练习 13	168
第十四章 数学期望与极限定理	172
第一节 数学期望	172
1. 引言	172
2. 数学期望	172
3. 随机变量函数的数学期望	175
4. 数学期望的性质	177
5. 矩	178
第二节 方差	179

1. 方差的定义与计算	179
2. 方差的性质	181
第三节 大数定律	182
第四节 中心极限定理	183
练习 14	186
第十五章 数理统计初步	189
第一节 样本和统计量	189
1. 总体和样本	189
2. 样本分布函数	190
3. 样本矩	190
4. 统计量	191
第二节 抽样分布	191
1. 样本均值的分布	191
2. χ^2 分布	192
3. t 分布	193
4. F 分布	194
第三节 参数估计	195
1. 点估计	195
2. 估计量的评估标准	199
3. 区间估计	201
第四节 假设检验	203
1. 假设检验的基本概念	203
2. 关于正态总体参数的假设检验	207
3. 两个正态总体参数的假设检验	211
练习 15	213
附录 1 标准正态分布函数表	217
附录 2 泊松分布表	218
附录 3 t 分布表	219
附录 4 χ^2 分布表	221
附录 5 F 分布表	224

第四篇 实用规划

第十六章 公平性与数学化	231
第一节 选举理论	231
1. 选择表决方法	231

2. 人都是赢家	234
3. 一个不可能性定理	236
4. 实例	237
第二节 权力指数	239
1. 加权选举系统	239
2. 彭翠美权力指数	241
3. 权力指数与美国选举实例	244
第三节 公平分配	247
1. 三种均分态	247
2. 整分问题	250
3. 实例	255
第十七章 谋求最优化	259
第一节 配料与规划	259
1. 例子	259
2. 寻求最优解——图解法	261
3. 一般性理论	266
练习 17. 1	269
第二节 时刻表问题	270
1. 临界路径	270
2. 排序算法与最优时间表	272
3. 无序类时刻表与格雷亨分析法	279
4. 降时列表法	280
5. 储藏室问题	282
练习 17. 2	285
第三节 推销员问题 (TSP)	288
1. 哈密顿回路	288
2. 寻找哈密顿回路	290
3. 寻觅最优路	291
练习 17. 3	299
第十八章 竞争与对策	301
第一节 零和对策	302
1. 纯对策	302
2. 混合对策	304
3. 求解最佳对策	309
第二节 非零和对策	312

1. 例子	312
2. 奈什平衡点	316
练习 18	319
练习答案	322

第二篇 线性代数

解代数方程是古典代数的主要内容，代数的原始思想是用符号来表示未知数，但是，用文字来记一般表达式符号的方法直到 16 世纪才开始确立。在 19 世纪，从一元一次方程出发的沿着多元一次方程组发展起来的线性代数已经获得了辉煌的成就。当然，当今数学的研究对象已远不止是这些内容。然而，作为高等数学的一个重要分支，线性代数至今仍有着广泛的应用。线性代数的主要内容包括：行列式，矩阵，线性方程组，线性空间，线性变换，矩阵的特征值，二次型等，本篇主要介绍其中的部分内容。

第八章 行列式与矩阵

第一节 行列式的定义与性质

行列式的概念源于解线性方程组，它是研究线性代数的一个重要工具，同时它在数学的其他分支以及许多科学领域中也有广泛的应用。在这一节，我们将学习行列式的定义、性质和计算方法，并介绍应用行列式解特殊线性方程组的克莱姆（Cramer）法则。

1. 二、三阶行列式的定义

在中学，我们曾经学过用加减消元法解二元一次方程组，即含有两个未知数的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

这里 $a_{11}, a_{21}; a_{12}, a_{22}$ 分别为两个方程中未知数 x_1, x_2 的系数, b_1, b_2 为常数项. 消元法的过程是这样的: 将第一个方程乘以数 a_{22} 与第二个方程乘以数 $-a_{12}$ 后相加, 得到关于未知数 x_1 的一元一次方程

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2.$$

类似地, 将第一个方程乘以数 $-a_{21}$ 与第二个方程乘以数 a_{11} 后相加, 又可得到关于未知数 x_2 的一元一次方程

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

当上两式中 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 可得上述线性方程组的惟一解

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \\ x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{cases}$$

为了便于记忆, 我们将上述解公式中的代数和 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 用记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

来表示, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

类似地, 也可将解中的另外两个代数和用这种记号表示出来, 即

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

于是, 当 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 线性方程组的惟一解就可以表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}.$$

我们用这个公式来解一个具体的线性方程组.

[例 1] 解二元一次方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 = -1. \end{cases}$$

解 因为 $D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - (-1) \times 3 = -1 \neq 0,$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \times (-2) - (-1) \times (-1) = -3,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 3 = -5,$$

所以线性方程组的解为 $x_1 = \frac{D_1}{D} = 3$, $x_2 = \frac{D_2}{D} = 5$.

这里我们给出的记号 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 称为一个二阶行列式, 它是由两

行两列 4 个数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 排成的一个方块, 两边再各加上一条竖线所形成, 它表示一个数 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. 它的横排称为行, 坚排称为列, 方块中的每个数均称为行列式的元素, 于是得到

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

类似地, 将 9 个数 $a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}$ 排成的

一个三行三列的方块, 两边各加上一条竖线的记号 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 称

为一个三阶行列式, 用它表示以下 6 项乘积的代数和 $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$, 即有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

[例 2] 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 根据行列式的定义, 我们有

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times 2 + 2 \times 1 \times 3 + 3 \times 2 \times 1$$

$$-3 \times 3 \times 3 - 2 \times 2 \times 2 - 1 \times 1 \times 1 \\ = -18.$$

为了方便地给出更高阶行列式的定义，我们将三阶行列式用相应的二阶行列式的表达式表示出来，即为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\ = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

这里的二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ 分别是原三阶行列式中划去元素 a_{11}, a_{12}, a_{13} 所在的行和列，剩下的 4 个元素按原来的排法组成的二阶行列式，我们分别称它们为元素 a_{11}, a_{12}, a_{13} 的余子式，记为 M_{11}, M_{12}, M_{13} . 于是，我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}.$$

这里，我们给出了用三阶行列式第一行元素与其相应余子式乘积的代数和表示三阶行列式的表达式. 同样可以用此表达式来计算行列式，仍举上面的例 2，我们得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ = 1 \times 5 - 2 \times 1 + 3 \times (-7) = -18.$$

2. n 阶行列式的定义

在上小段，我们给出了二阶、三阶行列式的定义. 如果我们将一阶行列式 $|a|$ 就定义为 a ，那么二阶、三阶行列式都可以看成是由低一级行列式定义出来的. 依此类推，我们可以给出 n 阶行列式的定义.

定义 8.1 将 n^2 个数排成的 n 行 n 列的一个方块，两边各加上一条竖线的记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots\cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (8.1)$$

称为一个 n 阶行列式，它可用低一级的 $n-1$ 阶行列式表示为

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots\cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ = a_{11} & \left| \begin{array}{cccc} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots\cdots\cdots & & & \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right| - a_{12} \left| \begin{array}{cccc} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots\cdots\cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right| + \cdots \\ + (-1)^{1+n} a_{1n} & \left| \begin{array}{cccc} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3,n-1} \\ \cdots\cdots\cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} \end{array} \right| \end{aligned}$$

它的横排称为行，竖排称为列，方块中的每个数均称为行列式的元素。

为了能够简便地表示出 n 阶行列式 (8.1)，下面我们给出 (8.1) 中元素 a_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, n$) 的余子式和代数余子式的概念。

定义 8.2 在 n 阶行列式 (8.1) 中划去元素 a_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, n$) 所在的行和列，剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的排法组成的 $n-1$ 阶行列式，称为 n 阶行列式 (8.1) 中元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} ，即

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots\cdots\cdots & & & & & \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots\cdots\cdots & & & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

令

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n),$$

称 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式.

根据定义 8.1 和定义 8.2, 我们可将 n 阶行列式 (8.1) 表示为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}M_{1n}$$
$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n}$$
$$= \sum_{j=1}^n a_{1j}A_{1j}.$$

这里, 我们用 n 阶行列式的第一行元素与其相应的代数余子式乘积的和来表示 n 阶行列式, 这称为 n 阶行列式按第一行的展开式. 类似地, 我们也可将 n 阶行列式按其他行或列进行展开 (详见本节第 4 段行列式的展开).

一般情况下, 如果行列式的阶数 n 较大或形式较复杂, 直接用定义计算行列式往往是十分繁琐的. 但是, 当所求行列式含有较多的零元素时, 还是可以用行列式的定义来计算行列式的.

[例 3] 计算 4 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

解 根据 4 阶行列式按第一行的展开式, 我们有

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 6 \begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$
$$= 5 \left(5 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 6 \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} \right) - 6 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 19 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} - 30 \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} \\ = 19 \times 19 - 30 \times 5 = 211.$$

3. 行列式的性质

为了能够方便地进行行列式的计算和化简，下面我们不加证明地给出行列式的一些重要性质。

性质 1 行列式的行与列顺次互换，行列式不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

上式中的两个行列式互称为转置行列式，其中一个行列式的 n 个行恰好顺次为另一个行列式的 n 个列。因此，性质 1 也可改写为：行列式与其转置行列式相等。

性质 1 说明行列式中行与列的地位是平等的，对行列式行成立的性质，对列也同样成立，反过来也是对的。正因为如此，下面对行列式的讨论大多对行来进行。

[例 4] 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

这个行列式称为上三角行列式，其特点是在元素 a_{11} 到 a_{nn} 所成的对角线（称为行列式的主对角线）以下的元素全为零。

解 根据性质 1 以及 n 阶行列式按第一行的展开式，我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$