



怎样防治牛流行性感冒

怎样防治牛流行性感冒

省農事廳 畜牧獸醫處編
電影教育社

※

河南人民出版社出版（鄭州市行政區煙五路）
河南省書刊出版業營業許可証出字第一號
地方國營洛陽印刷廠印刷 新華書店河南分店發行

※

統一書號：T16105·1（豫總書號414）


787×1092 1/48 · 印張 9/24

1956年7月第1版 1956年7月第1次印刷

印 數 1,618 冊

定 價 7 分


6
52




(1) 牛流行性感冒, 俗名叫做“撮脚瘟”, 豫北叫做“小瘟病”。这种病多在夏秋二季發生和流行。發病的主要原因是: 由于長期陰雨, 地面潮濕, 气候忽冷忽熱, 飼草霉爛, 廐舍損坏, 以及使役过重, 夜間露宿受風感冒等原因所造成的。




(2)有人問：牛病很多，怎么知道牛得的是这种病呢？我們說，这种病有几个特征：第一，牛如果突然得了这种病，牛身上發熱。本來牛的正常体溫是三十八度左右，但得这种病后，用溫度表試一下，牠的体溫会升高到四十一度。



(3) 第二，牛得了这种病，精神不振作，嚴重些的便不吃草、不倒沫、渾身沒勁，或是一条腿跛着，行動緩慢，而且光想臥地，起立困难。




(4) 第三，病牛鼻鏡干燥，眼圈潮紅，有的还流淚，流鼻涕，或者是眼瞼腫脹。




(5) 第四，再仔細檢查一下，就會知道病牛的呼吸快，發噎發吭，打顫又發抖，牛的尿色帶黃，大便干燥，有的肚子還膨脹起來。



(6) 牛得了这种病，我們如果能对症下药，就会很快把牛治好，要是治療不及時，或者得了併發病，那么牛也会死掉的。牛得了这种病，首先要照顧好，讓牠多休息，勤飲水，喂青草或者流汁飼料(面糊等)，而且要使牠適當運動，并用乾草把磨擦牛的全身，特別是腿部。在夜里，牛要拴在屋內，病好了不要一下子就做重活，也不要吃的过飽，不然这种病是容易重犯的。



(7)再說牛得了这种病就得馬上治療，如果想用西藥，可以到獸医站去治。在这里，我們向大家介紹两个容易办的中藥單方：第一，用大蒜五头搗碎，再加上半斤醋，拌勻后就可以灌服。



(8) 第二个方是：用些葱白、姜和蘆葦根，用水
煮后灌服。



(9) 我們知道，牛病了才去医治，不如事先預防好，不使牛得病。那么，怎样預防牛的流行性感冒呢？首先好牛要和病牛隔離開，这对預防牛流行性感冒是很重要的。



(10) 牛屋牛槽要用青灰或熱碱水洗刷。




(11) 牲口鋪要勤墊干土，經常保持干燥又清潔。
潮濕的地方，不能讓牛常臥着。




(12) 餵的草要清潔，最好用水淘淨。餵的料一定要碾碎，並且每頭牛每天加餵食鹽五錢。



(13) 飲牲畜的水要潔淨，坑水污水不能飲。并且要勤飲，但每次叫牲口少喝些。



(14) 牲畜身体要常洗刷，常说：“一日三刨（梳拭），强似喂料”。



(15) 不做活的時候，別光讓牲口閒呆着，要牽出來運動運動。