

彩民工具系列丛书

# 排列三中奖指南 (一)

## 数字解码

唐龙 编著

中国商业出版社

## 第一章

# 排列三游戏的数字定义

## 第一节 数字分类

### 一、数字组合

数字，指0~9十个不同的数字。根据参数的不同，又可分为不同的组合。比如以奇偶数字为参数，则数字1、3、5、7、9为奇数，0、2、4、6、8就是偶数；以均分的大小数字为参数，则0、1、2、3、4为五个小数，5、6、7、8、9就属于大数。

#### 1. 组合分类

通过数学定义对奇偶、大小、质合、余数的设置，我们可以把0~9十个数字分为奇数与偶数；大数与小数；质数与合数；除3余0、余1、余2数等等。

数学定义0~9十个数字的奇数为1、3、5、7、9，偶数为0、2、4、6、8；小数为0、1、2、3、4，大数为5、6、7、8、9；质数字为2、3、5、7，合数为0、1、4、6、8、9；除3余0数为0、3、6、9，即能被数字3整除的自然数。除3余1、余2数分别为1、4、7和2、5、8。

3D的中奖号码共有1000注单选，有220注不同的号码，其中有10注豹子，即3个数字都相同的号码；有90注组三，即有两个相同的数字的号码；还有120注三个数字都不相同组六号码。对于数字而言，含有任一数字的号码组合均为55注。比如含有数字0的55注号码包含1注三个号码都相同的“豹子”，18注有两个相同数字的“组三”，和36注三个号码都不相同的“组六”。而含有数字1的号码，也是55注，并且组合的类型也是1注“豹子”、18注“组三”和36注“组六”，此时我们就称数字0或1为“胆”。下面以含有数字0的号码为例：

豹子 1 注: 000

组三 18 注: 001、002、003、004、005、006、  
007、008、009、011、022、033、  
044、055、066、077、088、099;

组六 36 注: 012、013、014、015、016、017、  
018、019、023、024、025、026、  
027、028、029、034、035、036、  
037、038、039、045、046、047、  
048、049、056、057、058、059、  
067、068、069、078、079、089。

其他胆托的号码可查询第 77 页附录的《排列三游戏数字胆托号码速查表》。

通过奇偶数的设置, 可以将中奖号码分为全奇、全偶、两奇一偶、两偶一奇四种不同的奇偶组合, 依次的不同号码注数分别为 35、35、75、75 注。

通过大小数的设置, 可以将中奖号码分为全小、全大、两小一大、两大一小四种不同的大小组合, 依次的不同号码注数分别为 35、35、75、75 注。

通过质合数的设置, 可以将中奖号码分为全质、全合、两质一合、两合一质四种不同的质合组合, 依次的不同号码注数分别为 20、56、60、84 注。


通过余数的设置, 可以将中奖号码分为 A 型、B 型、C 型 DG 种不同的聪明组合, 依次的不同号码注数分别为 40、144、36 注。其中 A 型指三个号码除 3 余数都相同。比如 036 全由除 3 余 0 数组成, 228 全由除 3 余 2 数组成。B 型指两个号码除 3

余数相同。比如 038 的 0、3 是除 3 余 0 数，238 的 2、8 是除 3 余 2 数。C 型指三个号码余数都不相同。比如 048 由除 3 余 0 数的 0、余 1 数的 4、余 2 数的 8 共同组成。

以上对应的详细分类及具体号码分类表，可参阅第一册《技巧集汇》的相关内容，在此就不一一赘述了。

## 2. 数字走势

将中奖数据按开奖期号顺势排列，并用直线依次相连的叫做走势图，起着分析下期数据发展态势的作用。如下图所示，将中奖号码的百位数字用直线依次相连，就形成了中奖号码的百位号码走势图。



通过图表可以判断分析下期可能出现的数字。比如在图中可以看到当数字走出 2、4、6 的递增之势时，下期可排除继续递增为 8 的现象。

### 3. 数字趋势

走势图起着分析下期数据发展态势的作用，但要分析各数字的中出趋势，就要参考数字的状态表。状态表是按不同的参数设置，将其中的组成之一标示出来，而其他组成部分用排序数字表示间隔期数的图表，用于对未来数期的中出可能性判断。

如下图所示的含有数字 0 组合截止 2006006 期的中出状态表，当开出数字 6 组合的号码时，将号码标示出现，而当开出其他跨度的号码时，就用排序的数字标示，代表数字 6 的间隔。

4	9	1	3	3	860	790	7
5	310	807	4	608	670	1	8
077	1	1	5	1	1	2	9
1	2	107	6	2	2	3	10
2	037	1	380	3	069	4	11
3	1	2	1	4	1	5	095
4	085	3	2	5	084	6	014
5	1	909	3	6	805	7	012
600	302	1	4	7	1	440	1
1	1	2	304	390	2	1	2
2	2	3	803	1	3	302	3
3	026	4	1	2	4	1	4
4	1	470	2	3	508	2	5
5	2	1	040	015	1	3	012
6	3	075	820	450	2	4	940
7	4	1	1	1	3	5	1
8	240	2	2	2	4	6	2

## 二、数字形态

中奖号码由三个数字组成，无论当期是使用的哪套机球，无论上期开出的是什么号码，无论当期的销售如何，开出中奖号码的数字至少会有一个。也许您认为这说了和没说一样，其实不然，您应该了解的不是“至少有一个”的结果，而是“十个选一个”的过程。

在不断的开奖过程当中，十个数字也在不断地进行着变换。如果能够选中当期奖号的一个数字，那么中奖则是必然的。但如何能够从十个当中选出这一个呢？

排列游戏有许多的选号方法及对应的选号参数，比如数字、和数尾、奇偶、大小组合等等。如果选中十个数字其中的一个，全包含有该数字的所有 55 注号码，中奖也是必然的。十个和数尾各有 22 注号码，全包其中的某个和数尾，而当期开出的正是该和数尾，其结果当然也是中奖了。如果您选的参数随着开奖的不断变化而变化，那么十选一的参数，其中奖概率当然也是十分之一了，当然，也可以多选几个数字，这样的选法一般使用的就是号码走势图。如果要跟踪某个数字，则需要通过数字的中出状态表来分析判断。

无论是通过什么来分析与判断当期、或未来几期的数字中出可能性，都需关注中奖号码的“非对称”、“非等量”现象，并充分应用“求均衡”原理，来发现、并把握机会。

### 1. 非对称

指中奖号码在数字、组合、类型等方面，表现为非对称发展的现象。比如第 4 页的百位号码走势图，2005338~2005340 期开出中奖号码 236、440、678，形成百位号码 2、4、6 的等距递增的对称走势。如果下期第 341 期开出百位数字 8，则等差 2 的数字局部递增就形成了极对称现象。而“非对称”是中



奖号码数据走势的普遍现象，那么第 341 期完全可以排除开出百位数字 8 的现象，实际开出 302 中奖号码。再比如第 2005346~350 期开出 292、172、323、492、，百位号码开出 2、1、3、4、2，形成的差值走势，即相邻号码相减的绝对值形成 1、2、1、2 的走势。如果第 351 期再次走出差值 1 的走势，就形成了极对称现象。那么根据“非对称”原理，第 351 期的百位号码就可以排除，与上期数字 2 的差值为 1 的 1、3 两个数字。

## 2. 非等量

指中奖号码在数字、组合、类型等方面，表现为周期不等数量发展的现象，主要表现为“强者恒强”和“弱者恒弱”。比如还是第 4 页的百位号码走势图，第 2005353~355 期开出奖号 095、014、012，形成百位数字 0 的连 3 现象。而数字 1、5、6、7、8、9 只出现了 1 次，表现为中奖号码百位中出的“非等量”现象。再看第 5 页的数字 0 组合的中出状态表，数字 0 的组合在第 2005353 期，间隔 11 期开出 095。11 期的间隔中出表现为“弱者恒弱”，而接下来的 014、012 连出 3 期，又表现为“强者恒强”。

## 3. 求均衡

在发生周期“非等量”现象之后，会出现短间隔的反复中出，完成一个“调偏”、“回补”过程。

如上面所说的含有数字 0 的组合，间隔 11 期的“弱者恒弱”式中出之后，紧接着的回补，及接下来的多期中出，正是“弱后之补”的“求均衡”现象。再比如右图所示的数字 6 的连 4 现象，之后间隔 1~2 期的再次中出，则表现为“强后之缓”的“求均衡”现象。

1	5	3
608	886	962
756	618	169
966	621	236
635	363	856
1	1	1
576	256	2
863	1	216



## 第二节 数字解析

### 一、求衡调偏

在“非对称”、“非等量”现象之后，往往出现“求均衡”的“调偏”、“回补”现象，发现机会并抓住这个机会，就是数字解析的根本目的。

无论购彩的起始动因是什么，中奖的根本目的是不变的。而且在购彩的过程当中，就已体现了彩票的公益性质。所以技巧是为中奖而产生的，技巧可以是中奖的基础，可以是提高概率的手段，但技巧只能是成功中奖的30%，那70%的成功因素还包括心态、策略和战术。切记，成功中奖的第一原则是理智购彩，在加强风险意识的同时提高自控能力，并做好投资的战术和管理。

#### 1. 强后之缓

任何含有一个数字或由几个数字构成的组合，在开奖的过程中都会表现为连出、等间隔中出、长周期中出及非等间隔中出现象。如上述数字6的组合，当局部连续或短频反复中出时，称为“强者恒强”，而之后短期回补现象，就是“强后之缓”。

#### 2. 弱后之补

当长周期中出时，表现为该组合的“弱者恒弱”，即表现为“长期软弱”。而“求均衡”原理的作用，使得“弱者恒弱”中出之后，往往会在短期内出现再次中出现象，我们就称其为“弱后之补”。比如上面讲到的数字0的组合，在长周期11期间隔的“弱者恒弱”式中出之后，紧接着开出现象，就是“弱后之补”的典型案例。而我们对上述现象的分析与判断，并对其再次中出机会的发现与把握，就是中奖的实现。

## 二、相似理论

中奖号码的类型、组合等相似性特征开出后，往往在接下来的一定周期内会有相似的结果。根据参数设置的分析指标，会有不同的表现。随着开奖数据的增加，会表现出一些共同的特性。而根据这些特性进行选号的技巧，这称为指标技巧。

相似原理可就两个方面理解，一是当具有相似特点的中奖现象发生之后，一定周期内普遍出现的同指标相似现象。由于号码中出的非等量、非对称现象，造成冷与热的交替，而求均衡在调整着非等量与非对称的幅度，表现为“弱者恒弱”与“强者恒强”，之后亦常出现“弱后之补”与“强后之缓”，此为同指标相似性中出。比如数字6组合连开4期之后，短期内均会再次中出，就是同指标“含有数字6组合”的“强后之缓”。

二是普遍存在的不同指标相似现象。比如下面将介绍的，百位号码走势形成差值1~2~1走势后，下期号码的差值为0、1、2三个变化值。再比如在第三章趋势分析当中的数字2组合的特点，当其连开3期之后，五期内均会开出含有数字3的号码，十期均开出和数尾9的组合，就是不同指标的相似现象。

### 1. 走势分析

利用相似理论，通过走势图排除与选取号码的方法，称为走势分析法。排除的方法有连出排除、对称排除；选取方法有振幅相似选取。

如第4页的百位号码走势图所示，连出排除指百位号码连出之后常规排除，比如百位数字3、2连出之后的下期可排除，及数字0连3之后的排除。对称排除指局部形成对称之后，排除再次的对称。比如开出2、4、6之后，接下来排除8的等距对称的排除等等。

选取方法是通过数字振幅的相似性来选取，比如第2005357~2006002期的中奖号码415、397、184、299的百位号码依次为4、3、1、2，振幅也形成1~2~1的走势，即相邻数字的绝对值走出1~2~1的走势，通过对历次跨度振幅1~2~1走势的下期振幅值的分析，选取最常出现值来选取第2006003期的百位号码。如下图百位数字的号码与振幅的走势图。

开奖期号	奖号	百位号码走势图										百位号码振幅走势图									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005338	236			2																	2
2005339	440					4															2
2005340	678							6													2
2005341	302			3																	3
2005342	385			3																	0
2005343	876									8											5
2005344	949																				1
2005345	786									7											2
2005346	292					2															5
2005347	172			1																	1
2005348	323					3															2
2005349	492							4													1
2005350	237			2																	2
2005351	239			2																	0
2005352	562																				3
2005353	095	0																			5
2005354	014	0																			0
2005355	012	0																			0
2005356	439									4											4
2005357	415									4											0
2005358	397																				1
2006001	184			1																	2
2006002	299					2															1
2006003	012	0																			2
2006004	940																				9
2006005	185			1																	8
2006006	598																				4

检索历次百位号码振幅1~2~1的数据，共发生过5次，下期的振幅值均表现为0、1、2三个值。比如第一次是在2005130~133期，开出百位数字5、6、8、7的546、663、836、

759, 形成百位号码振幅 1~2~1 的走势, 第 2005134 期开出百位号码 7 的 704, 接的是 7-7=0 的振幅; 第四次是 2005346~349 期, 开出百位数字 2、1、3、4 的 292、172、323、492, 振幅也是 1~2~1, 第 350 期开出百位数字 2 的 237, 振幅为 2。另外两次发生在第 2005236~239、2005313~316 期, 接下来的百位号码振幅分别为 2 和 1。而本次的第 2005357~2006002 期中奖号码 415、397、184、299 的百位号码依次为 4、3、1、2, 振幅也形成 1~2~1 的走势。那么根据相似理论, 就可以选取出现最频繁的 0、1、2 振幅。002 期的百位号码是 2, 与数值 2 能够形成绝对差值 0、1、2 的数字为 0、1、2、3、4, 那么第 003 期的百位数字就可以只选取小号的组合, 将 1000 注号码筛选至 500 注。实际第 003 期开出中奖号码 012, 百位号码为 0, 选取正确。

在第二章数字的走势分析当中, 将详细介绍相关内容, 及可辅助查询的数据。

## 2. 趋势分析

利用相似理论, 通过状态表排除与选取数字或数字组合的方法, 称为趋势分析法。

比如下图的数字 6, 根据相似原理, 当数字 6 再次连开 4 期之后可完全排除, 并在间隔 1 期之后重点关注。

1	5	3
608	886	962
756	618	169
966	621	236
635	363	856
1	1	1
576	256	2
863	1	216

再如下图所示,是数字 023578 组成的中奖号码连开 2 期之后的现象。由该六个数字组成的中奖号码共有 56 注,其中有 6 注“豹子”, 30 注“组三”及 20 注“组六”。截止 2006007 期,已发生 10 次连 2 断现象,没有连 3 现象。那么当由 023578 六个号码组成的中奖号码连开 2 期之后,下期可排除该六个数字的全组合号码 56 注,即下期必然含有数字 1469。

1	3	9	13	2	3	1	1	1	2
853	378	005	302	802	855	755	702	508	003
787	505	788	385	870	327	277	277	735	335
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
803	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	325	4	4	4	4	4	4	4	4
2	1	330	5	5	5	5	5	5	5
3	802	1	323	6	6	6	6	6	6
820		2	1	725	7	7	7	7	7
		875	237	1	075	8	8	8	8
				2	1	830	9	9	9
				077	2	1	10	10	10
					3	708	11	11	11
					4		12	12	12
					5		085	13	13
					6		1	302	075
					380		2	385	1
							3		2
							320		3
									378

在图中可以看到,该六个数字的全组合会在间隔 2~13 期再次中出,之后的再次中出间隔为 0~6 期,并且各只有 1 次是间隔 0 期和 6 期,其余均在间隔 1~3 期内开出,是一个好的跟踪机会。而其中的组六号码为 20 注,从图中同时可以看到,连 2 之后的这 20 注组六号码均在 2~13 期内开出,那么可以选择在间隔 8 期还没有开出组六号码时,进行跟踪。

## 第二章

# 排列三游戏的数字走势

## 第一节 对称排除

### 一、排除指标

根据号码走势图的相关数据，排除下期出现可能性极小的数字，包括邻近排除、连续排除两个指标。

#### 1. 邻近指标

邻近排除是指排除最近一次开出相同数字之后的号码。如下图所示，第 2005351 期开出百位数字 2 的 239，检索最邻近百位 2 发生在 2005350 期的 237，之后开出百位数字 2 的 239。

开奖期号	奖号	百位号码走势图									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005338	236			2							
2005339	440					4					
2005340	678							6			
2005341	302			3							
2005342	385			3							
2005343	876								8		
2005344	949									9	
2005345	786							7			
2005346	292			2							
2005347	172		1								
2005348	323				3						
2005349	492					4					
2005350	237			2							
2005351	239			2							
2005352	562							5			
2005353	095	0									
2005354	014	0									
2005355	012	0									
2005356	439					4					



根据邻近跨度排除方法，第 2005352 期可排除百位数字 2，实际开出百位数字 5 的 562，排除正确。再比如第 348 期开出百位数字 3 的 323，最邻近的百位数字 3 是第 342 期的 385，之后第 343 期是百位数字 8 的 876。那么第 349 期可以排除百位数字 8，实际开出百位数字 4 的 492，排除正确。当然，也会出现与上次相同的少数现象，而当此现象发生时下次则排除。

## 2. 连续指标

连续指标排除，指当百、十、个位连续 2 期与邻近上次连续 2 期相同时，可排除上次的第 3 期的号码。

比如 2005346~347 期开出百位号码 2、1 的 292、172，形成连续 2 期 2~1 的号码走势。检索最邻近的跨度 2~1 走势是 2005169~170 期的 263、195，之后的第 3 期 171 期开出百位数字 1 的 165，那么本次可排除百位数字再接数字 1 的组合。实际第 348 期开出百位数字 3 的 348，排除数字 1 正确。

## 二、对称查询

对称排除的数值有时很近，但有时会间隔很多期，查找起来比较繁琐。如果我们能将百、十、个位的各数字，以及连续 2 期之后的数字分类统计，并一一列出来，那么查询时就比较方便了。

### 1. 邻近查询

邻近查询的统计工作比较方便，只需将定位的某个数字之后的号码依次列出来就可以了。比如截止 2006007 期，百位数字 0 共开出 41 次，我们将后十期，即第 32~41 次百位开出数字 0 之后的号码依次列出来就可以了。而当百位再次开出数字 0 时，就可以排除最近一次百位 0 之后所接的号码。详细的数据见附录第 78 页的《排列三邻近号码依次下期走势统计表》。

## 2. 连续查询

将连续2期之后的第3期号码按顺序依次列出，即可在出现相同值之后，排除最邻近的定位号码。从00~99共有100种不同的连续2期数值，详细的见附录第81~95页的《排列三数字2期走势统计表》，数据已维护到2006027期。

当然也会出现连续3期相同的现象，但发生的机会是较小的。如果出现连续3期相同，那么下期可排除连续4期相同了。连续3期的不同排列有1000种，查询起来当然也更加繁琐，在这里就不一一列出来了。

## 第二节 相似查询

### 一、选取指标

在前面已经介绍了定位数字相似性查询的方法，可参阅第10页的相关内容。是通过连续3期百位数字振幅的值，查询到相应第4期的常见值，并通过该数值进行百位号码的相应换算与选取。

#### 1. 数字振幅

振幅的计算方法就是取定位相邻数字差的绝对值，比如2006002~007期的号码为299、012、940、185、598、561，百位依次为2、0、9、1、5、5，则百位数字振幅就是相邻号码相减的绝对值，依次为2、9、8、4、0。而十位号码依次为9、1、4、8、9、6，振幅依次为8、3、4、1、5。个位号码为9、2、0、5、8、1，振幅对应依次表现为7、2、5、3、7。