



猪病中药治法

甘肃省畜牧厅編

甘肃人民出版社

猪 病 中 藥 治 法

甘肃省畜牧厅編

*

甘肃人民出版社出版

(兰州市白銀路)

甘肃省书刊出版业营业許可証出字第001号

甘肃日报社印刷厂印刷

甘肃省新华书店发行

*

开本: 787×1092毫米1/32 • 書印張 • 12,000字

1960年5月第一版 1960年5月第一次印刷

印数: 1—30,092

*

統一書号: T16096 • 145

定 价: (2) 0.09 元

前 言

防治猪病是大量發展猪只的一項极其重要的工作。为了保証养猪事業的高速度發展，我們搜集了治療十一種猪病的六十一个中藥方，編成这本小冊子，作为各地治療猪病的参考。这些中藥方是省內各地中獸医献出來的，是广大群众長期和猪病作斗争的經驗积累，值得重視推广。群众中的單方、驗方、土方、土法是大量的，就地取材，化錢少、收效好，希望大家大力挖掘搜集，試用推广，使它更好地为养猪生產服务。

这些中藥方的搜集整理，中國農業科学院西北畜牧獸医研究所、中獸医研究所、甘肅農業大学和甘肅省中獸医学校曾派人协助，特致謝意。

甘肅省畜牧廳

1960年1月

目 录

猪鎖喉風（猪肺炎）	1
猪瘟	3
猪丹毒	7
猪喘气病	8
猪副伤寒	11
小猪白痢（仔猪傳染性下痢）	12
猪四季伤風（流行性感冒）	14
猪搐風病	15
猪腫喉症（喉头炎）	15
猪中暑	16
猪出痘	16
母猪催情方	17
猪的催肥方	17
猪慢食	18

猪鎖喉風（猪肺疫）

病狀：

重病發大熱，不食，无精神，行走搖擺，噪喉腫脹，呼吸受阻，喜臥于草堆里，耳、頸、腹部起紅點，常伸脖子；稍輕的，寒熱往來，有膿样眼屎，喜臥陰處，喉部腫脹，咳嗽喘鳴；有时由重轉輕，而成为慢症，时食时絕，拉痢，气味惡臭，身体逐漸消瘦，終于死亡。

治法：

針灸：針刺耳尖、尾尖血，流出之血，要深埋，用冷針扎八字穴（順皮扎）入針一寸二分。

处方：

一、一消散：用藤黃或生南星，搗碎，用醋酒調成泥狀，抹在腫處。

（摘甘肅中獸醫驗方選集）

二、吹喉散：硼砂一兩 元參五錢 冰片八錢 麝香二錢 蟾酥五錢 研成細末，裝入瓷瓶內，每次用五分至一錢，吹入喉中即效。

三、蘭豆清熱散：豆根一兩 元參五錢 二花五錢 枝子五錢 麝干六錢 連翹六錢 蘭根八錢 牛子四錢 黃連三錢 共碾細末

服法：大猪分兩次，小猪分三至五次用完。將藥末用蜂

蜜調成泥狀，用木板挑藥抹在舌根部，以吃完用量為止。

四、連桔散：杏仁三錢 牛子三錢 二花三錢 連翹四錢 知母三錢 桔梗四錢 黃芩三錢 貝母三錢 蘭根三錢 花粉三錢 蘇子三錢 柴胡三錢 石膏一兩 甘草二錢

服法：共碾成末，七十至八十市斤重的豬一次量，服法與上同。

五、二母散：知母三錢 貝母二錢 斗岩三錢 瓜元一個 明雄一錢 花粉二錢 百合二錢 黃芩二錢 天冬錢半 黃連一錢 生草一錢

服法：共碾成末，四十至五十斤重的豬一次量，服法與上同。

六、竹杏散：石膏一兩 竹葉一兩 薄荷六錢 防風四錢 杏仁五錢 白糖三兩為引

服法：共研細末，分四次服完，服法與上同。

（靜寧縣畜牧獸醫站）

七、清喉薄荷散：知母二錢 貝母二錢 黃芩三錢 木通三錢 山枝三錢 連翹三錢 苦參三錢 大黃四錢 芒硝四錢 薄荷二錢 生草二錢 桔梗二錢 生地三錢 麝香三錢 黃柏三錢 蜂蜜二兩

服法：與上方同。六十斤以上的豬一次服完。每天一劑，兩劑即愈。

（清水回族自治縣 仁雲端、王保育）

八、蘭根柴胡散：麝香八錢 黃芩八錢 知母五錢 陳皮四錢 半夏四錢 元參五錢 山枝五錢 豆根六錢 蘭根五錢 桔梗四錢 連翹五錢 薄荷四錢 杏仁六錢 大黃一兩 姜蚕五錢 柴胡四錢 二花四錢 黃連四錢 石膏一兩 芒硝一兩 黃柏四錢 甘草三錢 共研細末。服法與上

同。

用量：大猪用三兩，中猪用二兩，小猪用五錢至一兩。
心脏衰弱的加樟腦液七錢調藥內。

（蘭州市靖远路獸醫診療所 庾鳳山）

療效：共医治一百九十口，治愈一百八十三口，治愈率
达96%。

九、單母散：麻黃錢半 杏仁二錢 石膏五錢 甘草錢
半 桔梗二錢 貝母二錢 瓜仁二錢 連翹錢半 黃芩二錢
茶叶引服法同上。

（省中獸醫學校 王克儉）

十、香茹散：藿香錢半 香茹三錢 麝干三錢 豆根四
錢 蒼朮二錢 升麻二錢 大黃八錢 芒硝一兩 黃連二錢
生草錢半 連翹四錢 共研为細末加蜂蜜一兩調和服之。

用量：大猪一次服完，小猪分兩次服。

（宁縣畜牧站 高斌）

十一、清胃敗毒散：黃連二錢 大黃三錢 黃芩四錢
連翹四錢 知母四錢 貝母三錢 花粉四錢 白芍三錢 桔
梗五錢 石膏五錢 玉金二錢 白朮四錢 牛子五錢 豆根
五錢 麝干五錢 薄荷二錢 甘草一錢 木通二錢 升麻二
錢为引

（涇川縣新集獸醫站 陶正东）

猪 瘟

病狀：

病較輕：腰弓、头尾下垂，精神倦怠，行走不穩，渾身

發生斑疹。先糞干，后下痢，時食時停，愛飲水。

病較重：食慾減少或廢絕，或飲污水，時咳或嘔吐，眼有尿而腫，休熱，或寒熱往來，精神倦怠，喜臥陰黑處，有時發抖，行走遲緩，先便秘后下臭痢，渾身發生紫斑死亡快。

病嚴重：有時只見病豬驚恐，發燒不食，突然死亡。

治法：

解穢，清中，發散，攻下。

針灸：八字穴：在蹄叉中間，用冷針扎入一寸許。

后海穴：用冷針入針一寸。

分水穴：在兩鼻孔中間，用三稜針入針五分。

玉堂穴：在口內上顎第七稜，用冷針入針三分出血。

百會穴：在十字部，用火針入針一寸許。

處方：

一、吹鼻當分散：牙皂一兩 細辛五錢 川烏五錢 草烏五錢 雄黃三錢 麝香二分

用法：上藥炒焦存性，加雄黃、麝香共研為細末，收貯于磁瓶塞口，用時取藥，每次向病豬鼻孔吹五分，每天三次，給好豬嗅之，亦能預防此病。

（鎮原縣平泉公社中原大隊 劉興國）

二、清熱石膏散：黃連七錢 大黃三錢 朴硝四錢 貝母七錢 黃柏五錢 生石膏四錢 山枝五錢 黃芩五錢 麥冬五錢 花粉四錢 葶苈子一兩 連翹七錢 清油二兩為引

服法：共研為細末，體重三十斤者每付兩半，候溫濃服。

（定西縣 馬 忠）

三、雄腦丸：大黃二錢 蒼朮二錢 辛夷錢半 明雄二錢 牙皂一錢 山枝二錢 樟腦一錢 甘萆錢半 薄荷三錢 細辛錢半 柴胡二錢 黃芩二錢

服法：煉蜜為丸，大豬兩次服完。

（摘自甘肅省中獸醫驗方選集11頁）

四、解毒化斑散：玄參四錢 知母三錢 石膏三錢 人中黃二錢 黃連二錢 連翹三錢 升麻二錢 山枝三錢 黃芩三錢 牛蒡子三錢 滑石三錢 黃柏三錢 木通三錢 二花四錢 貫眾四錢 蒼朮四錢 豆根三錢 麝干三錢 大黃三錢 芒硝三錢 竹叶一錢 灯心一錢為引

服法：共研細末，用開水浸濕，加蜂蜜調成泥狀，以木板挑藥塗于舌上，百斤左右者一次服之。

本方可治療豬瘟、豬肺疫混合病例，若單純治療豬瘟時，方中減去麝干、豆根、升麻。

（甘肅省中獸醫學校 楊源聚）

五、天竺牛黃散：胆南星一兩 明雄八錢 硃砂三錢 牛黃四錢 甘草一兩 天竺黃八錢 麝香四分 生姜二錢為引

服法：共研為細末，大豬每付三錢，開水沖之，涼溫灌之。

六、清胆柴胡散：柴胡五錢 黃芩四錢 胆草四錢 山枝四錢 黃柏四錢 元參三錢 大黃五錢 朴硝四錢 地榆四錢 蒼朮三錢 明雄三錢 生草二錢

服法：共研為細末，調成糊狀，口服，四十斤以上的病豬每服二兩。

（靜寧縣畜牧獸醫工作站）

七、三黃石膏散：黃連七錢 大黃五錢 朴硝七錢 貝母七錢 黃柏五錢 石膏四錢 枝子五錢 黃芩五錢 麥冬

五錢 花粉八錢 葶苈子一兩 連翹七錢 豬油二兩

服法：共研為末，開水沖灌，大豬每次二兩，小豬減半。

（定西縣中獸醫 馬忠）

八、豆根消毒散：生地三錢 元參四錢 桔梗四錢 豆根三錢 牛子三錢 禹花三錢 連翹三錢 丹皮三錢 大蘇四錢 黃連三錢 枝子三錢 姜虫三錢 白朮四錢 生草三錢

服法：共研為細末，開水灌服。

九、加味三黃湯：大黃五錢 黃連二錢 黃芩三錢 枝子三錢 木通三錢 滑石四錢 知母五錢 桔梗三錢 豆根三錢 元參四錢 連翹三錢 花粉四錢 蒼朮三錢 川芎二錢 陳皮三錢 百部二錢 貫眾二錢 甘草三錢

服法：水煎取渣，候溫灌服，大豬一次灌服，小豬減半。

此方用于豬瘟、肺疫併合症。如無肺疫時可減去豆根、元參、百部。

（天祝縣古浪鎮公社畜牧站 蔣立元）

十、蒼朮祛疫散：大黃二錢 蒼朮二錢 辛夷三錢 牙皂四錢 枝子二錢 樟腦二錢 甘草二錢 柴胡二錢 黃芩三錢 蜂蜜四兩為引

服法：研成末，以蜂蜜制丸，分兩次灌服。

（西禮縣畜牧獸醫工作站）

十一、苦骨散：苦參一兩 石膏四錢 黃連五錢 木香二錢 龍胆草三錢 大黃五錢 柴胡二錢 南星二錢

服法：研末和于食內喂之。

（永昌縣土佛寺）

十二、四黃散：蒼朮一兩 厚朴一兩 連翹三錢 甘草二錢 胡連三錢 綠豆六錢 石膏一兩 山枝二錢 花粉錢半 大黃一兩 黃芩一兩

如豬肺疫併發者，加冬花二錢 桔梗錢半 浙貝一兩 蜂蜜二兩為引

此為豬瘟、豬肺疫、豬丹毒病之綜合療方。

（省中獸醫學校 王克儉）

十三、吹鼻散：冰片五分 明雄一錢 芽皂一錢 川烏一錢 草烏一錢 細辛一錢 麝香五分

以上共為細末，由鼻孔吹入，公豬吹左，母豬吹右，1955年到1956年治豬一百三十四只，治癒九十二只，達61%的療效。

（省中獸醫學校 白文彩）

猪 丹 毒

病狀：

病初不愛吃食，甚至不吃，身上發高燒（体温41—42°C），常臥在地上不起來，好象昏迷的樣子，要是把它趕起來，就東倒西歪，行走不穩，病豬常發關節炎，以後常嘔吐、拉稀，肚、胸、腿的里側和脖子等處的皮膚，有一些象手掌大的淺紅色斑，慢慢連成一片，變成暗紅色，不腫脹，也不疼痛，用手指按壓，紅色就退去，手指離開又成紅色，發病三至八天死亡。

治法：

針灸：針刺耳尖靜脈血。

（慶陽縣 賀峯杰）

处方:

一、磺胺噻唑，每体重一百市斤服四十至五十公分。分兩次灌服，隔五小時灌一次。

服法：用蜂蜜調成糊狀，用木板摸在舌根上，使其自嚥。

二、蟾酥五錢 輕粉三錢 苦硃四錢 寒水石五錢 銅綠三錢 乳香二錢 沒藥四錢 硃砂五錢 麝香五分 共研末。

服法：共研末，每五十斤體重的豬，每服一錢，加入燒酒一小杯，五十斤以下的豬，每服五分。

三、鷄清兩個 蜂蜜二兩 米甘水一碗 薑便半碗 菜油一兩 用桑條攪成黃末，攪的次數越多越好。

服法：互入食中，分三次灌服。

四、清熱解毒：青黛五錢 白硃五錢 明雄四錢 大黃四錢 芒硝三錢 木通五錢 滑石四錢 車前四錢 黃連二錢 焦枝四錢 黃柏三錢 知母二錢 防風二錢 竹叶灯心為引

服法：共研細末，作成泥狀，用木板摸在舌根上，使其自嚥。

（涇川縣新集獸醫站 陶正東）

猪喘气病

病狀:

輕微咳嗽而慢喘，食慾正常，兩眼發紅，頭低垂，喘息促迫，張口呼吸，食慾廢絕。

治法:

清肺、潤肺、降氣、定喘、敗毒。

处方:

一、連翹二紫素: 杏仁五錢 淨連翹二兩 紫草一兩
葶苈子一兩 禹銀花二兩 紫菀二兩 黃芩一兩 枇杷葉一
兩 桑皮一兩 生紫蘇五錢 竹瀝膏二兩

制法: 上藥加水四千毫升, 浸泡二十四小時, 再煎成二千
毫升, 用沙布濾過, 再將藥液投入蒸餾器內, 蒸餾出五百毫升
為度。用濾紙過濾, 裝入瓶內, 瓶塞上插一針頭, 放在開水
鍋內, 煮沸二小時, 取出針頭, 用蜡封口, 以免污染毒菌。

用法: 肌肉和靜脈注射。四十市斤左右之豬, 每頭注射
二百五十毫升。大家畜每次注射五十毫升, 可治療肺炎。

(天水市呂二溝獸醫院 張瑞田)

二、沙參二母散: 條沙參八錢 龜板錢半 貝母四錢
冬花一錢 知母一錢 化橘紅錢半 云苓二錢 百部錢半
半夏錢半 連翹錢半 花粉一錢 生姜二片

服法: 共為細末, 開水沖藥成糊狀, 待溫徐徐灌之。

(寧縣和盛公社獸醫所 馮占西)

三、喘可平: 川玉金一錢 炒枳殼錢半 川貝母錢半
款冬花(炙)錢半 知母錢半 化橘紅錢半 糖瓜蒌二錢
山枝錢半 黃芩錢半 雅黃連一錢 生軍三錢 炙杷葉錢
半 五味子五錢 紫蘇錢半 天冬二錢 云茯苓二錢 桔梗
錢半 杏仁(炒)錢半 姜半夏一錢 連翹錢半 生粉草
五錢

服法: 共研細末, 再加竹瀝五錢, 用開水沖藥, 候溫混
入飼料內自食。隔日服一次, 注射銀翹二紫素一次(注射
與內服藥要隔開, 不可同時進行)。注射或內服時, 嚴防掙

乳。

(天水市 張瑞田)

四、麻黃杏仁甘草散：麻黃 杏仁 薄荷 蘇子 桔梗
花粉 陳皮 半夏 知母各四錢 桑皮五錢 二花六錢 紫
苑四錢 冬花三錢 斗苓三錢 黃芩六錢 黃柏四錢 大黃
一兩 石膏二兩 川貝母三錢 甘草四錢

服法：共研細末，開水沖成糊狀，用木棒塗藥于舌根。

用量：大豬三兩，中豬二兩，小豬五錢至一兩。

(蘭州市靖遠路獸區聯合診所 于鳳山)

五、鷄清素：鷄清肌肉注射。

用量：大豬二十毫升，中豬十五毫升，小豬十毫升。

以上兩方在一次治療中結合使用。

六、葶苈平氣散：葶苈子五錢 桑白皮三錢 枇杷葉三
錢 馬兜鈴四錢 枳殼三錢 山枝二錢 黃芩二錢 杏仁三
錢 陳皮四錢 半夏二錢 天冬二錢 麥冬二錢 知母二錢
石膏三錢 玉金四錢 木香二錢 甘草二錢

服法：共為細末（如病豬體重十市斤者用藥一兩）以蜂
蜜調為泥狀，以木板挑藥塗于舌根部，使其自行吞嚥。如病
豬較大而藥用量大時，可將藥做成丸劑，借張嘴喘氣時投入
口內。

(省中獸醫學校 楊源聚)

七、化痰丸：苦參 杏仁 竹瀝各等分，作丸如彈子大。

服法：于飼料內喂之，可依病情加減用量。

(天水市商業局食品商店)

八、體溫升高用下方：川玉金一錢 炒枳殼錢半 川貝
母錢半 炙冬花錢半 知母錢半 糖瓜婁二錢 生山枝錢半
黃芩錢半 化橘紅錢半 黃連錢半 生軍三錢 炙杷葉

錢半 五味子五分 生紫蘇錢半 天門冬二錢 云苓二錢
桔梗錢半 杏仁錢半 姜半夏一錢 淨連殼錢半 生粉草五
分 竹瀝五錢為引

服法：共研末作成丸劑，每丸重二錢，分投口內，使其
自嚥。

九、清肺散：烏梅三個 白芍三錢 訶子肉三錢 云苓
二錢 澤瀉錢半 蘇子二錢 杏仁二錢 紫菀三錢 黃芩錢
半 連翹錢半 葶苈二錢 杷葉錢半 桑皮錢半 生蘇葉二
錢 竹瀝膏五錢為引

服法：同上。

（省中獸醫學校 白文彩）

豬副傷寒

病狀：

寒熱往來，不吃食，精神不振，身上發抖。

治法：

處方：

一、柴胡三錢 黃芩三錢 白芍二錢 生地三錢 知母
二錢 黃柏錢半 麻黃錢半 桂枝一錢 生草一錢 枝子
二錢

共治四十七頭，治癒三十一頭，死亡十六頭，療效達
70%強。

二、山楂一兩 銀花一兩 連翹一兩 生地一兩 花粉
一兩 海金砂一兩 麝香一兩 蒼朮一兩 甘草一兩 荊芥
一兩 薄荷一兩 葛根三錢 紅胡兩半 大蒜酊二十毫升

調制、服法：將上藥煎成茶黃色，去渣，加入大蒜酊，充分振蕩，裝瓶密封備用。每頭病豬按每市斤用藥二毫升計量，每日服兩次，連服兩天，即可治癒。

（注：二、方系湖南省農業廳畜牧局搜集）

小 豬 白 痢 （仔豬傳染性下痢）

病狀：

本病多發于產后五日左右的小豬，初期拉黃色粥樣糞便，后則成灰白色，而為水樣，氣味惡臭，亦有帶血或為膜樣，從肛門內流出；氣喘，體瘦，病重者一至二日死亡。

治法：

處方：

一、白頭翁散：白頭翁一兩 杭芍五錢 檳榔五錢 槐花五錢 生地榆五錢 炒扁豆五錢 云苓五錢 川朴五錢 萸黃連三錢

服法：共碾成細末，用開水沖成糊狀，供十口小豬用。

（天水市獸醫診療所 張瑞田）

二、一妙散：白胡椒一兩，混于飼料內，分三次喂母豬。小豬借食母豬之奶，就能治好此病。

（甘肅省農大家畜病院）

三、大蒜酒：大蒜二兩 白胡椒一兩 明雄五錢 白酒四兩

制法：先將大蒜搗爛，浸泡酒內，十二小時后，用其浸液，再將白胡椒，明雄研成細末，泡于大蒜浸液內。

服法：將此藥液涂于母豬奶頭上，使仔豬吃食，已斷奶

之小豬，可將此液塗在口內，一至二次即愈。

（臨洮縣城關獸醫防治站 龔大舜）

四、秦皮散：白头翁兩半 秦皮五錢 黃柏五錢 黃芩三錢 白芍三錢 石榴皮二錢

服法：共研細末；未斷奶之小豬，每服藥末三錢，開水沖藥，俟溫灌服；已斷奶小豬，每口用藥末三至五錢。可拌于飼料里，令其自食。

（榆中縣定遠大隊 蔣得義）

五、五虎平西湯：胡連一錢 黃芩二錢 檳榔二錢 黃柏一錢 玉金二錢 大黃一錢 枝子一錢 貫眾一錢 甘草一錢

服法：病豬體重達三至四市斤者，每日一次，灌一調匙，大些的酌情增加，藥末用開水沖成稀粥狀，涼溫灌服。

（武威縣獸醫門診部 于培材）

六、白头翁湯：白头翁八錢 秦皮五錢 沒食子六錢 烏梅六錢 龍胆草八錢 黃芩六錢 石榴皮八錢 柯子六錢 川黃連六錢 酒軍八錢 天仙子八錢 焦查八錢 川黃柏六錢 白朮八錢 白茯苓八錢 當歸六錢 炒鹽六錢為引如是細菌性的下痢，加鴨蛋子六錢，共研細末。

（酒泉市總寨畜牧獸醫站 吳述道）

七、五效散：柚子皮四兩（炒焦） 紅花一錢 花粉一錢 滑石三錢 紅糖四兩為引

上藥研成粉末，投入豬槽給母豬吃，斷奶豬亦可單獨放入豬食中喂，至白痢止，停藥即可。

（成都軍區 梁秉義）

八、附治大豬拉稀囊不吃方：厚朴四錢 枳殼四錢 玉片四錢 青皮四錢 陳皮四錢 白朮四錢 砂仁三錢 香附