

康健叢書

姚蓬心譯著

# 初產安全之指導

康健書局發行

# 初產安全之指導目次

第一章 妊娠與生理的關係.....	一
第一節 女子之生殖期間.....	一
第二節 容易妊娠之時期.....	三
第三節 胎兒的發育.....	七
第四節 胎兒在胎內之位置.....	一
第五節 母體因妊娠所生之變化.....	二
第六節 妊娠之診斷.....	四
第七節 妊娠中各月之鑑別法.....	五
第八節 妊娠之存續.....	九

第九節 妊娠歷……………二〇

第二章 妊娠中之一般養生法……………二四

第一節 養生的要義……………二四

第二節 衣服……………二五

第三節 飲食物……………二六

第四節 身體……………三〇

第五節 精神……………三四

第六節 醫生診察之必要……………三五

第七節 因種種不養生所生之惡結果的實例……………三六

第三章 胎教……………三九

第一節 胎教的重要性	三九
第二節 身體與精神之關係	四〇
第三節 妊娠的感情	四二
第四節 胎教的好處	四四
第五節 妊婦的心得	四五
第六節 妊婦和丈夫	四六
第七節 妊婦及其親屬	四八
第八節 妊娠與住所	四八
第四章 妊娠中之疾患	五〇
第一節 妊娠中之故障及其治療法	五〇
第二節 惡阻及其療法	五五

第三節	妊娠中之腎臟炎·····	五九
第四節	淋病患者之注意·····	六〇
第五節	徵毒患者之注意·····	六二
第五章	妊婦分娩前之準備·····	六四
第一節	產婆之選擇法·····	六四
第二節	生產之準備·····	六七
第三節	產室之準備·····	七一
第四節	分娩前之心得·····	七二
第六章	分娩及其攝生·····	七五
第一節	分娩之區別·····	七五

第二節	娩出力·····	七八
第三節	關於產道之知識·····	八五
第四節	正規分娩之經過·····	八七
第五節	分娩之攝生·····	九二
第六節	分娩時所起之異常及其應付法·····	九五
第七章 產褥攝生·····九九		
第一節	產褥期之機能·····	九九
第二節	產褥期之狀態及其攝生·····	一〇二
第三節	產褥期之異常及其應付法·····	一一三
第四節	產後之腳氣病·····	一二七
第五節	可怕之產褥熱·····	一一九

第六節 授乳與母體之健康.....一三三

第八章 初生兒之養育法.....一二九

第一節 健康的初生兒.....一二九

第二節 初生兒之處置.....一三四

第三節 天然養育法.....一四八

第四節 人工養育法.....一五八

第五節 初生兒之異常及其應付法.....一六〇

第六節 虛弱小兒之養育法.....一六三

第九章 初生兒的疾病.....一六四

第一節 初生兒常患之疾病.....一六四

第二節	胃腸病的徵候	一六五
第三節	小兒的便秘	一六六
第四節	小兒的下痢	一六七
第十章	妊娠之確知法	一六七
第一節	類似之妊娠	一六八
第二節	妊娠與想像妊娠的區別	一六九
第三節	確實妊娠的徵候	一七一
第四節	尿診斷的原理	一七三
第五節	血清診斷的方法	一七五
第六節	結論	一七六

# 初產安全之指導

## 第一章 妊娠與生理的關係

### 第一節 女子之生殖期間

我們在乎素間，必需知道的事體很多。而在這許多事體中，尤以妊娠，分娩，育兒等事，非特別研究不可的。因為凡是生物，都有保存種族和蕃殖種族的兩個義務。妊娠和生產，就是完成這兩個義務的第一步。

在女子體內的卵子，和男子的精蟲結合，這便謂之妊娠。就在這結合的一瞬間，女子便妊娠了。不用說的，妊娠這一大機能，是女子的天職。隨著這天職，而生物的蕃殖種族的，大義務便完成了。

生殖期間的女子，爲了完成她的天職，在她身體上，便自然地預備下了特別的機關，

女子的生殖器，就是這妊娠的必要機關，卵巢，輸卵管，子宮體，外陰部等都附屬其中。並且



女性生殖器解剖圖

在某一定的期間內，有所謂排卵和月經的特別作用，在這期間內的女子，便可以完成她的天職——能妊娠了。這個時期，就叫做女子的生殖期間。

女子一到了生殖期間，排卵和月經便開始了。在溫帶，平均女子的月經開始是十四歲零九個月，月經閉止期在四十八九歲時。一個女子，由初經時期到閉止期，

約莫三十年之中，只要一有機會，都有受孕的可能，但在二十歲左右，是受孕力最強的時

期，在這時期妊娠的胎兒，也是最強壯。


## 第二節 容易妊娠之時期

上文說過，男子的精蟲和女子的卵子結合，便妊娠了。因為這結合，男女間就必需有正當的結婚。但是一個健康的男子和一個無病強壯的女子結婚，是否就可以在無論什麼情狀之下都能受孕。這其中不論夫婦身體上有沒有何等的故障，結婚後數年數十年都不能妊娠的也有，有的男女二人，只一剎那的私下結合，此後對於肚皮漸大很難處置的也有。所以從前許多人的心目中，都深以為小兒是神佛所賜的。我們知道，這並不是神佛的工作，也不是其他什麼，仍然是我們生理上一種自然的妙機罷了。但所謂自然的妙機，還是人體生理上的一種機能，所以若闡明牠的理由，便自然地明白了。

妊娠成立的三要素

要怎樣妊娠才能成立，這有種種的條件，但總括下來，可以分爲

三點如左：



圖較比的蟲精與卵

精蟲是一種具有非常活潑運動性的東西，所以牠能自己前進，經過子宮腔而到輸卵管。一般的精蟲，大抵都是

送到子宮裏面，只要一經和輸入子宮中的男子的精蟲遇着，妊娠便成立了。在這時節，卵子中的蛋白質，便能供給胎兒的營養。

妊娠之成立

以上三點中，若有一點有障礙時，無論怎樣妊娠都不能成立，反之

故障沒有時，則月經時候卵巢的格蘭佛氏泡破裂了，同時卵子由卵巢脫出，由輸卵管傳

- (一) 卵之健全的形成及充分的成熟。
- (二) 健全的卵與健全的精蟲之結合。
- (三) 子宮適於保育孕卵的時候。

輸卵管處便和卵子相會合。但也有更近一些，在子宮內會合的，還有遠一些在卵巢會合的。若遇這種在卵巢會合時，便謂之子宮外妊娠，這是一種可怕的危症。

妊娠之地位

妊娠後的卵子，是常在子宮腔內發育的，若是精蟲和卵子是在子宮內會合而妊娠的，便如此發育下去，若是在輸卵管中懷孕的，那麼，這妊娠了的卵會慢慢地前進到子宮腔內去，固着在子宮內的黏膜上，再由先時月經時發生的小創面潛入在裏面，慢慢發育而成胎兒，這時妊娠便完全成立。


最易妊娠的時期

精蟲的進入子宮內，因時間的關係，難易上有很大的差異。在月經過後是最容易的時期，在月經前則是最困難。進入最容易時，也是最適於妊娠的好時期，所以若要達到準確妊娠的目的，恐怕最好就在月經終止的那天起的十天左右。

女子之妊娠力

現在說到女子的妊娠力，就是說一個婦人，在她一生之中，可以生產幾個兒女，女子的生殖期間，前面說過，大約三十年間，只要一有機會，無論何時，都能妊娠。

但是一次妊娠以後，接着分娩，產褥，哺乳，通常經過這各個時期，要二年的時間，這一次的



妊娠，才能休止。還有因為生病，或者其他的原因，也足以使妊娠停止的。據最近的調查，一

妊娠初期全期在子宮狀態圖

對夫婦間，有生產三十二個小孩的，算是生產數最多的了。還有一個不生產的也有。據一般學者研究的結果，普通一個健康的婦人，生產數可由十個到十二個的小孩。但實際上爲了種種的關係，一般的都不能生產這樣多的孩子。

妊娠之自覺

妊娠之


成立即受孕的時候自己能不能覺察呢？有的人說受孕時就是婦人在性交時比平常更感到強度的快感，但這是不能斷定的。因為在婦人感到很強的快感時，是子宮下落到深處的腔內去，後來回復到牠的舊位置時，才來吸引精液的。在這種時候，事實上多少也傾向於容易受孕方面；但也有一點快感也不覺著，好像熟睡中，麻醉中，居然也能受孕，甚至還有如強姦般地，意氣一點不投合的時候也能受孕的。要之健全的卵子和健全的精蟲結合便能受孕，這件事自己是不容易察知的。

## 第二節 胎兒之發育

### 妊娠之發育

受胎的卵一經附著在子宮壁的創面上，這被附著的部分的黏膜，便會增殖起來，把這卵的全體包圍，這被包著的卵也漸漸不停地變化了。有卵的一部分，便有名「胚板」的肥厚部發生出來，這胚板再曲了起來，成爲一個筒形的東西，這便成爲胎兒的基礎了。這筒的一端膨大起來便是頭，那一端也膨大起來，便成爲臀部。跟着有頭部

眼、耳、鼻等也形成了。再在腹的上下部、左右各分出二肢來。於是便是將來的手和足。他方



胎兒發育順序圖

面受胎卵附著的子宮壁上，也生出胎盤來。這胎盤和胎兒之間有臍帶連絡著。臍帶又接著三條血管，胎兒便由這血管可以吸取母體的營養物。我們須知道，小兒不只在哺乳時期中吸取母體的營養，而自胎兒時代使如此了，所以母體的營養如何，是直接影響到胎兒的。因此，妊娠及哺乳時代的母親，非有營養優良的滋養物不可，這是很顯明的知道的。

胎兒期的初步即卵子受胎的時候，它的形狀差不多和蛆類相似，是一種混沌的形式，但一步一步地發育起來，便具了人的形狀了。這發育的順序，是很正確而有規則的。

所以不論何時，大抵都可推知他是妊娠了第幾月的胎兒。

妊娠第一月

妊娠第一月末時，卵子有鳩卵這樣大，胎兒的長度約九公釐。全體曲得

很厲害，已有圓的頭和尖的尾端，眼在頭的兩側成爲兩個黑點。

第二月

第二月末時，卵子已有雞卵大了，胎兒有四公分長，眼睛也成爲凹入的小穴，

還有其他鼻孔，耳孔等發生出來，手足的關節也影約可以認出。

第三月

第三月末時，卵有鵝卵這樣大，卵中的胎兒約長九公分左右，這時眼裂生出，

手足的指也可區別，同時胎盤也生出了。

第四月

第四月末時，胎兒的身長約十七公分弱，手足指的尖爪長出，外陰部判然，可

以看出男女的區別來。這時，胎兒的身體也會動了。這胎兒的運動，在母體便感到是胎動。

第五月

第五月末時，身長約二十五公分，頭部已生出毛髮，皮膚亦有毳毛。此外胎兒

還會活潑的運動。

第六月

第六月末時，身長約三公寸。眼裂微開，皮膚的下層生出脂肪層來。全身被滿