

通俗讀物出版社

消灭麻风病

施守义写



內容說明

麻风病是一种很可怕的地方性、慢性传染病。这种病在我国已經有了二千四百多年的历史，对于人民健康有着很大的危害性。解放以来，党和政府有計劃、有步骤地开展了防治麻风的工作，在1956—1967年全国农业发展綱要中并明确规定要积极防治这种病。这本小冊子以預防为主，重点介紹麻风病的病因、病状、危害性、傳染途径和防治方法。适于一般具有高小文化水平的城乡讀者閱讀。

消灭麻风病

施守义写

封面設計：紀于

＊

通俗讀物出版社出版

(北京香櫞胡同78号)

北京市書刊出版業營業許可證051号

北京文海印刷厂印刷·新华書店發行

＊

印號1號1 开本587×1062

印張5/8 字數35,000

1957年5月第一版 1957年5月第

印數： 1—1,400

614.5
S156

統一書號：T14008·12

定价：(5)七分

目 录

一 写在前面	2
二 什么是麻風病	4
三 麻風病是怎样傳染的	11
四 得了麻風病應該怎么办	14
五 怎样預防麻風病	17

一 写在前面

在旧社会，生了麻風病簡直就沒有办法。不光病人自己苦了一輩子，毛病傳染开来，还要連累許多人受苦。反动政府只会剥削人民，压迫人民，对这种危害很大的疾病，沒有積極想过治疗的（疗讀）办法，医疗的設备当然也極少。这样；不幸患了这种病的人要医治沒法医治，要隔离沒法隔离。有病的越来越凶，而且把病傳染开去，造成很大的危害。反动政府不但裝着沒瞧到，甚至干出灭絕人性的勾当。比如国民党反动派，有一年在广东，就曾經把麻風病人集中起来杀害，末了挖个大坑，埋掉了事。

解放以后，共产党和人民政府做了許多好事。当中有一件，就是对麻風病大力地进行了防治工作。举个例子說，解放前全国只有 3,200 張麻風病床，而且除了云南的一个麻風院由自己管理外，其余的都由傳教的外国人管。解放后，为了积极治疗旧社会傳下来的麻風病，光是麻風病床，就增加 12,000 多張。另外还添設（添讀）許多診疗机构（々々），研究和大量制造了很多有

效的藥品，積極設法預防和治療，同時還加強了衛生宣傳教育工作，說明這種病可以治好，並從多方面指出預防和傳染的知識。這樣一來，就把麻風病有效地消除下去了。

但是，這並不是說，今天麻風病在我國完全絕迹了。據估計，目前全國還有一定數量得這種病的人。人是我們國家最寶貴的財富。這一部分得了麻風病的人，就會失去他們全部或一部分勞動能力，這不管從哪方面來說，對國家是一個很大的損失！因此，在“1956—1967年全國農業發展綱要”（草案）中，黨就號召大家要積極防治麻風病。

防治麻風病，當然要依靠國家衛生機關，但是還需要群眾的支持和合作。比如，大家對麻風病如果都有正確的認識，那麼做起防治工作來就會更加順利。

今天，很多人對這個病還是有不正確的看法的。有的把麻風病看成一種絕症，認為得了病，一輩子就完了，由於怕病，也就厭惡病人，使病人得不到同情和安慰。有的却麻痺得（[癡]讀兮[懈]）不行，不相信這病是會傳染的，滿不在乎地（[乎]讀兮[呼]）和病人一塊兒吃喝睡覺，方便了麻風病的傳染。這兩種錯誤的看法，如果不糾正過來，都會妨礙防治工作。

下面，我們就來談談麻風到底是怎樣一種病，我們試讀結束：需要全本請在線購買：www.3tongbook.com

可以用哪些办法来防治它。

二 什么是麻風病

麻風病就是一种由麻風杆菌引起的慢性傳染病，老百姓把它叫“大麻風”，或者“癩病（[癩]讀[ㄌㄞ][賴]）”。这个毛病在我国發生，大約已經有 2,400 多年的历史了。

我們現在常常劝人家講个人衛生和环境衛生，这样才会不生病，或少生病。因为在我們的周圍，有許許多看不見的有害的細菌，它們頂喜欢在又髒又暗（^又[按]）又潮湿的地方生活。要是我們不講清潔衛生，这些坏蛋就会鑽空子，跑到我們的身上來。那时候，如果我們身体的抵抗力不强，病菌就在我們身体里繁殖（[殖]）起来，活动起来，那么我們就害病了。一切傳染病象伤寒、白喉等等，都是这样得的。麻風病也是一样。它是



圖 1 在顯微鏡下看到的麻風杆菌

由一种象火柴杆一样的“麻風杆菌”（只能在显微鏡下面才看得到），侵入人体、破坏身体的組織后發作的。

但是，麻風杆菌侵犯到人的身体上以后，要經過多少時間才發病呢？这要看侵入細菌的数量多少、毒力大小和被侵害人的抵抗力怎样。侵入細菌的数量越多，毒力越强；被侵害人的抵抗力越差，發病就越早。通常兒童和少年人發病要比成年人早些，这是由于少年兒童对麻風杆菌抵抗力差的緣故。一般說來，麻風杆菌从侵犯到人体后，大約平均要經過 6 个月到 3 年的时间，才出現病状，有的可能还要长些。一旦（忽）發現病状，就應該立刻請医生医治，同时應該極耐心的接受治疗。經過长期治疗以后，这个病是可以治好的。

在患病的早期，因为麻風病的症状發生不明显，我們應該要特別注意。如果發現我們手脚上的皮膚，無緣無故的起皰（多），或者面孔和身体上發生紅塊，而一直不退，用手摸摸，感覺有些不灵敏，有些地方皮膚顏色改变（白），感覺發麻，不能辨別（辨讀）冷热，不出汗等。这些現象，不一定是麻風的症状，但也可能是。因此，为了辨別是不是麻風，以便及早治疗，就應該立刻請医生檢查，弄清楚。

我們每个人的身体有强有弱。身体强的人，对病菌的抵抗力强，不容易得到毛病，即使得了毛病，症状也

輕些。身體弱的人，對病菌的抵抗力差，很容易得毛病，而且得了病，症狀也特別厲害。麻風病菌侵入人體後，也根據我們人的身體強弱的不同，發生不同的症狀。根據症狀輕重的不同，可以把麻風病分為二大類型，輕的一類叫“類結核型麻風”，重的一類叫“瘤型麻風
(瘤[讀] ㄉㄧㄡ [流])”。

這二種類型麻風，究竟有些什麼不同呢？

先談類結核型麻風。類結核型麻風是由於麻風病菌侵入抵抗力較強的人身上發生的。當麻風病菌進入人體後，因為人的抵抗力強的緣故，麻風病菌在人體裏面的生活、散播和繁殖，都受到阻力，所以症狀的發展




圖 2 類結核型麻風




圖 3 類結核型麻風

来得慢，看起来也比较轻。在患病的早期，外表上看上去，可以看见脸孔或身上长出一塊塊的紅斑（ㄉㄢ）（圖2、3、4）。中央是平坦的，边缘整齐清楚，略微高于周围的好皮膚。轻轻撫摸时（撫讀_[fǔ]），感觉不灵敏，有时还有象螞蟻（螞讀_[mǎ]
蟻讀_[yǐ]）爬在上面的异样感觉。这种紅斑，一直不退，并且逐渐向外圍扩大、蔓延（蔓讀_[màn]）。过了二、三个月后，麻木起来感不出冷热，感不到痛，连汗也不出了。再下去，紅斑的中心顏色轉白，变得乾燥（乾讀_[khan]）、粗糙（糙讀_[cāo]），有一層層鱗皮（鱗讀_[lin]），很象生癬（癬讀_[ts'ien]）一样。正因为这种病状，




圖4. 類結核型麻風



圖5. 類結核型麻風，耳下的
神經粗大象腿子一样

有些象是癬，这就使患病的人，很容易当是长癬或者害别的皮膚病，而不去注意它。因此我們千万不能麻痹大意，把它和癬混錯了。实际上，它和癬或别的皮膚病是有區別的。普通长了癬或者害上别的皮膚病，有病地方的皮膚都是發痒的，而生了麻風病才不知痛痒，才是麻木的。另外，麻風病还可能有这样的症状：眼睛閉不攏（カズル）、嘴巴歪斜（歪カスル）、手脚發麻、手指拳曲伸不直，象鷹爪（鷹爪カクザウ）一样。将头偏过去，在耳朵底下，还可摸出二根很粗很硬的筋来，这就是有病的神經（圖5）。如果發現了这些症状，即使是一部分，就應該立刻到医院去，请医生檢查和医治。

在类結核型麻風病人的身体里面，麻風杆菌受到身体强的抵抗力的制止，活动能力很小。因此在皮膚有病的部位和鼻孔粘膜里（膜カム）是找不到麻風杆菌的，正因为如此，我們說类結核型麻風是不会傳染的。对这一类麻風病人，就不需要他住院。



圖 6 瘤型麻風(獅臉)



圖 7 瘤型麻風(獅臉)

隔离，只要在門診医治，并且可以照常工作。但是如果病人处在某些不利的情况，而使身体抵抗力慢慢削弱的时候，麻風杆菌就活动繁殖起来，就有可能由类結核型变成能傳染人的瘤型麻風。但是在实际上，这种例子是不多的。

另一类瘤型麻風的發生，是由于病人本来抵抗力就弱，麻風杆菌

在他的身体里繁殖得很快，活动力也大，所以病状的發展也很迅速([迅]讀[迅]),并且非常严重。在發病的早期，也是皮膚上长出紅色的斑疹(圖 8)，但是顏色要比类結核型麻風淡些。这些紅斑的邊緣，和周圍的好皮膚不容易分得很清楚，看去有点肿脹。后来紅斑地方的皮膚慢慢地都变得麻木起来，甚至連手脚也發麻，失去了对痛痒冷热的感觉，有时上身也会發生一陣陣的疼痛。跟着，病人的臉孔、脖子([脖]讀[脖])和耳朵上漸漸地长出圓的發紅發亮的隆起([隆]讀[隆])疙瘩([疙]讀[疙][瘩])。过了一些时




圖 8 瘤型麻風

期，有些臉上的這些疙瘩連成了紫褐色的（褐讀「カ」）一片，象癩蛤蟆（蛤蟆讀「カツマダ」）皮的模樣，醜惡難看，因為很象獅子（獅讀「シ」）面孔，有的人就叫它“獅子臉”。這些疙瘩裏面，藏着很多麻風病菌，疙瘩破了，病菌就跑出來傳染別人。有的病人還會掉眉毛，落頭髮，眼睛發紅、流泪、閉不攏，甚至鼻梁（鼻梁讀「カミヤマ」）塌陷（塌陷讀「カタクル」），嘴巴歪斜，臉孔發腫、流膿（流膿讀「リュウム」），喉嚨（喉嚨讀「カラ」）潰爛（潰爛讀「カツラ」），手腳也會烂掉。麻風病菌常常侵犯性器官叫它發病。女病人往往有月經不調或者月經停止等病狀；男病人多數發生睪丸炎（睪丸炎讀「テマニヤン」）。睪丸肿得象鷄蛋，甚至鵝蛋（鵝蛋讀「カイヂ」）那樣大。等到睪丸組織被破壞以後，乳房（乳房讀「バヒ」）長大，鬍鬚（鬍鬚讀「カヌ」）、鬚（須讀「ス」）掉落，聲音變得象女子一樣。如果將病人頭偏過去檢查，在耳朵下面，也可以看見兩根粗筋，就是肿大的

神經，但是一般都是不硬的。瘤型麻風不但病狀嚴重，在皮膚有毛病的部位（如疣瘡里、鼻孔粘膜上），都可以找到很多的麻風杆菌，所以這一类麻風病，是有傳染性的。這類病人，必須嚴格的隔離。如果我們看到有符合上面症狀的病人，應當立刻勸導他到醫院去檢查和醫治，並且想法儘快地把他隔離開來，不要讓他的病再傳染別人。

三 麻風病是怎樣傳染的

上面講過，瘤型麻風是傳染的。這類病人身上，潰爛的伤口（無論從鼻孔、喉嚨和皮膚上），排出的液体，都含有大量的麻風杆菌。如果這些麻風杆菌弄到沒病的人身上，他的皮膚上哪怕只有一點極小的破傷，病菌就有機會進去（對完整的皮膚，病菌是不容易侵入的）。另外象病人用過的東西、穿的衣服、蓋的被褥（臥具）、吃用的碗筷，也都能把病菌傳染給人。

麻風病的傳染方式，主要可以分成下面幾種：

第一是由於同屋居住傳染上的。如果家里有一人生了瘤型麻風病，他又和家里人生活在一起，吃在一起，甚至同床睡在一起，這樣密切接觸（接觸），就可能使全

家人都得上这种病。小孩子身体抵抗力差，在这种环境中，更容易染上麻風病。朋友亲戚(^{くわい})常常来往或在一起工作，也能相互傳染。此外，如居住环境潮湿，不注意清潔衛生，身体弱，营养不良等，都是麻風病傳染的有利条件。

第二是由于夫妇性交傳染上的。夫妇一方生了瘤型麻風病，性交时就能将麻風病傳染給对方。因为病人的生殖器上，会受麻風菌損害。性交时，这部分磨破了，麻風杆菌就接种到对方身体里去。另外，麻風男子的精液內，也有麻風杆菌存在，所以男的有麻風病，經過性交，也可以由精液傳染給女的。在我国某些地方，有“卖風”的說法，就是男的或者女的麻風病人，和一个健康人性交，就可以把病卖給对方，而自己的麻風病就好了。事实上，把病傳染給別人确是真的；但自己的病是絕對不会因这样就好了。所以，这个說法或做法，是害人又害自己的，这是一种極不道德的作法，應該絕對禁止。麻風病可以由性交傳染，那末禁止麻風病人結婚也就完全合理的。当然，医好了以后，还是可以結婚的，正象婚姻法中所規定的一样。这是預防麻風病蔓延傳播的一种正确的措施(^{[措]讀[ツメ]}_{タメ}[錯])。

第三是由于虫子傳播而得上的。蒼蠅、蚊子、跳蚤(^{フタバ}_{トガ})、蟑螂(^{[蜂]讀尤[カニ]}_{[蟻]讀尤[カニ]})、臭虫等接触过麻風病人后，

究竟能不能把麻風杆菌带到健康人身上去而傳播麻風病，現在還沒有經科學家証實。我們知道，麻風杆菌一离开人的身体，如果不能立即傳到別人身上，隔不多久，就会很快死去的。但是象蚊子、臭虫等虫子，就会咬破健康人的皮膚，給麻風病菌打开方便之門。所以我們也应当扑灭这些害虫。說到这里，也許有人問，鷄蛋會傳染麻風嗎？我們說不會的。鷄染上麻風杆菌，因为鷄身體的溫度比人的体温要高，麻風杆菌是活不成的。所以吃了麻風病人家里的鷄生的蛋，是不会傳染上麻風病的。

有很多人以為吃魚可得麻風病。这种說法也是不正确的。如果魚从生瘤型麻風病人手里买来，在拿魚的时候，受到傳染，倒是可能的。但是煮熟的魚，吃了是不会得麻風病的。

又有人問，麻風能遺傳嗎？我們說不會的。虽然在麻風男子的精液內，找到麻風杆菌，但是在精虫里面或者女子的卵子（卵子讀）里，還沒有發現。所以麻風病是不会遺傳的。有的时候，在分娩（分娩）過程中，胎兒通過母亲生有麻風疙瘩的产道，这样，麻風杆菌就有机会并且很容易进入胎兒的身体，成为将来發生麻風病的种子。不过这仍然是接触傳染，而不是遺傳。

总之，麻風傳染的主要条件，是在和麻風病人的密切接触。既然知道了麻風是怎样傳染的，我們对这个病，

就不能馬馬虎虎滿不在乎。对瘤型麻風的病人，必須实行严格隔离。另外，我們見了麻風病人，也用不着太怕甚至連一句話也不敢和他講，因为我們已經談過，麻風病不是仅仅一碰到麻風病人，就会傳染上的。

四 得了麻風病應該怎么办

麻風病虽然是一种厉害的傳染病，但不是治不好的病。特別是从新中国成立以来，科学的研究工作發展很快，研究麻風專家們，都在積極地鑽研医治麻風的有效方法，来解除病人的痛苦。例如藥物治疗，先是有了大楓子油〔楓〕〔脂〕治疗麻風，最近又有礦類藥物〔礦〕〔脂〕，在治疗上都有显著的成效。現在我們可以說，如果得病时期不超过二年，麻風病是完全可以治好的。不过治疗时间需要比較长，至少二年以上，所以接受麻風治疗要有耐心，不要半途而廢。

用藥物治疗麻風病，是一个主要的医治方法，但是还需要很多的輔助〔輔〕〔助〕条件，来改善病人的身体状况，增强病人身体的抵抗力，使病人能够早日恢复健康。

第一，要注意营养。麻風病人如果吃得好的话，可以增强身体抵抗力，病就好得快。很多人以为要营养好，

就必須吃鷄、吃肉。其实大可不必，只要多吃些青菜、菠菜([波]譯)、豆腐、豆浆和鷄蛋等等，也就行了。此外还要注意不要吃难消化的食物，也不要吃得过飽，并且禁止喝酒、抽烟。

第二，麻風病人应当做些适当的劳动工作，象紡紗、織布、搓繩([撓]譯)、种地、飼養([飼]譯)牛、羊、鷄、猪等，这样能增强身体抵抗力，使病好得快。而且，有的麻風病人如果手伸不直，脚走不稳，在劳动之后，讓手脚活动活动，也是有好处的。再說，从事一点劳动生产，病人就能自食其力，也可以減輕社会上的負担。但是劳动应当根据病人的輕重情况来决定。病重而且在發展中的，就不要劳动，只可以活动活动，或者做点輕巧的工作。病情較輕的，参加劳动生产后也不要过于劳累。

第三，麻風病人應該講究衛生。如果不講究衛生，不注意隔离，就容易把自己的病傳給別人。并且因为自己的身体抵抗力削弱，还会得到别的毛病，这样会使麻風病更加厉害起来。

第四，麻風病人的心靈應該乐观。精神愉快会使毛病好得更快。所以病人治病要有百倍信心，切不可悲观失望。

能够做到以上这几点，藥物治疗的效果也就更大。