

譯編青俊梁士博學醫

驗方新編

集 一 第

行發社版出界世藥醫

醫學博士梁俊青編譯

驗方新編
(第一集)

醫藥世界出版社發行

一九四九年十一月初版

版權
所有
必究

編譯者

梁

俊

青

發行者

吳

曼

青

印刷者

三

和

印

刷

所

地址：大連路一七五號
電話：五一七二九號

發行者

醫藥世界出版社

上海（23）愚園路65弄六號
電話：三三三六五號

總經理處：

人民書報供應社

上海河南路一七〇號
電話：一三三二零號

寄售處

上海市醫師公會

上海（9）威海衛路25弄七號
電話：六二三一六號

編輯大意

這本驗方新編第一集是收集了全世界各國的經驗良方彙成一冊，希望給一般開業醫師都可以在診病時隨時翻閱來提醒他們腦海中的記憶，並且可以在很短的時間中指示他們知悉現在的各種最新療而且最可靠的治療方法。這對於醫家和病家雙方都是有利的。雖則在本書一百條驗方中有四分之三的已經登載在醫藥世界雜誌上，但是現在把它集成一冊當然比較以前的散漫來得便利許多。而且其餘的二十五條都是非常難得而且非常可靠的經驗良方，將來也不會再在醫藥世界雜誌上登載出來。由此推論，本書當然有它本身的價值了。

有許多醫師（尤其是內地的醫師）因為很少機會閱讀書報的關係對於近年來的最新療法都是相當陌生的。如果他們現在每人都能購備一冊去作臨診時的參考，那末他會印證了近年來的醫學是進步到令人不能想像的地步。

雖然這本小冊子所收集的材料並不很多，但是編者已經化費了許多時間去參考全世界各國的醫學書報。但願讀者能够藉此有所得益或則至少能够治愈若干本來已經認為無法可治的病症，那末編者的一番苦心也不致白費了。

目次

- (一) 汽巴新藥 Antistin 可治敏感性休克
- (二) 治帶診新法
- (三) 屢發性 Hordeolen 之新療法
- (四) 傷寒症之新療法
- (五) 慢性中耳炎之治法
- (六) 腸內積氣之排除法
- (七) 減除戒煙時發生斷癮現象之新法
- (八) 治療兩側性腎結核症新法
- (九) 急性傷寒鼻塞之療法
- (十) 配尼西靈治猩紅熱之奇效
- (十一) 闊大面積之皮膚烙傷急救法

- (十二) 鏈黴素醫治急性白濁之靈效
- (十三) 急性中風之解救方法
- (十四) 酒糟鼻之醫治方法
- (十五) 風疹塊之治療方法
- (十六) Benzin 治療腸寄生蟲的方法
- (十七) 瘙癢症，狼瘡以及腺體硬結性紅斑症之新療法
- (十八) 急性腎臟實質炎之新療法
- (十九) 安眠藥中毒之解救方法
- (二十) 雀斑之醫療方法
- (廿一) 治療丹毒之新法
- (廿二) 非專門性腸胃炎之新療法
- (廿三) 用菸鹼酸醫治凍瘡之新法
- (廿四) 用 Gynergen 醫治上膊叢神經痛及坐骨神經痛之新療法
- (廿五) 中耳硬化症之療法

(廿六) 胃潰瘍症與十二指腸潰瘍症之新療法

(廿七) 月經前發生腰痛之療治法

(廿八) 鏈黴素醫治鼠疫最爲靈效

(廿九) 膿瘍之新療法

(三十) 男子白濁之快速療法

(三一) 嬰孩腸胃炎之療法

(卅二) 甘草油膏可治胃潰瘍症及十二指腸潰瘍症

(卅三) 多汗症之療法

(卅四) 單純性鼻孔出血之治法

(卅五) 注射配尼西靈後發生風疹之療法

(卅六) 用鉍劑醫治扁桃腺炎之新法

(卅七) 治療脚上濕氣及皮膚上乾癬之中英出品「療膚藥」

(卅八) 安眠藥中毒之另一療法

(卅九) 關節風濕炎之新療法

- (四十) 保士的命 (Prostigmin) 可治偏頭痛及類似偏頭痛病症
- (四一) 慢性酒精中毒之療治法
- (四二) Parpanit 治療風濕性關節病
- (四三) 風濕性關節炎之最新療法
- (四四) 最有效之止咳藥
- (四五) 靜脈注射蜜蜂製劑之效用
- (四六) 大量 Pyramidon 可治小兒麻痺症
- (四七) Nicotinsaeureamid 可治血清病
- (四八) 陰門癢或肛門癢之治法
- (四九) 鏈黴素治療大腸菌病症之功效
- (五十) 鏈黴素發生敏感情形時之治療方法
- (五一) 手脚冷的治法
- (五二) 治療三叉神經痛的方法
- (五三) 初期瘧疾症之治法

(五四) 常有舉陽的治療方法

(五五) 震顫麻痺症 (Parkinsonismus) 之治療方法

(五六) 氣喘症發作時之治療方法

(五七) 慢性氣管炎中頑固性咳嗽之治法

(五八) 頑固性頭痛之治法

(五九) 滲出性肺結核症及肋膜炎症的新療法

(六十) 皮膚上刺花的醫治方法

(六一) 特發性血壓過高症的新療法

(六二) 結核性淋巴腺腫大症之治法

(六三) 「普羅卡因」(Procain) 作為靜脈注射之治療方法

(六四) 治療口乾口臭的良法

(六五) 常有噁氣及腹漲的治療方法

(六六) 「金黴素」Aureomycin 對於斑疹傷寒有治療功效

(六七) 氣喘症發作時之新療法

- (六八) Atebrin 可治腸內寄生之纖蟲
- (六九) 慢性多關節性風濕症的新療法
- (七十) 急性全身發作性濕疹之療法
- (七一) 最好的開胃藥
- (七十二) 帶疹之療法
- (七三) 出血性痔瘡的療法
- (七四) 肛門搔癢症的療法
- (七五) 男性荷爾蒙製劑可治女人之濕疹
- (七六) 治療蟻蟲在腹內寄生之導瀉法
- (七七) 急性腎臟炎之療法
- (七八) 片狀脫髮癬之最新療法
- (七九) 用青黴素醫治後期梅毒之新法
- (八十) 嬰孩患皰基性皮膚炎之療法
- (八一) 眼內結核症之新療法

- (八二) 治療腎部頑癬之經驗良方
- (八三) 面皰之新療法
- (八四) 治療皮膚急性發炎之方法
- (八五) 治療女子白濁症之新法
- (八六) 夜間遺尿症之治法
- (八七) 頑固性風疹的治法
- (八八) 禿髮性毛囊炎的治法
- (八九) 性神經衰弱症之治療方法
- (九十) 專治各種頑固性乾癬的藥方
- (九一) 專治牛皮癬的藥方
- (九二) 多發性硬化症之新療法
- (九三) 臭鼻症的新療法
- (九四) 兩下腿在夜間抽筋(脛攣)之療法
- (九五) 高年人糖尿病之療法

(九六) 小孩結核症之治療方法

(九七) 芥子氣製劑可治淋巴組織肉芽腫症

(九八) 專治結核症的派斯 (F. A. S.)

(九九) 子癰性兩眼發黑之治法

(一百) 治療凍瘡之良方

驗方新編

(一) 汽巴新藥 Antistin 可治敏感性休克

據本年瑞士醫學週報上載有 H. Conz 氏者曾遇一病人患有濕疹，彼為探求其過敏原因起見曾試用一種含有尼古丁之物質作表皮上之過敏性反應試驗。詎料此過敏性反應非常劇烈於一小時後病者即有惡心作嘔，及腹痛。再等一小時後發生吐瀉，血壓下降，脈搏不整，心跳急速，繼則虛脫，皮色青紫而蒼白。冷汗如豆，手足震顫，呼吸急促昏迷不醒。同時尚有逐漸增劇之肺水腫現象。醫者曾為注射各種強心劑如 Coramin, Sympathol, Campher, Atropin Coffein 皆不見效。又在其曾作過敏反應試驗之皮膚上於四小時後亦有組織壞疽之現象發生。醫者鑒於病者之危急情形逐漸增加去死不遠，遂急速為之肌肉注射汽巴藥廠新出品 Antistin(O. I.)。於十五分鐘後立即好轉。於一小時後心跳正常，呼吸平穩，神志清明，嘔吐全無。比至翌晨則已完全恢復。即其皮膚上發生壞疽之處亦

已逐漸痊愈矣。

(按 Anustin 爲汽巴之新出品專治各種過敏症如氣支管性氣喘，枯草熱以及風疹塊之類均有奇效值得介紹也)。

(二) 治帶疹新法

據紐約 F. G. Walsh 醫師在 (近世醫刊) 「本年份十六卷第九頁」報告，治帶疹即 (Herpes Zoster) 用紫外線之起紅斑療法最佳。其法如下：用紫外光燈按照病者發源地域之神經發源處照射八分鐘至十分鐘使其皮上發生紅斑，每日一次不可間斷。往往於照射二次即已痊愈。至其紫外光燈與病者患處相隔之距離則爲 80cm 云

(三) 屢發性 Hordeolen 之治法

吾人於臨診時往往遇見一種眼病，在眼皮上睫毛附近患有一種小黃豆大小之硬癬 (即 Hordeolum) 屢發屢愈，甚難根治。茲據一九四七年出版之英國眼科雜誌第三十一期上載，凡患屢發性之 Hordeolen 者若用自家血清注射法治之，靡不痊愈云 (見 H. T. Stern)

(四) 治傷寒症新法

據一九四八年份 *Lancet* 雜誌第六五〇二頁上載 G. Bevan 氏等曾於三十九位傷寒症患者中試用配尼西靈與磺胺噻劑之混合治療，結果皆有奇效云。

(五) 慢性中耳炎之治療

慢性中耳炎往往甚難治愈，醫者每感棘手。其實慢性中耳炎與頭部各處之附竇炎 (Sinusitis) 甚有關係。若能利用愛克司光之攝影診斷其附竇炎之所在而加以外科方法割治，則其中耳炎痊愈甚速，濃液不復流出，耳鼓膜穿孔癒合，聽覺完全恢復或則好轉許多而病者之一般情形亦大為改進云。

(六) 腸內積氣之排除法

患病人腸內積氣時腹內漲悶難受異常。舊時每用橡皮管置於肛門內以排洩之，或則令病者內服骨炭粉以及酶素如 *Festal* 之類以治之。然皆有效有無效，不可靠也。一九四

八年 *Lancet* (第六四九九頁) 曾載英國 Glasgow 大學 Prof. S. Alstead 及 T. F. Patterson 之報告，謂用八至十單位之 *Piuitrin* 注射於病者之肌肉內，然後於十分鐘內爲病者灌腸而安放一橡皮管於直腸內，則見效非常迅速。近人頗亦有主張注射 *Physostigmina* 與 *Prostigmin* 者惟其功效不甚可靠且其副作用亦甚大云。

(七) 減除戒煙時發生斷癮現象之新法

戒除鴉片嗜好之工作往往因斷癮現象之難受而宣告失敗。茲有一法可以減少斷癮時之各種痛苦。其法如下，即於減少鴉片之代替品至於嗎啡份量每天 0.1 時，即給與病者每天內服 *Pyribenzamin* 四次，每次 50mg. 連用數天，則其斷癮現象消失而煙癮亦可迅速戒除云。(請參看 P. Kells, *Miami Fla-South Med. T.* 1948, 41, 134)

(八) 治療兩側性腎結核症新法

吾人對於兩側性之腎結核症向來認爲棘手(因一邊之腎結核症可以割治而兩側性者不能割治)，往往任其自然，聽其死亡。前曾有人主張用長期注射鍊黴素之法，但大多

數皆爲無效。今有一種大風子油與鏈黴素聯合使用之法醫治兩側性之腎結核症甚有奇效云。其法如下：以熱帶地方出產之 *Hydrocarpus Wightiana* 油（即大風子油）與 *Chaulmoograoil* 相同，能直接搗毀結核菌與麻瘋菌之蠟質包壳且在肌肉內注射毫無痛苦。每天注射肌肉內一次每次一西西，連用三天後則改爲每天注射二西西連用四天。然後每天注射此藥一西西而再加注射鏈黴素（每天分作八次注射）連用三十天不可間斷即愈。（請參看 GE Slohin 氏原著載 J. Urol. 1947 58, 464）

（九）急性傷風鼻塞之療法

據 T. R. Brewster 氏報告，凡係急性傷風鼻塞症於初起時即給予內服 0.05 之 Benadryl 一粒（小兒則用 0.01-0.025）晚上睡眠時再服一粒，則往往立即痊愈或則於短時期內痊愈云（請參看 United States Naval Med. Bull, 1947, 47, 810）●

（十）配尼西靈治猩紅熱之奇效

據丹麥哥本哈根大學醫院之 T. Jersild 醫師報告彼處曾經以配尼西靈治療二千餘猩