

权威·科学·专业·实用

全书辨证施治，借鉴古今用药经验，汇聚本草纲目精华，收录中医精髓辨证疗法百余例，成为沟通中医药理论与实践的桥梁，让普通读者认识到中医用药的辨证原理。

\*周九如  
主编

# 家庭实用本草

金书



# 家庭实用本草

\* 周九如 主编

全书



图书在版编目 (CIP) 数据

家庭实用本草全书 / 周九如主编. —重庆：重庆出版社，2006.12

(养生堂系列)

ISBN 7-5366-8302-2

I . 家... II . 周... III . 本草 - 汇编 IV . R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 145771 号

保 / 健 / 养 / 生 / 第 / 一 / 书

养生堂系列 04

# 家庭实用本草

JIATING SHIYONG BENCAO  
QUANSHU



出版人：罗小卫

责任编辑：陈建军 余守斌

特约编辑：张 娜

封面设计：韩少杰 夏 鹏

制 作：**重庆出版社** (www.rzbook.com)

 重庆出版社 出版

(重庆长江二路 205 号)

北京外文印刷厂 印刷

重庆出版集团图书发行公司 发行

邮购电话：010-85869375/76/77 转 810

E-MAIL：sales@alpha-books.com

全国新华书店经销

开本：787mm × 1092mm 1/16 印张：18 印张 字数：260 千字  
2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定价：39.80 元

如有印装质量问题，请致电 023-68809955 转 8005

版 权 所 有，侵 权 必 究



## 推荐序

## \*Foreword

# 善用名方，就是名医

**近代** 很多有学问、且曾接触过中医的人常说：“西医能治标，能救急；中医能治本，无副作用，但不科学。”因此，二十年前我提出“中医现代化，中药科学化”的看法和主张，我的看法是中药需要科学化，但中医不能科学化。为什么我说中医不能科学化呢？如果把中医科学化了，中医就失去了特色，也失去了立足点，中医只有跟着西医跑；阴阳五行的基础理论，七情六欲的病因学说，阴虚、阳虚、气虚、血虚的整体治病法则，寒、热、温、平、升、降、浮、沉的药物特性，皆须扬弃；八纲辨证，三焦辨证，营卫气血辨证等辨证论治法则，完全需要改成辨病论治；一些放之环宇而皆准，千年万世不能变的原理、原则、玉律、金科，通通都要丢到垃圾箱内，这还是中医吗？

为什么我说中药需要科学化呢？因为中药虽然能治疗很多西医无法治疗的疾病，但是中药煎煮麻烦，服用口感不佳，外出旅游、经商携带不便，且有些中药因产地、土壤、气候、栽培方法不同，成份不明，性质不稳，必须借重现代科技，加以分析、精炼、定性、定量，制成容易服用，便利携带的散剂、片剂、丸剂（以上三种剂型早已行之有年），故说，中药需要科学化。

方剂学是中医药的精华，但必须在中医辨证论治的指导原则下，加减化裁，量身打造，灵活运用，才能显现其效果。

很多处方，是古人用之有效而载之经典的

有效名方。古人说：“善用名方，就是名医。”所谓名方，就是以往的名医（非名医），经过很长长时间、众多病人的临床验证，对某些疾病确具疗效的偏方，它的出处有三：部分出自验方（伤寒金匮方）；部分出自元、明、清三代医家创制方；部分出自近代医家经验方。吾人只要勤读医籍，灵活运用四诊，掌握理、法、方、药，慎选经典名方，临床加减化裁运用，自可得心应手。对于大部分疾病的治疗，犹如探囊取物，自可手到擒来。

本书邀请当代方剂名家，汇集历代名方，以现代生理、病理学名词，运用通俗文句加以解说，重新分门别类，使其更加条理化、系统化，较之原有处方解说，更为明确，使人人可学，家家合用，此正符合本人一贯主张的中医现代化、中药科学化的精神，出版在即，故乐贅数言，以就正于方家。

台湾著名医师

## \* HOW TO USE

# 怎样使用本书



## \*病症分类

全书共分两大部分：常见疾病防治和日常生活保健调理。其中，常见疾病防治部分按照现代医学分类体系，分为呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管系统疾病等11篇内容。每部分从贴近实际生活出发，选取最常见的病症，以便于读者临证运用。

### ③ 功效

按照中医药理论，阐释该方剂的功用。

5 现代研究

从现代医学的角度阐释中药及复方的有效成分和作用原理。

4 用法

介绍该方剂的传统剂型和简单的制法、煎服法等。(没有特别说明服用时间的均为饭后服用)



① 中医知识

讲解中医常见术语，深入浅出帮助读者更好地理解中医理论精髓。为方便读者查询，书后附有笔画索引。



## ② 组成

包括该方剂的药物组成与剂量

## ⑥日常生活提示

介绍贴近生活实际的健康提示，引导读者走出健康误区，建立良好的饮食生活习惯，从而真正走向以家庭预防为主的治病理念。

## 8 中药药理

按照中医药理论，阐释该中药在方中的功用和作用原理。

## ⑨ 小贴士

针对证型的健康提示。

- ◎ 若方中所用药物为国家保护动物，使用时请用代用品，如犀角换用水牛角等。
  - ◎ 药方的来源，基本上是根据疗效较好，而又容易掌握的原则选取。
  - ◎ 使用药量，采用标准计量，以g（克）计量，使用时可根据药物的性能和患者的体质强弱、病性轻重、年龄大小等具体情况而加减。书中的用药量除了小儿科外，均为成人员量，儿童用时应酌减。
  - ◎ 方中组成沿用经典方剂组成，但是有些药物未经炮制毒性较大，现在临床为了用药安全，一般使用或药店出售的多为经过炮制的药材，如半夏多用制半夏，附子多用制附子。本书此类药物呈现图片均为经过炮制后的样子。
  - ◎ 书后附常用中草药功能表（含概临床常用中草药400余种）

## 7 验方

最后还附有民间验方，以供读者多方选择。

主治  
预防

主 治 预 防 药 物 分 析

# 验方

## ○主治痛经单验方

### ●益母草30克

粳米行汤为水备用。每次9克，酒煎服，可连用2~3次。活血调经、散瘀，适用于血瘀痛经。

### ●砂艾炭9克

加红糖水冲服，煎煮服或温服，或以黄酒煎服。温经散寒止痛，用于寒凝湿滞之痛经。

### ●益智仁、香薷各等分，蜜酒适量

葛根、香薷一起研末，每服6克，黄酒调服。日2次，适用于阳虚内寒之痛经。

### ●当归30克、肉桂9克、红糖30克

先将红糖研末，向日当归、齐铁棍的炒，以黄花炒至微黄为度。再加红糖末，煎成浓汁后，将红糖倒入煎液中，每次9克，分2~3次，连服2~3剂，正确治疗可取效。适用于血瘀为主的痛经。

### ●田螺9只、肉桂12克、鸡蛋3只

将田螺、升桂、鸡蛋加水同煮，鸡蛋熟后去壳取蛋两枚剥壳，切碎，加蜜酒，适用于肝肾虚证之痛经。

### ●当归30克、羊肉300克、北芪30克

羊肉去脂去毛，洗净，切块，适用于气虚血瘀型痛经。

## ○主治痛经食疗方

### ●山楂150克、红糖150克

先将山楂研末，向日当归、齐铁棍的炒，以黄花炒至微黄为度。再加红糖末，煎成浓汁后，将红糖倒入煎液中，每次9克，分2~3次，连服2~3剂，正确治疗可取效。适用于血瘀为主的痛经。

### ●田螺9只、肉桂12克、鸡蛋3只

将田螺、升桂、鸡蛋加水同煮，鸡蛋熟后去壳取蛋两枚剥壳，切碎，加蜜酒，适用于肝肾虚证之痛经。

### ●当归30克、羊肉300克、北芪30克

羊肉去脂去毛，洗净，切块，适用于气虚血瘀型痛经。

### ●主治痛经外敷方

#### ●乌药、砂仁、木香、延胡索、香薷、甘草各等量

将上药用细布包裹熨贴，适用于虚寒型痛经。

#### ●益母草、香薷、茯苓、淡芩、艾叶各20克

上药水煎2000毫升，浸泡，每次15~20分钟。

## 痛经自我按摩疗法

凡经期开始痛者，一般在月经前3~4天开始出现，经期或经后数日仍不消止。一般人经期前4~7天开始治疗，3个月为一个疗程。确凿的推论以腰腹为主，使其达到温热舒适的感觉。

### 按揉小腹

用单掌或双手掌心揉搓腹部，以顺时针为主，频率要快，力度要适中，时间3~4分钟。

### 点揉穴位

用拇指指腹点揉气海、关元、中极、膀胱等穴，每次半分钟。

### 揉擦中极

掌摩掌揉擦中极穴，以热透为度。

### 推擦冲任

用掌擦从中脘推至中环3~6圈，用手及掌左右相对对擦揉擦阴交至中极一段脉络和两侧冲脉，力量要轻而重，时间3~4分钟。

## 10 实用按摩

部分病症引入效果更加显著的家庭按摩疗法。这使本书更具实用性。



# 目录



contents

什么是中药方剂.....	10
方剂的用法.....	12
方剂的分类.....	14

## 常见疾病防治

### 01 呼吸系统疾病

#### 感冒 / 18

●荆防败毒散.....	19
●银翘散.....	20
●藿香正气散.....	21
●参苏饮.....	22
●加减葳蕤汤.....	23

#### 咳嗽 / 25

●三拗汤和止嗽散.....	26
●桑菊饮.....	27
●桑杏汤.....	28
●二陈汤.....	29
●清气化痰汤.....	30
●泻白散.....	31
●沙参麦冬汤.....	32

#### 支气管哮喘 / 34

●射干麻黄汤.....	35
●定喘汤.....	36
●玉屏风散.....	37
●六君子汤.....	38

- 金匮肾气丸.....39
- 五磨饮子.....40

## 02 心血管系统疾病

### 高血压 / 42

- 天麻钩藤饮.....43
- 半夏白术天麻汤.....44
- 一贯煎.....45
- 二仙汤.....46

### 低血压 / 48

- 补中益气汤.....49
- 归脾汤.....50
- 大补元煎.....51
- 炙甘草汤.....52

### 冠心病 / 54

- 血府逐瘀汤.....55
- 瓜蒌薤白半夏汤.....56
- 栝蒌薤白白酒汤.....56
- 左归饮.....57
- 生脉散合人参养荣汤.....58
- 参附汤合右归饮.....60

## 03 消化系统疾病

### 慢性胃炎 / 62

- 香砂六君子汤.....63
- 理中汤.....64
- 益胃汤.....65
- 金铃子散.....66
- 温胆汤.....67
- 三仁汤.....68

### 腹泻 / 70

- 枳实导滞丸.....71
- 葛根芩连汤.....72
- 真人养脏汤.....73
- 藿香正气散.....74

### 便秘 / 75

- 归芪润肠汤.....76
- 白虎承气汤.....78
- 六磨汤.....79

- 大黄附子汤.....80

## 消化性溃疡 / 82

- 保和丸.....83
- 木香顺气散.....84
- 黄芪建中汤.....85
- 清胃散.....86
- 丹参饮.....86
- 天花粉散.....87

## 04 肝胆疾病

### 胆石症 / 89

- 大柴胡汤合茵陈蒿汤加减.....90
- 四逆散加味.....91
- 一貫煎.....92

### 脂肪肝 / 94

- 涤痰汤合胃苓汤加减.....95
- 消瘰丸合化积丸加减.....96

### 肝硬化 / 97

- 逍遥散.....98
- 化瘀汤加减.....99
- 济生肾气汤合五苓散加减.....100
- 一貫煎合猪苓汤.....102

### 病毒性肝炎 / 103

- 茵陈蒿汤.....104
- 茵陈五苓散.....105
- 茵陈术附汤.....106
- 柴胡疏肝散.....107
- 滋水清肝饮.....108



## 05 内分泌代谢系统疾病

### 糖尿病 / 110

- 金匮肾气丸.....111
- 玉女煎.....112
- 增液承气汤.....113
- 五苓散.....114
- 六味地黄丸合生脉散.....115

### 低血糖症 / 117

- 大补阴丸.....118
- 人参养荣汤.....119

●参附汤	120
<b>高脂血症 / 122</b>	
●导痰汤	123
●丹田降脂丸	124
●杞菊地黄丸	125
●附子理中汤	126
<b>痛风 / 128</b>	
●薏苡仁汤	129
●白虎桂枝汤	130
●虎潜丸	131
●茯苓丸	132
<b>类风湿性关节炎 / 134</b>	
●防己黄芪汤	135
●当归拈痛汤	136
●活络效灵丹	137
●补肾祛寒治尪汤	138



## 06 泌尿系统疾病

<b>尿路结石 / 140</b>	
●三金汤	141
●济生肾气丸	142
●沉香散	143
<b>慢性前列腺炎 / 145</b>	
●萆薢饮	146
●六味地黄汤	147
●八正散	148



## 07 妇科疾病

<b>痛经 / 150</b>	
●膈下逐瘀汤	151
●温经汤	152
●少腹逐瘀汤	153
●清热调血汤	154
●圣愈汤	155
●调肝汤	156
<b>功能失调性子宫出血 / 158</b>	



●清热固经汤	159
●保阴煎	160
●固冲汤	161

●失笑散合四物汤	162
----------	-----

## 慢性盆腔炎 / 164

●完带汤	165
●内补丸	166
●止带方	167
●五味消毒饮	168

## 更年期综合征 / 170

●知柏地黄丸	171
●左归丸加味	172
●杞菊地黄丸加减	173

## 不孕症 / 175

●开郁种玉汤	176
●启宫丸	177
●少腹逐瘀汤	177
●毓麟珠	178
●养精种玉汤	179

## 08 小儿科疾病

### 小儿遗尿症 / 180

●补中益气汤合缩泉丸	181
●菟丝子丸	182
●龙胆泻肝汤	183

### 小儿厌食症 / 185

●曲麦枳术丸合四君子汤	186
●异功散	187
●养胃增液汤	188

### 流行性腮腺炎 / 189

●普济消毒饮	190
●银翘散	191
●龙胆泻肝汤	191

**09 皮肤科疾病****黄褐斑 / 193**

- 加味道遥散 ..... 194
- 脾补汤 ..... 195
- 右归丸 ..... 196
- 知柏地黄丸 ..... 197

**青春痘 / 198**

- 枇杷清肺汤 ..... 199
- 茵陈蒿汤 ..... 200
- 参苓白术散 ..... 201
- 柴胡疏肝散 ..... 202

**荨麻疹 / 204**

- 消风散 ..... 205
- 桂枝汤 ..... 206
- 防风通圣散 ..... 207
- 八珍汤 ..... 208
- 逍遥散 ..... 208
- 四物汤 ..... 209

**湿疹 / 210**

- 草薢渗湿汤 ..... 211
- 清热除湿汤 ..... 212
- 四物消风汤 ..... 213
- 资生健脾丸 ..... 214

**10 头面五官疾病****头痛 / 216**

- 川芎茶调散 ..... 217
- 黄芷石膏汤 ..... 218
- 建瓴汤 ..... 219
- 通窍活血汤 ..... 220
- 当归补血汤 ..... 221

**慢性鼻炎 / 222**

- 苍耳子散 ..... 223
- 当归芍药汤 ..... 224
- 参苓白术散合苍耳子散 ..... 225

**口疮 / 227**

- 清胃散合泻黄散加减 ..... 228
- 天王补心丹 ..... 229

- 桂附理中汤加减 ..... 230

**11 骨伤科疾病****肩周炎 / 232**


- 程氏蠲痹汤 ..... 233
- 桂枝芍药知母汤 ..... 234
- 身痛逐瘀汤 ..... 235
- 独活寄生汤 ..... 236

**颈椎病 / 238**

- 羌活胜湿汤 ..... 239
- 清心补血汤 ..... 240
- 芍药甘草汤合二仙汤 ..... 241
- 镇肝熄风汤 ..... 242

**腰椎间盘突出症 / 244**

- 薏仁附子散 ..... 245
- 宣痹汤 ..... 246
- 复元活血汤 ..... 247
- 强腰壮肾汤 ..... 248
- 归芍地黄汤 ..... 249



# 日常生活保健调理

**缓解压力、改善睡眠 / 252****益智补脑 / 256****抗衰老 / 260****美容瘦身 / 264****亚健康自我调理 / 271****走出抑郁 / 275**

# 附录及索引

**常用中草药功能表 ... 280****中医常用名词笔画索引 ... 286**

# 什么是中药方剂



方剂，是在辨证审因决定治法之后，选择合适的药物，酌定用量，按照组成原则，妥善配伍而成，是辨证论治的主要工具之一。方剂的历史相当悠久。早在中国原始社会时期，我们的祖先就已发现药物并用以治疗疾病。最初，只是使用单味药。经过多年的医疗实践，认识到用几味药配合起来治病的效果更好，于是逐渐形成了方剂。从现存最早中医理论的经典著作《黄帝内经》里可以看到有关治疗原则、治疗方法、遣药组方和配伍宜忌等方面大量的理论论述。在春秋战国时期，方剂已建立了指导再实践的基本理论。特别是东汉张仲景著述的《伤寒杂病论》，创造性地融理、法、方、药于一体，后人尊为“方书之祖”，为方剂学的形成和发展奠定了基础。

## 方剂和治法的关系

方剂是理、法、方、药的一个组成部分，是在辨证立法的基础上选药配伍组成的，所以，首先要理解方剂与治法的关系，才能准确地遣药组方。

从中国医药学的形成和发展来看，治法是在积累了相当医疗经验的基础上总结而来的，当治法已由经验总结上升为理论之后，就成为指导遣药组方和运用成方的指导原则。例如，一位感冒的患者，经过四诊合参，审证求因，确定其为外感风寒所致的表寒证后，根据表证当用汗

法，治寒当以温热药的原则，决定用辛温解表法治疗，并且按法选用相应的

有效成

方，或自行

选药组成辛温

解表剂，如法煎服，便能汗出表解，邪去人安。否则，治法与辨证不符，组方与治法脱节，必然治疗无效，甚至反使病情恶化。

由此可知，治法是指导遣药组方的原则，方

剂是体现完成治法的主要手段。所以，虽然我们常说“方以药成”，却又首先是“方从法出，法随证立”，二者之间的关系，是互相为用，密不可分的。

## 方剂的组成

方剂，是由使用单味药治病、进而多味药治病的基础上开始形成，又经历了从辨证论治到辨病施治相结合的过程，不断发展成熟的。方剂是运用药物治病的进一步发展和提高。在应用上，由于所用药物的种类多少和产生疗效的快慢不同，分为七类，简称七方：大方、小方、缓方、急方、奇方、偶方、复方。七方是方剂组成的法则之一。所谓大方，是指药味多或用量大，以治邪气方盛所需的重剂。小方是指药味少或用量小，以治病浅邪微的轻剂。缓

方是指药性缓和，以治病势缓慢需长期服用的方剂。急方是指药性峻猛，以治病势急重急于取效的方剂。奇方是指由单数药味组成的方剂。偶方是指由双数药味组成的方剂。复方是指两方或数方组合的方剂。



## 方剂的组方原则

每一个方剂的组成，固然必须根据病情，在辨证立法的基础上选择合适的药物，但在配伍组成方面，还需要遵循严格的原则。一般而言，方剂的组成可分成君、臣、佐、使四类药物，而每一方剂的具体药味多少，以及君、臣、佐、使是否齐全，全视病证大小与治疗要求的不同，以及所选药物的功用来决定。

### A 君药

是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。其药力居方中之首，用量较作为臣、佐药应用时要大。在一个方剂中，君药是首要的，是不可缺少的药物。

### B 臣药

有两种意义，一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物。二是针对兼病或兼证起治疗作用的药物。它的药力小于君药。

### C 佐药

有三种意义，一是佐助药，即协助君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要的兼证。二是佐制药，即用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性。三是反佐药，即根据病情需要，用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。佐药的药力小于臣药，一般用量较轻。

### D 使药

有两种意义，一是引经药，即能引方中诸药以达病所的药物。二是调和药，即具有调和诸药作用的药物。使药的药力较小，用量亦轻。

活性。“方从法出”，以及君、臣、佐、使的配伍组成，是遣药组方必须遵循的原则。而具体药物的选择，配伍关系的安排，药量大小的确定，以及剂型、服法的要求等等，都与病证的变化、体质的强弱、年龄的大小、四时气候的不同、南北水土各异均有密切关系。

**药味的增减变化：**有两种情况，一是佐使药的加减，因为佐使药在方中的药力较小，不致于引起功效的根本改变，所以这种加减是在主证不变的情况下，对某些药进行增减，以适应一些次要兼证的需要。二是臣药的加减，这种加减改变了方剂的配伍关系，会使方剂的功效发生根本变化。

**药量的增减变化：**药量是标识药力的。方剂的药物组成虽然相同，但药物的用量各不相同，其药力则有大小之分，配伍关系则有君臣佐使之变，从而其功用、主治则各有所异。

## 方剂的剂型

药物配伍组成方剂，还必须研究适合病情需要或药物特点的剂型，才能更好地符合治疗要求和发挥药效。随着医药的发展，历代医家在长期临床实践中，创造了多种剂型，如汤剂、散剂、丸剂、膏剂、丹剂、酒剂、茶剂、药露、锭剂、饼剂、条剂、线剂、灸剂、糖浆剂、片剂、冲服剂、针剂、胶囊剂等。

方剂的剂型各有特点，同一方剂，尽管用药、用量完全相同，但剂型不同，其作用亦异。但这种差异只是药力大小与峻缓的区别，在主治病情上有轻重缓急之分而已。如抵当汤与抵当丸，两方基本相同，前者用汤剂，主治下焦蓄血之重

证，其人发狂或如狂，

少腹硬满，小便自利；后者用丸剂，主治下焦蓄血之轻证，只见身热，少腹满，小便自利。



## 方剂的组成变化

方剂的组成既有严格的原则性，又有极大的灵

# 方剂的用法

方剂的用法包括煎法和服法



## 煎法

煎法是指煎药方法。包括煎药用具、煎药用水、煎药火候、煎药方法。

### 1. 煎药用具

一般以瓦罐、沙锅为好，搪瓷器具或铝制品亦可，忌用铁器、铜器，因为有些药物与铜、铁一起加热之后，会起化学变化，或降低溶解度。煎具的容量宜大些，以利于药物的翻动，并可避免外溢耗损药液。同时应加盖，以防水分蒸发过快，使药物的有效成分不全释放。

### 2. 煎药用水

用洁净的冷水，如自来水、井水、蒸馏水均可。前人常用流水、泉水、甘澜水（亦称劳水）、米泔水等。根据药物的特点和疾病的性质，也有用酒或水酒合煎。用水量可视药量、药物质地及煎药时间而定，

一般以漫过药面3~5厘米为宜。目前，每剂药多煎煮2次，有的煎煮3次，第一煎水量可适当多些，第二三煎则可略少。每次煎得量100~150毫升即可。

### 3. 煎药火候

前人有“武火”、“文火”之分，急火煎之谓“武火”，慢火煎之谓“文火”。一般先用武火，沸腾之后即用文火。同时，要根据药物性味及所需时间的要求，酌定火候。解表与泻下之剂，煎煮时间宜短，其火宜急，水量宜少；补益之剂，煎煮时间宜长，其火宜慢，水量略多。如将药煎煮焦枯，则应弃之不用，以防发生不良反应。

### 4. 煎药方法

煎药前，先将药物浸泡20~30分钟之后再煎煮，其有效成分则易于煎出。对某些要求特殊煎法的药物，应在处方中加以注明。

\* 先煎：介壳与矿物类药物，因质地坚实，药力难于煎出，应打碎先煎，煮沸后20分钟左右，再下其他药。某些质地较轻而又用量较多以及泥沙多的药物，（如灶心土、糯稻根等），亦可先煎取汁，然后以其药汁代水煎药。

\* 后下：气味芳香的药物，以其挥发油取效的，只煎5分钟左右即可，如薄荷。用大黄后下取其攻下，一般煎10~15分钟即可。对所有后下药物，都应先进行浸泡再煎。

\* 包煎：某些煎后药液混浊、或对咽喉有刺激作用、以及易于粘锅的药物，如赤石脂、旋覆花、车前子等，要用纱布包好，再放入锅内与其他药同煮。

\* 单煎：某些贵重药物，如羚羊角、西洋参等，为了避免其有效成分被其他药物吸收，可切片单煎取汁，再与其他药液和服，亦可单独服用。

\* 溶化（烊化）：胶质、粘性大而且容易溶解的

药物，如阿胶、蜂蜜等，应单独溶化，趁热与煎好的药液混合均匀，顿服或分服，以免因其性粘而影响其他药的煎煮。

\* 冲服：某些芳香或贵重药物，不宜加热煎煮的，应研为细末，用药液或温水冲服，如麝香、牛黄、琥珀等。

## 服法

服药是否合适，对疗效有一定影响。服法包括服药时间和服务方法。

### 1. 服药时间

一般来说，病在上焦，宜食后服；病在下焦，宜食前服；补益药与泻下药，宜空腹服；安神药宜睡前服；对胃肠有刺激的，亦应食后服。急性重病则不拘时服，慢性病应按时服。治疗疟疾的方药，宜在发作前2小时服。十枣汤服在平旦，鸡鸣散服在五更。这些服药时间对提高疗效都有重要的意义。

### 2. 服药方法

服用汤剂，一般1日1剂，分2~3次温服。根据病情需要，有的1日只服1次，有的可以1日数服，有的又可煎汤代茶服，甚至1日连服2剂。另外，还有热服、冷服。通常是治疗热证可以寒药冷服，治疗寒证可以热药热服，这样可以辅助药力。但若病情严重时，又应寒药热服，热药冷服，以防邪药格拒。对于服药呕吐者，宜加入少量姜汁，或先服姜汁，然后服药，亦可采取冷服，小量频服的方法。对于昏迷或口噤的患者、吞咽困难者，可用鼻饲法给药。使用峻烈药与毒性药时，宜从小量开始，逐渐加量，取效即止，慎勿过量，以免发生中毒和损伤正气。



## 方剂的使用禁忌

### 1. 十八反

川乌、草乌反半夏、瓜蒌、川贝、浙贝、白蔹、白芨。甘草反海藻、大戟、甘遂、芫花。藜芦反人参、党参、南沙参、丹参、苦参、玄参、细辛、白芍、赤芍。

### 2. 十九畏

硫黄畏朴硝(芒硝)；水银畏信石(砒霜)；狼毒畏密陀僧；巴豆畏牵牛子(黑白丑)；丁香畏郁金(川、广郁金)；牙硝畏荆三棱；川乌、草乌畏犀角(广角)；人参畏五灵脂；桂枝、官桂、肉桂畏赤石脂、白石脂。

### 3. 妊娠期禁用的药物

川乌、草乌、巴豆、黑白丑、大戟、芫花、商陆、三棱、莪术、斑蝥、水蛭、千金子、虻虫、蜈蚣、水银、雄黄、雌黄、砒霜、硝石、芒硝、南星、麝香等。

### 4. 妊娠期慎用的药物

桃仁、红花、乳香、没药、牛膝、生大黄、枳实、冬葵子、瞿麦、川芎、附子、肉桂、干姜、半夏、代赭石、牡丹皮、皂角、木通等。

### 5. 服药时的饮食禁忌

饮食禁忌即食忌或忌口。在服药时按药材的性质而定，不能同时吃某些食物，以免降低药效，或产生副作用。一般来说，患病服药期间，凡属生冷粘腻或腥臭等不易消化及有特殊刺激性，或有致过敏的某些食物，都应避免食用。凡患者在发热过程中，更应忌食油腻之食品。

# 方剂的分类



## ◎解表剂

指凡以解表药为主组成，具有发汗、清热、解肌、透疹、宣肺、平喘、止咳等作用，可以治疗表证的方剂。外感风邪首先由肌表侵入，出现表证：如发热、头痛、身重、脉浮等症状，治疗宜取“汗法”，使表邪从肌表而解，如麻黄汤、桂枝汤、香薷散、桑菊饮、银翘散、荆防败毒散等。**使用解表药需注意的事項：**(1) 适用症状以表证为主。(2) 表邪未尽出现里证者，治疗宜表里双解。(3) 表邪发展已全部入里者，则不宜再用解表剂。(4) 以取微汗透身为佳，不透汗则表邪不去，但汗出过多，反而伤损正气，应注意不要使大汗淋漓。

## ◎泻下剂

泻下剂是由泻下药为主组成制剂，具有清热润肠，通导大便，泻下积滞等作用，以治疗实邪积聚，腑气不通，浊气不降而致大便秘结不通的里实证；也可用于津枯便秘或痰饮水滯留等证候。如大承气汤、温脾汤、麻子仁丸、十枣汤、增液承气汤等。**使用泻下剂时要注意：**(1) 表邪未解，里实未成者，不宜用；若表证未解而里实已成者，宜先用解表剂解表，后用泻下剂攻里，或用表里双解剂，不可单用泻下。(2) 泻下剂易耗损正气，故得效即止，不可用量过大，不可久服。(3) 经期、产后、孕妇、年老体弱及病后气血虚弱者，寒下，温下，逐水之剂均应慎用。(4) 服

泻下剂后，不宜早进油腻及不易消化的食物，以防重伤胃气。

## ◎和解剂

凡具有和解少阳、调和肝脾、调和寒热、表里双解等作用，治疗伤寒邪在少阳、肝脾不和、寒热

错杂，以及表里同病的方剂，统称和解剂。和解剂原为治疗足少阳胆经病证而设。然而，胆附于肝，表里关系至为密切，无论肝胆受邪，或本身功能失调，常相互影响，并往往累及脾胃，故肝脾之间失调，上下寒热互结而气机升降失常者，皆可用和解剂治疗。此外，前人以“症不离少阳”，多将治疗疟疾的方剂列入和解剂中，如小柴胡汤、四逆散、逍遥散、痛泻要方、半夏泻心汤等。

**使用和解剂时要注意：**(1) 凡外感疾病，表邪未解，或邪已入里，阳明热甚者，不宜使用和解剂。(2) 凡由劳倦内伤，饮食停滞，气血不足而见寒热者，不宜使用。(3) 七情内伤，肝脾不和，治宜配合思想开导方法。

## ◎清热剂

里热证的生成原因有两方面，一是外邪入里化热，外感六淫之邪，侵入体内变为里热证；二是人体情志过极，久而化火。凡以清热药为主组成，具有清热、泻火、凉血、解毒等作用，主治里热证的制剂，统称为清热剂，如白虎汤、凉膈散、化斑汤、导赤散、清胃散等。**使用清热剂时要注意：**(1) 本类方药性多寒凉，易伤脾胃，对脾胃虚弱的患者，宜适当辅以健胃的药物。(2) 热病易伤津液，清热燥湿药，又性多燥，也易伤津液，对阴虚的患者，要注意辅以养阴药，祛邪不忘扶正。(3) 对脾胃虚寒、胃纳不佳、肠滑易泻者慎用。

## ◎祛暑剂

暑病常因暑天劳作奔走或贪凉饮冷引起，同时夏天多湿，故暑病易伤气，并常挟寒挟湿。常见寒热、倦怠、头沉身重、腹泻呕吐等症状。凡具有祛除暑邪作用，用以治疗暑病，兼有解表和里，清热利湿功效，并以清热祛暑和芳香化湿药物为主组成的制剂，统称祛暑剂，如清络饮、新加香薷散、六一散、清暑益气汤等。**注意事项同清热剂。**



## ◎温里剂

一般寒证有表里之分，有表寒者宜温散解表，使用解表剂；如寒邪入里，则使用温里剂。凡以温热药物为主组成，具有温中散寒，回阳救逆，温经散寒作用，能祛除脏腑经络寒邪，治疗脾胃虚寒，经脉寒凝及亡阳欲脱等里寒证的一类制剂，统称为温里剂，如理中丸、四逆汤、黄芪桂枝五物汤、小建中汤等。**使用温里剂的注意事项：**(1) 若平素火旺之人，或阴虚失血之体，或夏天炎暑之季，或南方温热之域，剂量一般宜轻，且要中病即止。(2) 若冬季气候寒冷，或素体阳虚之人，剂量可适当增加。(3) 若阴寒太盛，或真寒假热，服药入口即吐者，此为格拒，可少佐苦寒或咸寒之品，或冷服，以免格拒不纳。



## ◎补益剂

补益剂用于虚证，而虚证有气虚、血虚、阴虚、阳虚之分，或兼而有之，如肺虚之症有阴有阳；肾虚可导致肝虚；补脾则可养胃；壮水可以滋肝等。故补益剂应结合病症，综合考虑。凡由补益药物为主组成，具有补虚扶弱功效，调补人体气血阴阳不足，增强人体机能，用以治疗各种虚证的制剂，统称为补益剂，如四君子汤、四物汤、参苓白术汤、六味地黄汤、肾气丸等。**使用补益剂的注意事项：**(1) 依据虚证程度选择峻补固脱，恢复元气，或平补调养。(2) 凡病邪未尽，正气尚盛不宜用补益剂。(3) 阴虚火旺者不宜用补气、补阳剂，因药味多辛燥，易致助火伤阴。(4) 阳虚阴盛者不宜用补阴补血剂，因药性多寒凉滋腻，易致助湿伤阳。

## ◎安神剂

心神不宁源于两个方面：一是心血不足，心神失养所致的虚证，症状为失眠，精神恍惚，惊悸健忘；二是心肝火盛的实证，症状为神志不宁，失眠多梦，惊狂烦躁。由重镇安神或滋阴安神的药物为主组成，具有安神定志，治疗神志不安的制剂均属安神剂，如

安神丸、天王补心丹、甘麦大枣汤等。**使用安神剂的注意事项：**(1) 一些安神剂由金石类药物组成，此类药物易伤胃气，不宜久服。(2) 对脾胃虚弱者，可配合服用健脾和胃之品。(3) 一些安神药，如朱砂等具有一定毒性，久服能引起慢性中毒，亦应注意。

## ◎开窍剂

凡用芳香开窍药为主组成，具有开窍醒神作用，治疗神昏窍闭之证的方剂，统称开窍剂。如紫雪丹、至宝丹、苏合香丸等。**使用开窍剂的注意事项：**(1) 对于汗出肢冷，口开目合的脱证，不宜使用。(2) 对于阳明腑实证而见神昏谵语者，不宜使用。(3) 开窍剂多为芳香药物，其性辛散走窜，久服易伤元气，所以多用于急救，中病即止，不可久服。(4) 一些药物，如麝香等，有碍胎元，孕妇慎用。(5) 本类方剂多为散剂、丸剂，宜温开水化服或鼻饲，不宜加热煎煮，以免药性挥发，影响疗效。

## ◎固涩剂

凡以固涩药为主组成，具有收敛固涩作用，以治疗气、血、精、津液耗散滑脱之证的方剂，统称固涩剂，如玉屏风散、四神丸、金锁固精丸、完带汤等。**使用固涩剂的注意事项：**(1) 固涩剂为正虚无邪者设，所以凡外邪未去，误用固涩，则有“闭门留寇”之弊，转生他变。(2) 对于实邪所致的热病多汗，火扰遗泄，热痢初起，食滞泄泻，实热崩带等，不宜使用。

## ◎理气剂

理气剂具有疏畅气机、调理脏腑功能的作用。凡以理气药物为主组成，用以治疗气滞、气逆之证的制剂，统称理气剂，如越鞠丸、半夏厚朴汤、定喘汤、苏子降气汤等。**使用理气剂的注意事项：**理气剂的组成多属辛温香燥之品，容易耗气伤阴，应适可而止，勿使过度。对气虚、阴虚的患者慎用。



## ◎理血剂

凡以理血药为主组成，具有活血化瘀或止血作用，治疗瘀血和出血证的方剂，统称理血剂，如丹参饮、血府逐瘀汤、补阳还五汤、小蓟饮子、胶艾汤等。**使用理血剂的注意事项：**(1) 使用活血化瘀方剂时，辅以扶正之品，使化瘀而不伤正。(2) 使用止血剂时，应辨明出血原因。(3) 出血兼有瘀滞者，配以活血之品，以防血止瘀留。(4) 活血祛瘀剂性多破泄，月经过多者及孕妇慎用。

## ◎治风剂

治风剂具有祛风邪，解痉定惊，疏散外风或平息内风作用。以辛散祛风或息风止痉的药物组成，用以治疗风病的制剂，统称为治风剂，如消风散、川芎茶调散、镇肝熄风汤、大定风珠等。**使用治风剂的注意事项：**(1) 属于外风，治宜疏散，不宜平熄。(2) 属于内风，则宜平熄，忌用辛散。

## ◎治燥剂

凡以轻宣辛散或甘凉滋润的药物为主组成，具有轻宣外燥或滋阴润燥等作用，以治疗燥证的方剂，统称治燥剂，如桑杏汤、杏苏散、养阴清肺汤、麦门冬汤等。**使用治燥剂的注意事项：**(1) 燥邪最易化热，伤津耗气，所以有时配伍清热泻火或生津益气之品。

(2) 平时避免服辛香耗津，苦寒化燥之品。



## ◎祛湿剂

凡以祛湿药物为主组成，具有化湿行水，通淋泄浊作用，治疗水湿病证的一类方剂，统称为祛湿剂，如藿香正气散、三仁汤、五苓散、苓桂术甘汤、平胃散等。**使用祛湿剂的注意事项：**祛湿剂多由芳香温燥或甘淡渗利之药组成，易于耗伤阴津，所以对于



素体阴虚津亏，病后体弱，以及孕妇等，均应慎用。

## ◎祛痰剂

咳、痰、喘的病因复杂，凡内伤外感，五脏之病均能引起。祛痰剂具有化痰平喘作用，以化痰、祛痰为主药物组成，能够促进痰的排泄，或能消除引发致痰的原因，用于治疗诸多痰病的制剂，均称祛痰剂，如二陈汤、清气化痰丸、贝母瓜蒌散、三子养亲汤、止嗽散等。**使用祛痰剂的注意事项：**(1) 常配合理气药。(2) 有咳血倾向者，不宜用燥烈之剂，以免引起大量咯血。(3) 表邪未解或痰多者，慎用滋润之品，以防病久不愈。

## ◎消导剂

积滞郁结之症，多由气、血、痰、湿、食壅滞郁结所致，应使用消导剂。由消导药为主组成，具有消食导滞，化积消导作用，治疗食积痞块的制剂，统称为消导剂，如保和丸、健脾丸、枳实消痞丸等。**使用消导剂的注意事项：**(1) 消导剂多属消缓散之剂，适用于病势较缓，病程较长者。(2) 消导剂属克削之品，一般不宜久用，消积即止。(3) 对气虚中满及阴虚热病，纯虚无实之症，自当禁用。

## ◎驱虫剂

凡以驱虫药物为主组成，具有驱虫或杀虫等作用，用于治疗人体寄生虫病的方剂，统称为驱虫剂，如乌梅丸、肥儿丸等。**使用驱虫剂的注意事项：**(1) 要空腹服，忌油腻。(2) 一些驱虫药有毒性，易伤正气，甚至中毒，所以要掌握剂量。(3) 有些驱虫药具有攻伐之力，年老体弱者以及孕妇要慎用。(4) 服驱虫药后，要注意调理脾胃。

## ◎涌吐剂

凡以涌吐药物为主组成，具有涌吐痰涎、宿食、毒物等作用，以治疗痰厥、食积、误食毒物的方剂，统称为涌吐剂，如瓜蒂散、盐汤探吐方等。**使用涌吐剂的注意事项：**(1) 涌吐剂作用迅猛，易伤胃气，应中病即止，年老体弱、孕妇、产后均宜慎用。(2) 若服后呕吐不止者，可服姜汁少许，或服用冷粥、冷开水以止之。