



◎ 丛书主编 任志鸿



高中同步

# 导学大课堂

——配新课标人教版——

# 化学

(选修) 化学反应原理



丛书主编 任志鸿  
本册主编 张丽萍 聂瑞连  
副 主 编 于巧英 田成英 何树领

高中同步

# 导学大课堂

配新课标人教版

化学

(选修) 化学反应原理

图书在版编目(CIP)数据

高中同步导学大课堂·化学·化学反应原理·选修·人教版/任志鸿主编。  
—北京:华文出版社,2006.3  
(志鸿导学系列丛书)  
ISBN 7-5075-2006-4

I. 高... II. 任... III. 化学课·高中·教学参考资料 IV. G634

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 020692 号

装帧设计:邢丽

责任编辑:方明亮 赵连荣

策划:杨方林

华文出版社 出版

(邮编:100055 北京市宣武区广安门外大街 305 号 8 区 5 号楼)

网址:<http://www.hwcbs.com.cn>

网络实名:华文出版社

电子信箱:hwcbs@263.net

电话:010—63370154

山东滨州明天印务有限公司印刷

山东世纪天鸿书业有限公司总发行

890×1240 16 开本 印张:60.25 字数:2507 千字

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

全套定价:90.50 元

(如有印装质量问题请与承印厂调换)

美国有个叫摩根的人，善于引导学生学习，他把教材内容精心设计成各种鲜活的问题，让学生尝试着自己去做。结果，学生不仅学得好，而且乐意学，后来他成了美国著名的教育家。近年来，“洋思中学”的名字几乎响彻了中国大地，在这个学校，老师让学生通过解决问题的方式来掌握知识，形成能力，学生们进步很快。这里，我们无暇深刻探讨摩根的教育思想和洋思中学的课改经验，但这里所包含的一个深刻的道理对我们很有启发意义，通过自己思索探究的知识，要比老师直接灌输的深刻得多。

目前围绕新课标教材编写的教辅书琳琅满目，但内容大同小异，真正“编”出特色和新意的并不多见。教辅书就如同您身边的老师，他能告诉您解题的思路和方法、答题的步骤、推演的结果，帮助您理解知识、学会运用和提升能力。但这也正如课堂教学一样，不同的授课方式，就有不同的效果。好的授课方式能使您记忆犹新，轻松乐学，事半功倍。基于这种思考，我们深入研究了最新的课改方向和高考动态，汇集了最先进的教研成果及课标教材使用情况，全力打造一套完全体现新课标理念，透彻解读高中新课标教材，重在培养学生学科素养和学习能力的全新式助学用书——导学大课堂新课标版。

本丛书按照“教材知识问题化，基本知识能力化”的编写思路，将“导学”与“学案”特点并重凸显，力图体现这样的理念：一是立足于学生自主学习、自主探究，以学案方式将教材内容问题化，使学生通过解决一系列问题尽快提升自己的学习能力。二是重在方法立说和学法指导，目的是教会学生学习——会读、会记、会想（思）、会练（做），最终达到会考的目的。丛书主体栏目在对教材的处理上，采用大单元、小课时（或节）的编写模式，努力做到逻辑严密、内容丰实、形式创新、方法灵活，做到与课堂教学同步，起到堂堂达标、单元过关的作用。

## *Foreword*

**本丛书具有以下特点：**

深入挖掘教材的基础知识和基本能力点，梳理知识间的内在联系，将零散、孤立的知识交汇、编制成具有系统性、条理性的网络结构，便于学生学习、记忆、检索、提取和应用。

本丛书内容及难度贴近学生的实际水平，贴近学生的认知心理。各科内容以本学科为核心，将触角伸向其他学科和现实社会，联系当前生产和生活实际，拓展学生的认知领域和思维空间，提高知识运用技能并激活潜在的智力因素。

本丛书遵循由浅入深、由易到难的原则，例题和练习题设置科学、注重梯度，能够兼顾不同层面和水平的学生，既让一般学力水平的学生“吃好”，又能使学有余力的学生“吃饱”。尊重个体，照顾差异，是现代教育理念下人本思想的重要体现。

总之，本丛书以超前的设计思想和编写理念，在突出核心栏目的基础上彰显学科特点，在栏目组合、体例设置、布局谋篇上形成各自独特的风格，使各科分册异彩纷呈、百花争艳，自然和谐地组成一个有机的整体。

诚然，我们还不成熟，我们正在成长；因为成长，我们才具有生命力！因为成长，我们需要大家的呵护！请把您使用过程中发现的欠缺和不足记录下来并告诉我们，我们会虚心倾听，努力改进。我们一直真诚期待着，期待着我们之间真诚的交流。

编者  
2006年3月

# 目录

MU LU

<b>第一章 化学反应与能量</b> .....	1
第一节 化学反应与能量的变化 .....	1
第二节 燃烧热 能源 .....	6
第三节 化学反应热的计算 .....	11
<b>第二章 化学反应速率和化学平衡</b> .....	20
第一节 化学反应速率 .....	20
第二节 影响化学反应速率的因素 .....	25
第三节 化学平衡 .....	32
第四节 化学反应进行的方向 .....	38
<b>第三章 水溶液中的离子平衡</b> .....	48
第一节 弱电解质的电离 .....	48
第二节 水的电离和溶液的酸碱性 .....	53
第三节 盐类的水解 .....	57
第四节 难溶电解质的溶解平衡 .....	63
<b>第四章 电化学基础</b> .....	74
第一节 原电池 .....	74
第二节 化学电源 .....	78
第三节 电解池 .....	83
第四节 金属的电化学腐蚀与防护 .....	90
<b>参考答案</b> .....	99



# 第一章 化学反应与能量

## 本章要览

### 内容提要

物质和能源是制约国民经济和社会发展的“双刃剑”。通过本章的学习，可进一步认识化学能在人们生活、工农业生产、国防科学中的重要地位。现实社会中，能源短缺及开发新能源，都是我们应该勇敢面对、积极参与的。我们应该节约现有能源、增强节能意识，努力提高能源的利用率。

化学反应一定伴随着物质变化和能量变化，也就一定遵循质量守恒定律和能量守恒定律。在学习物质性质和结构的基础上，本章着重讨论热能、能量的释放或吸收是以所发生变化的物质为基础的，是与发生变化的物质的物质的量密切相关的。盖斯定律是能量守恒定律的又一应用，深刻揭示了物质的状态与能量变化间的关系。

### 学法指导


1. 注重新旧知识间的联系，通过对必修课程相关知识的复习，把新旧知识结合起来，做到“温故知新”。
2. 学会利用教材提供的图示、图表、表格等形象化媒介。把抽象的概念具体化，加深对教材知识的理解，力求做到“抽象问题具体化”。
3. 密切联系实际，联系生活。借助生活常识中的实例加深对知识的理解和把握。

## 第一节 化学反应与能量的变化



### 案例探究

下图是一种“即热饭盒”的结构示意图，这种饭盒携带方便，可随吃随用，使用起来非常方便。常被用于野外郊游。进餐时撤去底部的厚纸板，几分钟后，由于在铁粉的催化作用下，镁粉很容易跟水发生反应，反应的方程式为： $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + H_2 \uparrow$ ，放出大量的热，反应提供的热量使饭菜变热，人们就可以进食了。



即热饭盒的结构

#### 问题与讨论：

1. 为什么要加入铁粉？在该反应中铁粉的

作用是什么？

2. 实际上，该过程构成了原电池，试分析该原电池的阴极、阳极，并写出各个电极上发生的电极反应方程式。

3. 铁粉还可以用什么物质代替？试写出几种替代物质，并对该替代物质的性质做一总结。

实际上，医用即热式加热棒（用于打点滴时对药液的加热）的原理与该饭盒结构和原理相似。一般由铁粉、碳粉和水构成，使用前隔绝空气。若使用时，把外层塑料膜撕开即可，然后缠绕在吊瓶的输液管上，即可起到对药液加热的作用。



### 自学导引

#### 1. 化学变化与能量

(1) 化学反应过程中，不仅有物质的变化，还

有能量的变化，这种能量变化常以 \_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_等形式表现出来。当能量以热的形式表现时，我们把反应分为 \_\_\_\_和 \_\_\_\_。

(2) 化学反应过程中同时存在着 \_\_\_\_ 和 \_\_\_\_ 的变化。能量的释放或吸收是以 \_\_\_\_为基础的，二者密不可分，但以 \_\_\_\_为主。能量的多少则以 \_\_\_\_为基础。

### 2. 反应热，焓变

(1) \_\_\_\_\_，叫反应热，又称为 \_\_\_\_，符号用 \_\_\_\_ 表示，其单位常采用 \_\_\_\_\_。

#### (2) 化学反应中能量变化的原因

化学反应的本质是 \_\_\_\_\_。

任何化学反应都有反应热，这是由于在化学反应过程中，当反应物分子间的化学键 \_\_\_\_\_ 时，需要 \_\_\_\_\_ 的相互作用，这需要 \_\_\_\_\_ 能量；当 \_\_\_\_\_，即新化学键 \_\_\_\_\_ 时，又要 \_\_\_\_\_ 能量。

#### (3) 吸热反应和放热反应


如果反应完成时，生成物释放的总能量比反应物吸收的总能量 \_\_\_\_\_，这是 \_\_\_\_。对于放热反应，由于反应后放出能量（释放给环境）而使反应体系的能量 \_\_\_\_。因此，规定放热反应的  $\Delta H$  为“ \_\_\_\_\_”。

反之，对于吸热反应，由于反应通过 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 等吸收能量（能量来自环境）而使反应体系的能量 \_\_\_\_。因此，规定吸热反应的  $\Delta H$  为“ \_\_\_\_\_”。

当  $\Delta H$  为“ \_\_\_\_\_”或  $\Delta H < 0$  时，为放热反应；

当  $\Delta H$  为“ \_\_\_\_\_”或  $\Delta H > 0$  时，为吸热反应。

(4) 请根据下列信息分析氢气燃烧生成水蒸气时，为什么会发生能量变化？




### 3. 热化学方程式

(1) \_\_\_\_\_ 叫热化学方程式。热化学方程式不仅表明了化学反应中的 \_\_\_\_\_ 变化，也表明了化学反应中的 \_\_\_\_\_ 变化。

(2) 热化学方程式各物质前的化学计量数只表示 \_\_\_\_\_，不表示 \_\_\_\_\_，因此，它可以是 \_\_\_\_\_ 数，也可以是 \_\_\_\_\_ 数。对于相同物质的

反应，当化学计量数不同时，其  $\Delta H$  \_\_\_\_\_。

(3) 请解释下述热化学方程式表示的含义。



$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

若将此化学方程式中各物质的化学计量数均乘以 2，热化学方程式应如何写？



### 疑难剖析

#### 一、放热反应与吸热反应

反应是吸热还是放热取决于反应物和生成物所具有的总能量的相对大小。

【例 1】下列说法正确的是 ..... ( )

A. 需要加热方能发生的反应一定是吸热反应

B. 放热的反应在常温下一定很容易发生

C. 反应是放热的还是吸热的必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小

D. 吸热反应在一定的条件下也能发生

解析：化学反应的能量变化主要表现为吸热或放热。反应是放热还是吸热主要取决于反应物和生成物所具有的总能量的相对大小。放热反应和吸热反应在一定的条件下都能发生。反应开始时需要加热的反应可能是吸热反应，也可能放热反应。吸热反应开始加热，反应后需不断加热才能使反应继续进行下去；放热反应开始加热，反应后会放出一定的热量，如果此热量足够大可使反应维持下去，则反应过程不需要再加热，如煤的燃烧，一旦加热使煤燃烧起来后就可继续燃烧下去，不需外界再加热。

答案：CD

#### 友情提示

反应是吸热还是放热与反应开始是否需要加热无关。

【例 2】在相同温度和压强下，将等质量的硫分别在足量的纯氧气中、空气中燃烧，设前者放出的热量为  $Q_1$ ，后者放出的热量为  $Q_2$ ，则  $Q_1$  和  $Q_2$  相对大小判断正确的是 ..... ( )

A.  $Q_1 = Q_2$

B.  $Q_1 > Q_2$

C.  $Q_1 < Q_2$

D. 无法判断

解析：从硫在空气中燃烧比在纯氧气中的火焰明亮度差、剧烈程度缓和，可知硫在纯氧气中

燃烧速率更快,发光更强。相等质量的硫燃烧放出的能量(在相同条件下)是一定的,而发光、发热均是能量的体现形式。根据总能量一定,发光越多,则转化为热能的部分就越少,所以等质量的硫在空气中燃烧放出的热量要比在纯氧气中燃烧放出的热量多。

答案:C

### 友情提示

化学反应过程中,通常伴有能量的变化,能量的体现形式有多种方式,所以说热能不是唯一的形式,而仅是最常见的形式。

## 二、化学反应中的能量变化

物质发生化学反应都伴随着能量变化(包括光、电、热等)。

- 【例3】下列说法正确的是………( )
- 物质发生化学反应都伴随着能量变化
  - 伴有能量变化的物质变化都是化学变化
  - 在一个确定的化学反应关系中,反应物的总能量与生成物的总能量一定不同
  - 在一个确定的化学反应关系中,反应物的总能量总是高于生成物的总能量

解析:物质发生化学反应都伴随着能量的变化,伴有能量变化的物质变化不一定是化学变化,物质发生物理变化、核变化(如原子弹的爆炸)也都伴有能量变化。在一个确定的化学反应关系中,反应物的总能量(设为x)与生成物的总能量(设为y)之间的关系为:①x>y,化学反应为放热反应;②x<y,化学反应为吸热反应;③x≠y。

答案:AC


### 友情提示

该题主要考查对化学反应中的能量变化的理解与应用。


## 三、热化学方程式

书写热化学方程式及判断其正误,要特别注意反应物和生成物的聚集状态; $\Delta H$ 的正负以及 $\Delta H$ 的值与化学计量数的对应关系。


- 【例4】已知在25℃、101 kPa下,1 g C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>(辛烷)燃烧生成二氧化碳和液态水时放出48.40 kJ的热量。表示上述反应的热化学方程式正确的是………( )




$$\Delta H = -48.40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta H = -5518 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta H = +5518 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta H = -48.40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

解析:在25℃、101 kPa下,1 mol C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>燃烧生成CO<sub>2</sub>和液态水时放出的热量为 $\frac{48.40 \text{ kJ}}{1 \text{ g}} \times 114 \text{ g} = 5518 \text{ kJ}$ 。由于在判断热化学方程式时应注明以下几点:①标明各物质的状态,A中H<sub>2</sub>O的状态标错,A不正确;②标明反应是吸热还是放热, $\Delta H > 0$ 时为吸热反应, $\Delta H < 0$ 时为放热反应,C错;③热量数值要与化学计量数相对应,显然D错。

答案:B

### 友情提示

热化学方程式正误的判断可从状态、 $\Delta H$ 正负号、数值及物质的量等主要方面入手。




## 拓展迁移

### 拓展点一:用化学键键能的大小可粗略计算化学反应的热效应

1. 由键能求反应热的公式为 $\Delta H = \text{反应物的键能总和} - \text{生成物的键能总和}$ 。


2. 生成物分子形成时释放的总能量比反应物分子断裂时吸收的总能量大,即为放热反应。由于反应后放出的热量使反应体系的能量降低,故规定 $\Delta H$ 为“-”,上例中 $\Delta H = -183 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,即表示1 mol H<sub>2</sub>与1 mol Cl<sub>2</sub>生成2 mol HCl时放出183 kJ的能量。反之,即为吸热反应。由于吸热反应要通过加热、光照等吸收能量,而使反应体系的能量升高,故规定 $\Delta H$ 为“+”。



即当 $\Delta H$ 为“-”或 $\Delta H < 0$ 时,为放热反应;

当 $\Delta H$ 为“+”或 $\Delta H > 0$ 时,为吸热反应。

例:1 mol H<sub>2</sub>和1 mol Cl<sub>2</sub>反应生成2 mol HCl的能量转化关系如图:

 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$  反应的能量变化示意图

由上图看出,  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$  的反应热, 数值上应等于生成物分子形成时所释放的总能量 ( $862 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) 与反应物分子断裂时所吸收的总能量 ( $679 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) 的差, 即放出了  $183 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  的能量。

### 拓展点二: 体系与环境

1. 体系: 被研究的物质系统称为体系。

2. 环境: 体系以外的其他部分称为环境

能量在体系和环境中的转化: 在化学反应中, 从反应物分子改变为生成物分子, 各原子内部并没有多少变化, 但原子间的结合方式发生了改变。在这个过程中, 反应物中的化学键部分或全部遭到破坏, 生成物分子中新化学键形成了。破坏旧键的能量来自于环境; 同样, 在形成新化学键的同时键放出能量。释放出的能量从体系进入环境。

### 拓展点三: 可逆反应的热化学方程式与一般热化学反应方程式的区别。

例如: 合成氨反应的化学方程式为  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ , 而该反应的热化学方程式为  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H = -92.38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 热化学方程式要标注反应式中各物质的状态, 反应热的变化, 用  $\Delta H$  表示。热化学方程式中物质前的化学计量数代表参加反应的物质的物质的量, 因此可用分数表示。




### 自我检测

#### 基础达标

- 吸热反应一定是 ..... ( )
  - 反应物总能量等于生成物总能量
  - 反应物总能量高于生成物总能量
  - 反应物总能量低于生成物总能量
  - 反应物总能量和生成物总能量的大小关系应视具体反应而定

- 下列说法正确的是 ..... ( )
  - 在化学反应中发生物质变化的同时, 不一定发生能量变化
  - $\Delta H > 0$  表示放热反应,  $\Delta H < 0$  表示吸热反应
  - $\Delta H$  的大小与热化学方程式中化学计量数无关
  - 生成物释放的总能量大于反应物吸收的总能量时,  $\Delta H < 0$
- 下列物质加入水中显著放热的是 ... ( )
  - 固体 NaOH
  - 生石灰
  - 无水乙醇
  - 固体  $\text{NH}_4\text{NO}_3$
- 一定质量的无水乙醇完全燃烧时放出的热量为  $Q$ , 它所生成的  $\text{CO}_2$  用过量饱和石灰水完全吸收可得  $100 \text{ g CaCO}_3$  沉淀。则完全燃烧  $1 \text{ mol}$  无水乙醇时放出的热量是 ..... ( )
  - $0.5Q$
  - $Q$
  - $2Q$
  - $5Q$
- 在同温同压下, 下列各组热化学方程式中  $Q_2 > Q_1$  的是 ..... ( )
  - $2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -Q_1$ ;  
 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -Q_2$
  - $\text{S}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -Q_1$ ;  
 $\text{S}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -Q_2$
  - $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H = -Q_1$ ;  
 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -Q_2$
  - $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H = -Q_1$ ;  
 $\frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H = -Q_2$
- 右图是一个简易测量物质反应是吸热还是放热的实验装置, 利用此装置可以很方便地测得某反应是放热反应还是吸热反应。请根据装置回答下列问题:
  - 将铝片加入小试管内, 然后注入足量的盐酸, 有关反应的离子方程式是 \_\_\_\_\_, 试管中看到的现象是 \_\_\_\_\_。
  - S形导管中液面 A \_\_\_\_\_(填“上升”或“下降”), 原因是 \_\_\_\_\_; 说明此反应是 \_\_\_\_\_(填“放热”或“吸热”)反应。
- 298 K、101 kPa 时, 合成氨反应的热化学方程式为  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H =$



$-92.38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。在该温度下,取1 mol  $\text{N}_2(\text{g})$ 和3 mol  $\text{H}_2(\text{g})$ 放在一密闭容器中,在催化剂存在情况下进行反应,测得反应放出的热量总是少于92.38 kJ,其原因是什么?



8.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液和 $\text{KOH}$ 溶液反应时有热量放出,并已知反应物的总能量为 $E_1$ ,生成物的总能量为 $E_2$ ,试回答下列问题:

(1)用离子方程式表示中和反应的实质 \_\_\_\_\_。

(2)判断 $E_1$ 和 $E_2$ 的大小关系: $E_1$  \_\_\_\_\_  $E_2$ 。

9. 家用液化气的主要成分之一是丁烷,当1000 g丁烷完全燃烧并生成二氧化碳和液态水时,放出热量为 $5 \times 10^5 \text{ kJ}$ ,试写出丁烷燃烧反应的热化学方程式 \_\_\_\_\_. 已知1 mol液态水汽化时需要吸收44 kJ的热量,则1 mol丁烷完全燃烧并生成气态水时放出的热量为 \_\_\_\_\_. kJ。

10. 根据下列图式,写出反应的热化学方程式。



### 更上一层

11. 欲使煤在煤炉内充分燃烧,下列可行的措施是 ..... ( )


- A. 向炉内喷吹空气
- B. 把块状煤碾成粉末
- C. 使用 $\text{MnO}_2$ 作催化剂
- D. 增加炉内燃烧温度

12. 下列反应既是氧化还原反应,又是吸热反应的是 ..... ( )

- A. 铝片与稀 $\text{H}_2\text{SO}_4$ 反应
- B.  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 与 $\text{NH}_4\text{Cl}$ 的反应
- C. 灼热的炭与 $\text{CO}_2$ 反应
- D. 甲烷在 $\text{O}_2$ 中的燃烧反应

13. 如右图所示,把试管

放入盛有25 ℃时饱和石灰水的烧杯中,试管中开始放入几小块镁片,再用滴管滴入5 mL盐酸于试管中。试回答下列问题:



(1)实验中观察到的现象是 \_\_\_\_\_。

(2)产生上述现象的原因是 \_\_\_\_\_。

(3)写出有关反应的离子方程式: \_\_\_\_\_。

(4)由实验推知, $\text{MgCl}_2$ 溶液和 $\text{H}_2$ 的总能量 \_\_\_\_\_(填“大于”“小于”或“等于”)镁片和盐酸的总能量。

14. 2.3 g某液态有机物和一定量的氧气混合点燃,恰好完全燃烧,生成2.7 g水和2.24 L $\text{CO}_2$ (标准状况)并放出68.35 kJ热量,则该反应的热化学方程式为 \_\_\_\_\_。

15. 已知破坏1 mol  $\text{N}\equiv\text{N}$ 键、 $\text{H}-\text{H}$ 键和 $\text{N}-\text{H}$ 键分别需吸收的能量为946 kJ、436 kJ、391 kJ。计算1 mol  $\text{N}_2(\text{g})$ 和3 mol  $\text{H}_2(\text{g})$ 完全转化为 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的反应热的理论值。

## 第二节 燃烧热 能源



### 案例探究

在讨论有关燃料充分燃烧的条件时,有两种意见:甲同学认为,空气越多越好;乙同学认为,空气足量即可。从燃料燃烧条件看,空气越多,燃料燃烧越充分。但由于空气中含有大量不参加反应的N<sub>2</sub>,太多的空气反而带走了大量的热而导致热能利用率降低。所以并不是空气越多一定越好,而是有一个度,即恰好满足反应比,如:2H<sub>2</sub>+O<sub>2</sub>=2H<sub>2</sub>O,V(O<sub>2</sub>):V(H<sub>2</sub>)=1:2即可。

#### 问题与讨论:

1. 燃烧的条件是什么?是否一定要有氧参与?
2. 燃料充分燃烧,是否燃料的利用率一定最高?
3. 如何既能使燃料充分燃烧,又能使得燃料的利用率最高?

我们在讨论如何合理利用燃料、设计锅炉或其他燃器具时,一定要注意从多角度综合考虑,不能只考虑燃料的燃烧而忽略热量的利用率,从而实现热量的充分利用。比如我们在设计煤气灶具时,应该按照燃料与空气的最佳配比设计燃料进气阀门和空气进气孔的尺寸。



### 自学导引

#### 1. 燃烧热

(1) 反应热可分为\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,其中以跟\_\_\_\_\_相关的\_\_\_\_\_实际应用较广。

\_\_\_\_\_,叫做该物质的燃烧热。单位为\_\_\_\_\_.燃烧热通常可利用仪器由实验测得。

(2) 选择燃料应从物质的燃烧热、燃料的\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,对\_\_\_\_\_的影响等方面综合考虑。

#### 2. 能源

(1) 能源就是能提供\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_,它包括化石燃料、\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_以及柴草等。化石燃料包括\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_以及柴草等。化石燃料包括\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

#### (2) 我国目前的能源利用状况

① 我国目前使用的重要能源是\_\_\_\_\_,它们的蕴藏量\_\_\_\_\_,而且不能\_\_\_\_\_,最终将会\_\_\_\_\_。

② 基于我国目前的\_\_\_\_\_水平和\_\_\_\_\_水平,能源从开采、运输、加工到终端的利用效率都\_\_\_\_\_,浪费\_\_\_\_\_.据统计,总效率仅为\_\_\_\_\_。

#### (3) 解决方法

##### ① 提高现有能源的利用率

加强\_\_\_\_\_投入,提高\_\_\_\_\_水平,改善开采、运输、加工等各个环节,科学地控制燃烧反应,使燃料\_\_\_\_\_燃烧,提高能源的\_\_\_\_\_。

##### ② 开发新的能源

现在探索的新能源主要有\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,地热能、海洋能和生物质能等。它们的特点是资源\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_再生,\_\_\_\_\_污染或\_\_\_\_\_污染。



### 疑难剖析

#### 一、燃烧热

燃烧热是指1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物所放出的热量。常由热化学方程式求燃烧热。

1. 燃烧热一般是由实验测得。物质燃烧时放出的热量多少与外界条件(如温度、压强)有关(如果未注明条件,就是指25℃、101 kPa时的热量),还与反应物和生成物的聚集状态有关。

2. 定义中“1 mol物质”是指1 mol纯净物(单质或化合物)。

3. 定义中“完全燃烧生成稳定的氧化物”是指单质或化合物燃烧后变为最稳定的氧化物。如碳燃烧可生成一氧化碳或二氧化碳,而这里是指全部转化为二氧化碳才是稳定的氧化物。

4. 因为物质燃烧都是放热反应,所以表达

物质燃烧热时的  $\Delta H$  均为负值, 即  $\Delta H < 0$ 。

5. 燃烧热是以 1 mol 可燃物为标准进行测量的, 因此在书写燃烧热的热化学方程式时, 其他物质的化学计量数可用分数表示。

**【例 1】**由氢气和氧气反应生成 1 mol 水蒸气放热 241.8 kJ, 该反应的热化学方程式为  
\_\_\_\_\_。若 1 g 水蒸气转化为液态水放热 2.444 kJ, 则氢气的燃烧热为  
kJ · mol<sup>-1</sup>。

解析: 18 g 水蒸气变成液态水, 放热 2.444 kJ × 18 ≈ 44 kJ, 则氢气燃烧生成 1 mol 液态水共放热为 241.8 kJ + 44 kJ = 285.8 kJ。

答案:  $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(l) \quad \Delta H = -241.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  285.8

#### 友情提示

①燃烧热是 1 mol 可燃物完全燃烧时放出的热量。②对氢气来说燃烧热应是生成液态水所放出的热量。

## 二、能源的充分利用和新能源的开发

化石燃料是有限的, 而其燃烧产物会造成环境污染, 破坏地球的生态环境, 因此人们要不断提高工艺来充分利用有限的化石燃料, 减少污染物的排放, 还要不断探索新能源。例如氢能、太阳能、地热能、潮汐能等。

**【例 2】**我国锅炉燃煤采用沸腾炉逐渐增多, 采用沸腾炉的好处在于………( )

- A. 增大煤炭燃烧时的燃烧热
- B. 减少炉中杂质气体(如 SO<sub>2</sub> 等)的形成
- C. 使得化学反应更容易进行
- D. 使得燃料燃烧充分, 从而提高燃料的利用率

解析: 燃煤采用沸腾炉可增大燃煤与空气的接触面, 使之燃烧充分, 提高燃烧效率。

答案:D

#### 友情提示

减少 SO<sub>2</sub> 的排放量可在燃烧中掺入生石灰(或石灰石), 因发生反应: CaO + SO<sub>2</sub> → CaSO<sub>3</sub>, 使 SO<sub>2</sub> 被吸收。

**【例 3】**利用储能介质储存太阳能的原理是: 白天在太阳光照射下某种固态盐被熔化(实际上是盐溶于自身的结晶水)吸收能量; 晚间熔盐释放相应能量而凝固, 这样使室温得以调节。

已知几种盐的熔点及其熔化时能量改变值

如下所示:

盐	熔点/℃	质量(g)数值与相对分子质量相等的盐熔化时吸热/kJ
CaCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	29.0	37.3
Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> · 10H <sub>2</sub> O	32.4	77.0
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> · 12H <sub>2</sub> O	36.1	100.1
Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> · 5H <sub>2</sub> O	48.5	49.7

下列有关说法正确的是………( )

- A. 不应选用 CaCl<sub>2</sub> · 6H<sub>2</sub>O
- B. 可选用 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> · 10H<sub>2</sub>O 和 Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 12H<sub>2</sub>O
- C. 最好选用 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> · 10H<sub>2</sub>O, 它更加经济
- D. 以上皆不宜选用

解析:(1)从提供的四种盐的熔点及熔化时吸收热量的情况来分析, 应考虑其熔点以接近常温为宜, 熔化及凝固时能量变化越大越好(更有利调节室温)。四种盐的熔点均不是很高, 熔化时均能吸收较多热量, 这样从化学原理上讲, 四种盐理论上均可选用, 则选项 A、D 可排除。

(2)从实际出发(屋顶承重越轻越好), 应考虑单位质量的固体盐在熔化时吸热越多越好。再以单位质量盐熔化时吸收热量的情况(Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> · 10H<sub>2</sub>O 为 77.0 kJ ÷ 322 g ≈ 0.24 kJ · g<sup>-1</sup>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 12H<sub>2</sub>O 为 100.1 kJ ÷ 358 g ≈ 0.28 kJ · g<sup>-1</sup>)来看, 两者热量变化值均较大, 且比较接近, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 12H<sub>2</sub>O 的热量变化值略大一些。

(3)从家庭或单位使用的角度, 应是产品丰富、价格便宜的为首选材料。从两种盐的来源来看, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> · 10H<sub>2</sub>O 的俗名为芒硝, 是天然存在的一种物质, 开采方便, 价格便宜; Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 12H<sub>2</sub>O 需人工制取, 其价格相对昂贵一些。

答案: BC

#### 友情提示


储能物质是一类新型材料, 中学教材未涉及, 但从题意不难理解。实际上本题应充分分析题意, 力求把复杂问题简单化, 本题并没有很深的逻辑推理, 所利用的其实是最平常不过的常识。



## 拓展迁移

## 拓展点一：一级能源与二级能源

能源可划分为一级能源和二级能源，自然界中以现成形式提供的能源称为一级能源；需依靠其他能源的能量间接制取的能源称为二级能源。氢气是一种高效而没有污染的二级能源，它可以由自然界中大量存在的水来制取：



- (1) 下列叙述正确的是 ..... ( )
- A. 电能是二级能源
  - B. 水力是二级能源
  - C. 天然气是一级能源
  - D. 焦炉气是一级能源
- (2) 已知  $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{CO}_2(g)$   $\Delta H = -890.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 1 g  $\text{H}_2$  和 1 g  $\text{CH}_4$  分别燃烧后，放出的热量之比约是 ..... ( )
- A. 1 : 3.4
  - B. 1 : 1.7
  - C. 2.57 : 1
  - D. 4.6 : 1

- (3) 关于用水制取二级能源氢气，以下研究方向正确的是 ..... ( )
- A. 构成水的氢和氧都是可以燃烧的物质，因此，可研究在水不分解的情况下，使氢成为二级能源
  - B. 设法将太阳光聚集，产生高温，使水分解产生氢气
  - C. 寻找高效催化剂，使水分解产生氢气，同时释放能量
  - D. 寻找特殊化学物质，用于开发廉价能源，以分解水制取氢气

**解析：**(1) 电能是二级能源，天然气、煤、石油等是一级能源。

(2) 1 g  $\text{H}_2$  完全燃烧生成液态水放出 142.9 kJ 的热量，1 g  $\text{CH}_4$  完全燃烧生成液态水放出 55.6 kJ 的热量。

(3) 水难分解，难以使  $\text{H}_2$  成为二级能源，水分解产生  $\text{H}_2$ ，是吸热过程，不会释放能量。

**答案：**(1) AC (2) C (3) BD

## 拓展点二：选择燃料的标准

考虑：1. 物质的燃烧热；2. 燃料的储量；3. 燃料的开采、运输；4. 燃料储存的条件、价格；5. 燃料对生态环境的影响。

例如：液化石油气中的丙烷，燃烧热值高，地

下石油储量丰富，开采较容易，燃烧时产生  $\text{CO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}$  对环境污染小，缺点是储存、运输不方便。

## 拓展点三：燃烧热与中和热

	燃烧热	中和热
定义	在 101 kPa 时，1 mol 物质完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量	在稀溶液中，酸跟碱发生中和反应生成 1 mol $\text{H}_2\text{O}$ 所放出的热量
标准	1 mol 可燃物	1 mol 水
热化学方程式的书写	以燃烧 1 mol 可燃物为标准来配平其余物质的化学计量数，化学计量数常用分数表示	以生成 1 mol 水为标准来配平其余物质的化学计量数，化学计量数常用分数表示
备注	必须生成稳定的氧化物，如碳燃烧应生成二氧化碳而不是一氧化碳，氢气燃烧应生成液态水而非气态水	强酸和强碱在稀溶液中发生中和反应时， $\Delta H = -57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

## 拓展点四：几种常见物质的热化学方程式



1.  $\text{C(s,石墨)} + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) \quad \Delta H = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
2.  $\text{C(s,金刚石)} + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) \quad \Delta H = -395 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
3.  $\text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
4.  $\text{CO(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) \quad \Delta H = -283 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
5.  $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -890.31 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
6.  $\text{CH}_3\text{OH}(l) + \frac{3}{2}\text{O}_2(g) \rightleftharpoons \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -726.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
7.  $\text{C}_2\text{H}_6(g) + \frac{7}{2}\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -1559.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
8.  $\text{C}_2\text{H}_4(g) + 3\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -1411.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
9.  $\text{C}_2\text{H}_2(g) + \frac{5}{2}\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -1299.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
10.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(l) + 3\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H = -1366.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$



## 自我检测

## 基础达标

- 新的替代能源主要包括………( )  
①核能 ②柴草 ③煤炭 ④太阳能 ⑤氢能 ⑥液化石油气 ⑦水煤气 ⑧天然气  
A. ②③⑥⑦ B. ①④⑤  
C. ③⑥⑦⑧ D. ①②④
- 在相同条件下,燃烧时对大气污染程度最小的是………( )  
A. 液化气 B. 煤油  
C. 煤饼 D. 木柴
- $N_2H_4$ 是一种高效清洁的火箭燃料。0.25 mol  $N_2H_4(g)$ 完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5 kJ热量。则下列热化学方程式正确的是………( )  
A.  $\frac{1}{2}N_2H_4(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2(g) + H_2O(g)$   
 $\Delta H = +267 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
B.  $N_2H_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2H_2O(l)$   
 $\Delta H = -133.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
C.  $N_2H_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2H_2O(g)$   $\Delta H = +534 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
D.  $N_2H_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2H_2O(g)$   $\Delta H = -534 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- 已知在一定条件下,CO的燃烧热为283  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $CH_4$ 的燃烧热为890  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,由1 mol CO和3 mol  $CH_4$ 组成的混合气体在上述条件下充分燃烧,释放的热量为………( )  
A. 2 912 kJ B. 2 953 kJ  
C. 3 236 kJ D. 3 867 kJ
- 天然气、石油、煤等在地球上的蕴藏量是有限的,因此下述说法正确的是………( )  
①可利用电解水的方法得到  $H_2$  作能源  
②可用酒精作能源 ③砍伐树木作能源  
④应开发太阳能、核能等新的能源  
A. ① B. ②和④  
C. ②和③ D. ④
- 已知热化学方程式:  
①  $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(g)$   $\Delta H = -241.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
②  $2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g)$   $\Delta H = -483.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$





则氢气的燃烧热为………( )

- A. 241.8  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
B. 483.6  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
C. 285.8  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$   
D. 571.6  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

- 近20年来,对以氢气作为未来的动力燃料氢能源的研究获得了迅速发展。像电一样,氢是一种需要依靠其他能源如石油、煤、原子能等所释放的能量来制取的能源称为“二级能源”,而存在于自然界的可以提供现成形式能量的能源称为一级能源,如煤、石油、太阳能和原子能等。

- 为了有效发展民用氢能源,首先必须制得廉价的氢气,下列可供开发又较经济且资源可持续利用的制氢气的方法是( )  
A. 电解水  
B. 锌和稀硫酸反应  
C. 光解海水  
D. 以石油、天然气为原料

- 氢气燃烧时耗氧量小,发热量大。已知热化学方程式为




试通过计算说明等质量的氢气和碳燃烧时产生热量的比是\_\_\_\_\_。

- 氢能源有可能实现能源的贮存,也有可能实现经济、高效的输送。研究表明过渡金属型氢化物(又称间充氢化物)是一种优良的储氢物质。在这类氢化物中,氢原子填充在金属的晶格间隙之间,其组成不固定,通常是非化学计量的,如:  $LaH_{2.76}$ 、 $TiH_{1.73}$ 、 $CeH_{2.69}$ 、 $ZrH_{1.98}$ 、 $PrH_{2.85}$ 、 $TaH_{0.78}$ 。已知标准状况下,1体积的钯粉大约可吸附896体积的氢气(钯粉的密度为10.64 g · cm<sup>-3</sup>,相对原子质量为106.4),试写出钯(Pd)的氢化物的化学式\_\_\_\_\_。  
(提示:求吸收氢气后H与Pd的原子个数之比)

8. 101 kPa 时, 1.00 g CH<sub>4</sub> 完全燃烧生成液态水和二氧化碳, 放出 55.6 kJ 的热量, 写出 CH<sub>4</sub> 燃烧的热化学方程式。



9. 葡萄糖是人体所需能量的重要来源之一。葡萄糖燃烧的热化学方程式为:



葡萄糖在人体组织中氧化的热化学方程式与它燃烧的热化学方程式相同。计算 100 g 葡萄糖在人体中完全氧化时所产生的热量。

### 更上一层

10. 已知 25 ℃、101 kPa 下, 石墨、金刚石燃烧的热化学方程式分别为:



据此判断, 下列说法正确的是 ..... ( )

- A. 由石墨制备金刚石是吸热反应; 等质量时, 石墨的能量比金刚石的低
- B. 由石墨制备金刚石是吸热反应; 等质量时, 石墨的能量比金刚石的高
- C. 由石墨制备金刚石是放热反应; 等质量时, 石墨的能量比金刚石的低
- D. 由石墨制备金刚石是放热反应; 等质量时, 石墨的能量比金刚石的高

11. 已知方程式  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$\Delta H_1 = -571.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 则关于方程式  $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H_2 = ?$  的说法正确的是 ..... ( )

- A. 方程式中化学计量数表示分子数
- B. 该反应  $\Delta H_2$  大于零
- C. 该反应的  $\Delta H_2 = 571.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

D. 该反应可表示 36 g 水分解时的热效应

12. 已知天然气的主要成分 CH<sub>4</sub> 是一种会产生温室效应的气体, 等物质的量的 CH<sub>4</sub> 和 CO<sub>2</sub> 产生的温室效应前者大。下面是有关天然气的几种叙述, 正确的是 ..... ( )

- ① 天然气与煤、柴油相比是较清洁的能源
- ② 等质量的 CH<sub>4</sub> 和 CO<sub>2</sub> 产生的温室效应也是前者大
- ③ 燃烧天然气也是酸雨的成因之一

A. ①②③      B. ①



C. ①和②      D. ③

13. 1 mol 氢气燃烧时约放热 286 kJ, 而 1 kg 汽油燃烧时约放热 46 000 kJ, 氢气被公认为是 21 世纪替代矿物燃料的理想能源, 试简述氢气作为能源的三个主要优点:

- (1) \_\_\_\_\_;
- (2) \_\_\_\_\_;
- (3) \_\_\_\_\_。

14. 家用液化气中主要成分之一是丁烷。在 101 kPa 时, 10 kg 丁烷完全燃烧生成 CO<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub>O(l) 放出热量  $5 \times 10^5 \text{ kJ}$ , 丁烷的燃烧热为 \_\_\_\_\_, 丁烷燃烧的热化学方程式为 \_\_\_\_\_。


15. 某石油液化气由丙烷和丁烷组成, 其质量分数分别为 80% 和 20%。已知



现有一质量为 0.80 kg、容积为 4.0 L 的铝壶, 将一壶 20 ℃ 的水烧开需消耗 0.056 kg 石油液化气, 试计算该燃料的利用率。已知水的比热容为  $4.2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ , 铝的比热容为  $0.88 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ 。



## 第三节 化学反应热的计算




如果你家在上海,想去北京旅游会有多条路线、多种交通工具供你选择,例如:汽车、火车、轮船、飞机等,甚至可以中途替换,但都具有相同的目的,安全到达北京。

不管你采用何种方式到达北京,就你自身位置移动来看,都可看作从上海到了北京,初始位置和末位置不会发生变化。

化学反应中也存在类似规律。

### 问题与讨论:

在化学反应中,只要确定了起始和终了状态,即确定了反应物和生成物,我们可以设置不同的反应(条件)途径,最终达到相同的状态。这一过程中,物质的总能量变化一样吗?不同的化学反应过程中实际消耗的总能量相同吗?




### 盖斯定律

1. 内容:不管化学反应是一步或\_\_\_\_\_完成,其反应热是\_\_\_\_\_的。或者说,化学反应的反应热只与反应体系的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_有关,而与反应的\_\_\_\_\_无关。

2. 解释:能量的释放或吸收是以\_\_\_\_\_的物质为基础的,两者密不可分,但以\_\_\_\_\_为主。而化学反应中的物质变化只由反应体系的\_\_\_\_\_决定,因此,这一过程中的热量变化与反应的具体\_\_\_\_\_无关。

3. 应用:对于进行得\_\_\_\_\_的反应,不容易\_\_\_\_\_的反应,产品\_\_\_\_\_即有\_\_\_\_\_的反应,\_\_\_\_\_反应热有困难,如果应用\_\_\_\_\_,就可以间接地把它们的反应热计算出来。

4. 反应热的计算  
反应热计算的主要依据是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的数据。








### 一、盖斯定律

利用盖斯定律结合已知反应的反应热可以求解一些相关反应的反应热。解此类题关键是善于设计合理的反应过程,适当加减已知方程式及反应热。

利用好盖斯定律,求出所需要的热化学方程式,可更方便比较物质的稳定性大小。

【例 1】1840 年,瑞士化学家盖斯提出了化学反应的热效应仅与反应物的最初状态及生成物的最终状态有关,而与其中间步骤无关。按此规律,结合下述反应方程式,回答问题。

已知:



则第(5)个方程式中的反应热是\_\_\_\_\_。

解析:新的信息是盖斯定律和上述方程式,已有信息是方程式之间可以进行数学运算。新旧信息相结合,即(4)+(3)+(2)-(1)与(5)相比较得反应热是 $+16.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

答案: $+16.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【例 2】1840 年盖斯根据一系列实验事实得出规律,他指出:“若是一个反应可以分步进行,则各步反应的反应热总和与这个反应一次发生时的反应热相同。”这是在各反应于相同条件下完成时的有关反应热的重要规律——盖斯定律。已知金刚石和石墨分别在氧气中完全燃烧的热化学方程式为  $\text{C}(\text{金刚石}, \text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -395.41 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $\text{C}(\text{石墨}, \text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -393.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 则金刚石转化为石墨