

農業生產知識小叢書

番茄的栽培

周榮仁編著

少年兒童出版社



番 茄 的 栽 培

周 荣 仁 編 著

劉 明 等 繪 圖 楊 文 义 裝 頓

*

少 年 兒 童 出 版 社 出

(上海 雜安西 路 1538 号)

上 海 市 書 刊 出 版 經 营 普 可 許 出 零 售

上 海 華 成 印 刷 厂 印 刷 新 華 書 店 上 海 营

*

書 号：自 4004 (高)

开 本 787×1092 耗 2/36 印 张 7/9 字 数

一九五六年五月第一版

一九五六年五月第一次印 刷

印 藏 1—60000

統一書 号：R 10024·1067

定 价：0.08 元

目 錄

一 为什么要种番茄	1
二 番茄是什么样的植物	3
三 怎样來栽培番茄	5
1 选择良种,增加產量	6
2 温床育苗,提早成熟	7
3 做畦栽种,適當密植	14
4 中耕、灌溉,合理施肥	17
5 搭架、整枝,噴射“二四滿”	19
6 保証增產,防治虫害和病害	24
7 分期采收,設置留种區	28

一 为什么要种番茄

夏季天气很热，大家都喜欢多吃水果、蔬菜。可是在这時候，新鮮的水果、蔬菜的種類不多。紅紅、圓圓的番茄，却正好成熟了，怎能叫人不喜爱呢？

番茄可以当做水果一样生吃，也可以用它來煮湯、炒菜，还可以做成番茄醬、番茄汁。吃的方法很多，价格也便宜，是夏季里一种大众化的很好的食物。

我們常常听说，番茄的营养价值很高。那么番茄含有一些什么营养物質呢？

經過科学的分析，知道在番茄果实里，除了水分和糖、酸等物質以外，还含有各种礦物質和維生素。我們人体缺乏礦物質和維生素，就容易發生各种疾病。

維生素甲能促進人体生長，增加抵抗疾病的能力；缺少它，就容易發生夜盲症和干眼病。夜盲症是

在黃昏的時候，眼睛看東西就模糊不清，多吃些水果、蔬菜，就可治好这种病。維生素乙可以帮助消化，增進食欲，預防及治療腳氣病。維生素丙能防止人体發生坏血病。

这三种維生素，番茄果实里都有；而且維生素甲、丙的含量特別多。

礦物質中，番茄主要含有磷和鐵。磷的功用是構成骨骼和人体柔軟組織。人体中也不能缺少鐵，否則就易發生貧血病，因为鐵質的功用是構成血液中的血紅蛋白的。

所以常常吃番茄，对身体的健康会有很多益处。

現在我們的國家，正在迅速地進行社会主义建設。新的工厂、礦區，新的城市，一天天在增加。这些地區对蔬菜的需要，都很迫切。在大面積生產的蔬菜里，栽培番茄有很多优點，不僅它的营养价值大，而且它的產量高，成長也很快。我們知道栽培番茄，有这許多好处；那末，为什么不讓我們多栽培一些 番茄，來滿足人民的需要呢？

二 番茄是什么样的植物

番茄也叫西紅柿、洋柿子、大柿子、六月柿等等。虽然叫它洋柿子或西紅柿，但是它和柿子完全是兩样东西。番茄的花和生長習性同茄子倒是相似的；又因为它是从别的國家傳入到中國來栽种的，所以在最初的時候，人們叫它做番茄。这个名字就一直叫下來。

番茄的莖很柔軟，略帶蔓性；長高了就容易倒伏，須要設立支柱來扶持。在莖上叶柄的基部，常常發生許多幼芽，由這些幼芽長成許多分枝，所以番茄的扶葉很繁茂，須要進行整枝。

在近地面的莖上，我們看到有許多根。因为番茄的莖容易發生許多“不定根”，所以我們也可以剪下一段枝条，把它埋在疏松的土壤里，常常澆水、施肥，就又可以長成一株番茄。

番茄的根，因为先育苗后栽植，主根受到損傷，側根發達起來，所以根群的分布，多半在土壤表層。种番茄的地方，也就要求地勢高，排水好，土層疏松，

土壤肥沃。容易積水的地方种了番茄，就很容易生病、死亡。

花簇着生的位置，是很有趣的。第一个花簇，多半是在生出7—9片叶子以后，才長出來。以后每隔兩、三片叶子，又長出一个花簇。有些品种的番茄，是每隔一片叶子，或者是連續生了兩、三个花簇后，在莖的頂端，長出一个花簇，所以它不能再繼續長高。这种品种的植株都較矮。只要我們注意觀察，就可以使番茄花簇的着生，找出一个規律來。

番茄是喜欢温暖的、还是喜欢低温的植物呢？我們由它在夏天開花結实，就知道它是喜欢温暖气候的。可是它虽怕寒冷，也怕炎熱。華東一帶地區在八、九月里，不是就很少看到番茄的果实嗎？这是因为七、八月里，正是天熱的時候，番茄的花，不是掉落，就是虽然開了花，但也不能受精結成果实。最適宜番茄生長結实的温度，是攝氏溫度計20—25度。如果在10度以下，或35度以上，生長就要停止。

同時，番茄也是一种喜爱陽光的植物。如果生長在陽光少的地方，就会瘦弱細長，果实小，顏色淡，品質差。所以在有樹木遮蔭、陽光不充足的地方种番

茄，是不好的。

为什么在我國北方种番茄，產量会比南方高呢？就是因为北方陰雨天气很少，陽光充足；夏天又不十分炎熱，適合于番茄生長的時間長一些的原故。.

三 怎样來栽培番茄

番茄栽培方法很多。譬如在我國的南方，天氣溫



(圖一)

暖，可以在露天地里播种，露天地里过冬。我國北方，天气寒冷，就不能在露天地里过冬；但是冬天可以在裝玻璃的溫室里栽培（圖一）。而在南京、上海、杭州一帶，農民們都是在早春先在溫床里播种育苗，到了清明節時天气轉暖了，才栽植到露天地里去。這是因為我們的國家，疆域廣大，各个地方的氣候不一样；勤勞的農民，就創造出適合于當地氣候的方法，栽培出又紅又大的番茄來。


現在我們要栽培番茄了，但是該用什么方法，注意些什么問題呢？

1 選擇良種，增加產量

同是一種番茄，其中却有許許多多的種類，我們叫它做品種。顏色有紅的、有黃的；形狀有大的、有小的；成熟時期有早的、有晚的；產量也有高的、有低的。上海的“矮窯大紅”，和南京的“大紅”，都是當地栽培很廣，早熟、丰產的優良品種。可是南京華東農業科學研究所選育成功的“矮紅金”，比它們還要早熟，特別是早期的產量高，一百斤要多出七十到八十斤。如果我們要當水果一樣生吃，“大黃番茄”就很好，果

实很大，肉厚而酸味又少。虽然晚熟，产量也很高。

所以我们在栽培番茄之前，首先要注意选择优良品种。同是一种番茄，种了优良的品种，产量就要高出不少（图二）。



圆红番茄

樱桃番茄

野生番茄


（图二）

2 溫床育苗，提早成熟


因为番茄喜欢温暖，华东地区要在清明节以后，才能在露天地里播种。四月中在露天地里播种，长到六、七月才开花、结实，这时却正是炎热、多雨的时候，开的花会落掉，结成的果实也要开裂，病害的发

生也很嚴重。因此我們就必須提早播種，使它在適于生長的五、六月里（溫度在20到25度左右），開花、結實。但是番茄的種子，要在較高的溫度下才能發芽，清明節以前，氣溫很低，於是我們就要想办法，利用溫床來播種，培育壯健的幼苗（圖三）。

做溫床的方法：選一塊地勢高、方向朝南的地



（圖三）育苗溫床




(圖四) 温床坑

方，挖一个狹長形的坑。这个坑闊四尺，深六、七寸到一尺左右，長約十二到二十尺。坑底掘成饅头形(圖四)。

挖床坑時，利用从坑中挖出來的泥土，做成四面的牆壁。北牆高約一尺，南牆高約三寸；兩側的土壁傾斜，便於接受陽光。也可以用磚或木板代替土壁，磚或木板应用的時間久，也比較牢固。同時，要按床框的大小，做好玻璃窗蓋(圖五)。

溫床里熱量的來源，除了太陽光以外，还要在坑底填入一些發熱的东西。这些东西就叫做“發熱物”，




(圖五) 溫床圍牆

如馬糞、羊糞、垃圾、稻草等等。这些东西的發熱量高低不同，要配合起來，分三、四次填進去。每次填下去，都要鋪平踏緊，并且澆上一些糞水，使它濕潤，促使它發熱。發熱物填完以後，鋪上一層三、四寸厚的床土。床土要輕松、肥沃，并且要注意，不要从栽培过的茄類、瓜類的田中掘取，否則容易感染病害。

溫床做好，床內土壤溫度也穩定了，就可以下種。什麼時候下種最合適呢？一般是由當地斷霜日期，向前推算二個月。杭州、上海、南京一帶，是在二月上旬左右。

下種之前，將種子浸在溫水里三、四小時，然後取出放在小布袋中，用油紙或棉花包裹，放在溫暖的



地方，進行催芽。三、四天后，種子微露白根，就可以下種。經過浸種、催芽，可以使種子出苗較快，而且整齊。


種子均勻地撒在床土上以後，撒上一層草木灰，蓋上一層三、四分厚的細土，然後覆上一層薄薄的稻草，再去澆水。最後將溫床上玻璃窗蓋嚴，天氣很冷的時候，玻璃窗上再蓋上草席。

六、七天以後，種子就發芽出土了。溫床里的幼

苗不能太拥挤，要匀苗二、三次，使每株相距三寸左右。或者在苗高半寸時，按三、四寸的距离，移到另一个温床里去。幼苗生長期間，澆水要適當，否則温床里溫度高，水分多，幼苗很容易生病死亡。

移苗后經過一个月左右，幼苗有五、六片叶子，天气也轉暖和，并且已經断霜，正好把幼苗栽培到田里去。

要育成強壯的幼苗，温床的管理工作很重要。隨



(圖六) 裝植到露地前先將幼苗移植到用草圍的苗床

着幼苗的生長情形，外面氣候的變化，及時地調節、保持適當的溫度。雖然是下雪的天氣，每天最高的床溫也不要超過 25 度，夜間床溫要維持在 10 度左右。保持這樣的溫度，就依靠覆蓋玻璃窗、草席的厚薄，發熱物的多少；以及通風換氣時，支開玻璃窗縫的大小來調節。



(圖七)

温床里的幼苗，在移到田里以前十天左右，停止澆水，逐日增加開窗換氣的時間，或將幼苗按五、六寸的距离，移栽到用草圍成的苗床中（圖六），使柔嫩的幼苗鍛煉堅強，葉子變為深綠色，栽到田里以後，才能抵抗寒冷，生長健壯。好的幼苗，節短而粗壯。不好的幼苗，瘦弱而細長（圖七）。

3 做畦栽種，適當密植

選擇好種番茄的田地，栽植以前，土壤要耕松耙細，再做畦栽植。做畦的方式：在南方降雨多的地區，要做高畦，以利排水；北方雨量稀少，須做平畦，畦埂要比地面高起，便於引水灌溉。

栽植前，先在苗床里澆水，掘苗時盡量帶土。最好在陰天栽植，如在晴天栽植，要在下午三時以後。為了使幼苗栽後容易成活，迅速恢復生長，上海郊區的農民用“團土”法，北京郊區農民用“圃苗”法。

“團土”法是把玻璃花房內育成的幼苗，在春分節，苗高四、五寸時，前一天先澆水，然後連苗帶土，切成三寸見方的土塊，用手輕輕壓緊，仍放在花房地面上。四天後，土塊上的幼苗生出新根，再將土團移