

增補辨證錄

附胎產秘書

上海大成

印行

卷一

山陰陳敬之先生著

增補辨證錄

後附胎產秘書

民國辛酉冬月上

海大成書局印行

余素不知醫二十年前家居時見戚里中多為庸手所誤每戒病者勿輕延醫勿輕服藥嗣於家表兄宋之山處得見陳子遠公所著辨証錄試之無不奇效知其書自浙得來惜其為抄本無以廣其傳也十六年余官於浙亟求是書迺得黃退菴刻本奉使來滇置一部於行篋試之亦無不奇效惜其板之在浙者久經散失竊欲付梓以廣其傳而獨力難餒商之李石渠周寧齋碩致堂各願共襄此舉遂即滇中付剞劂焉前人有言藥雖用於已良方多出於古人是書不但溥方而先辨証証見乎外者也人之虛實寒熱伏於內者不可知見於外者顯可辨得是書者先即其証審之症確而藥可有功即是書亦不至無補云時嘉慶二十二年歲在丁丑秋九月安邑郭淳章識

辨證錄

丁卯秋余客燕市黃菊初放懷人自遠忽聞剝啄聲啟扉迎之見二老者衣冠偉甚奇之登拜問曰先生何方來得毋有奇聞誨鐸乎二老者曰聞君好醫特來辨難耳余謝不敏二老者曰君擅著作才何不著書自雄顧帖帖時藝竊恥之余壯其言乃尚論靈素諸書辨脉辨證多非世間語余益奇之數共晨夕盡論問五月別去訓鐸曰今而後君可出而著書矣鐸退而記憶合以所識方日書數則久乃成帙夫醫道之難也不辨脉罔識脉之微不辨證罔識證之變今世人習診者亦甚多矣言人人殊究不得其指歸似宜辨脉不必辨證也雖然辨脉難知不若辨證易知也古雖有從脉不從證之文畢竟從脉者少從證者衆且證亦不易辨也今人所共知者不必辨也古人所已言者不必辨也必取今人之所不敢言與古人之所未及言者而暢辨之論其證之所必有非說其理之所或無乍聞之而奇徐思之而實未奇也客曰布帛菽粟可以活人安在談醫之必奇乎余謝之曰布帛菽粟平淡無奇而活人之理實奇也日服之而不知其何以溫日食之而不知其何以飽致使其理之彰可乎鐸之辨證猶談布帛菽粟之理耳客又笑曰君辨理奇矣已足顯著作之才奚必託仙以術奇耶鐸尼山之弟子也敢輕言著作乎聞二先生教亦述之而已矣何必諱其非仙乎仙不必諱而必謂是書非述也得毋欺世以術奇乎書非術奇而仍以奇聞名者以鐸聞二先生之教不過五閱月耳數十萬言盡記憶無忘述之成帙是則可奇者乎豈矜世以術奇哉

山陰陳士鐸敬之甫別號遠公又號朱華子題於大雅堂

凡例

一是編皆

岐伯天師 仲景張使君所口授鐸故述廣推以傳世實遵 師誨非敢自矜出奇

一辨證不辨脉者以證之易識也苟能知症何必辨脉哉雖然辨證更能辨脉則治病益精又在人善用之耳

一辨論證候均出新裁闡揚靈素所未備於二經不無小補云

一編中不講經絡穴道以經絡穴道之義已顯載於靈素二經人可讀經自考也

一各門辨證專講五行生尅之理生中有尅尅中有生經權常變顛倒紛紜貴人善讀之耳

一鐸壯遊五岳每逢異人傳刀圭之書頗富凡可引證附載於各辨證條後以備同人採擇

一祖父素好方術遺有家傳秘本凡關合各症者盡行採入以成異書

一吾越多隱君子頗喜談醫如蔣子羽姚復菴倪涵初金子如蔡煥然朱瑞林諸先生暨內父張公璽仍與

同輩余子道元葉子正叔林子巨源錢子升璉丁子威如家太士或聞其餘論或接其片言均採入靡遺

一茲編不講鍼灸非輕之也蓋九鍼治病之法已暢論於靈素書中不必再為發明耳

一人病最多集中所論恐不足概世人之病然生尅之理既明常變之法可悟此編旁通治法正有餘也

一二師所傳諸方與鄙人所採諸法分兩有太過過重之處雖因病立方各合機宜然而氣稟有厚薄之分

生產有南北之異宜臨症加減不可拘定方中疑畏而不敢用也

一鐸年過六旬精神衰邁二師傳鐸之言愧難強記恐至遺忘辨論之處或多未備尤望同人之教鐸也

一是編方法親試者十之五友朋親事傳誦者十之三因不立取奇驗故敢付梓告世然猶恐藥有多寡輕

重方有大小奇偶又將生平異傳諸方備載於後便世臨病酌用也

一岐天師傳書甚富而外經一編尤奇篇中秘奧皆採之外經精鑑居多非無本之學也鐸年尚欲箋釋

外經以求正於大雅君子也

一鐸勤著述近年以來廣搜叢籍又成一編決壽夭之奇聞生尅之秘有益於人命不淺悵卷帙浩繁鐸家貧不克災梨倘有同心好喜之士肯捐資剞劂鐸傾囊付之不吝惜也

大雅堂主人遠公識

辨證錄總目

卷之一

傷寒門 四十三則

卷之二

中風門 二十五則

心痛門 六則

頭痛門 六則

腰痛門 六則

卷之三

咽喉門 七則

口舌門 二則

目痛門 十二則

血症門 二十一則

卷之四

五鬱門 六則

喘門 四則

驚悸門 二則

不寐門 五則

癰瘤門 六則

呆病門 三則

中寒門 七則

痺證門 十一則

脇痛門 五則

腹痛門 六則

牙齒門 七則

鼻淵門 三則

耳痛門 七則

遍身骨痛門 四則

咳嗽門 八則

怔忡門 二則

虛煩門 二則

健忘門 四則

狂病門 六則

呃逆門 五則

卷之五

關格門 五則

翻胃門 五則

厥症門 七則

卷之六

火熱症門 十六則

燥症門 十五則

卷之七

消渴門 五則

汗癰門 五則

大瀉門 九則

癰疽門 八則

卷之八

瘡疾門 十則

癰瘰門 十七則

陰陽脫門 五則

卷之九

大便閉結門 九則

內傷門 二十三則

陰痿門 五則

中滿門 四則

噎膈門 七則

春溫門 三十三則

暑症門 十一則

痿症門 八則

瘰癧門 十一則

五癰門 十則

痢疾門 十三則

虛損門 十二則

夢遺門 七則

淋症門 七則

小便不通門 六則

疝氣門 附奔豚 八則

痰症門 二十一則

卷之十

鶴膝門 二則

遺尿門 三則

強陽不倒門 二則

火丹門 二則

疰夏門 二則

中邪門 六則

中毒門 十二則

自笑門 附自哭 三則

瘡啞門 三則

種嗣門 九則

婦人科

卷之十一

帶門 五則

血崩門 七則

受娠門 十則

卷之十二

安胎門 十則

鬼胎門 一則

血暈門 三則

癰風門 二則

脫肛門 二則

發斑門 二則

離魂門 三則

腳氣門 一則

中妖門 六則

腸鳴門 三則

惱怒門 二則

瘟疫門 一則

血枯門 二則

調經門 十四則

妊娠惡阻門 二則

小產門 五則

難產門 六則

胞衣不下門 二則

產後諸病門十一則
卷之十三 外科

背癱門七則

肝癱門二則

小腸癱門三則

對口疽門一則

囊癱門二則

乳癱門四則

多骨癱門一則

疔瘡門一則

腰疽門一則

脚疽門二則

唇疔門一則

痔漏門四則

接骨門二則

物傷門三則

刑杖門一則

卷之十四 幼科

驚疳吐瀉門七則

疹症門三則

下乳門二則

肺癱門四則

大腸癱門三則

無名腫毒門一則

腦疽門一則

臂癱門一則

肚癱門一則

惡疽門一則

楊梅瘡門五則

擎疽門一則

鬚疽門一則

瘰癧門二則

頑瘡門二則

金瘡門一則

癩門一則

胎毒門一則

痘瘡門十五則

便虫門二則

喫泥門一則

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述
會稽陶式玉尚白甫號存齋又號

傷寒門

冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴人以為太陽之症也誰知太陽已趨入陽明乎若徒用乾葛湯以治陽明則頭痛之症不能除若徒用麻黃湯以治太陽則汗出不能止口渴不能解勢必變症多端輕變為重法宜正治陽明而兼治少陽也何則邪入陽明留於太陽者不過零星之餘邪治太陽反傷太陽矣故太陽不必治宜正治陽明蓋陽明為多氣多血之府邪入其中正足大恣其凶橫而挾其腑之氣血為炎氣烈熾者往往然也故必須用大劑涼藥始可祛除其橫暴也方用石膏一兩知母二錢麥冬二兩竹葉二百片茯苓三錢甘草一錢人參三錢柴胡一錢梔子一錢水煎服一劑而頭痛除二劑而身熱退汗止而口亦不渴矣此即白虎湯變方用石膏知母以復其陽明之火邪用柴胡梔子以斷其少陽之路徑用麥冬以清補其肺金之氣使火邪不能上逼用茯苓引大下趨於膀胱從小便而出而太陽餘邪盡隨之而外泄也至於人參甘草竹葉不過取其調和臟腑所謂攻補兼施也

或灑前方太重則清肅湯亦可用也并載之以備選用

石膏五錢知母一錢麥冬一兩甘草人參柴
胡梔子各一錢獨活半夏各五分水煎服

冬月傷寒發熱口苦頭痛饑不欲飲食腹中時痛人以為太陽之症也誰知少陽之病乎夫傷寒未有不從太陽入者由太陽而入陽明由陽明而入少陽者傳經之次第也何以邪入太陽即越陽明而入於少陽耶人以為隔經之傳也而孰知不然蓋少陽乃膽經也膽屬木木最惡金肺屬金而主皮毛風邪之來肺金先受肺欺膽木之虛即移其邪於少陽故太陽之症往往多兼少陽同病者然則此症乃二經同感而非傳經之症也治法似亦宜二經同治矣而又不然單治少陽而太陽之病自愈方用柴胡二錢白芍五錢甘草一

錢陳皮一錢黃芩一錢神麴一錢白朮三錢茯苓三錢水煎服一劑而熱止二劑而腹不痛頭不疼而口亦不苦矣此方即逍遙散之變方也蓋病在半表半裏之間逍遙散既解散表裏之邪而太陽膀胱之邪何能獨留況方中原有茯苓白朮以利腰臍而通膀胱之氣乎余所以止加神麴黃芩少解其胃中之火以和其脾氣而諸症盡除也

此病用舒徑

薄荷二錢白芍五錢甘草八分黃芩二分
白朮二錢茯苓五錢桂枝三分水煎服

一冬月傷寒發熱口渴謔語時而發厥人以為熱深而厥亦深也疑是厥陰之症誰知為太陰之症乎夫太陰脾土也脾與陽明胃經為表裏表熱而裏亦熱此乃胃邪移入於脾經也此症最危最急蓋人以脾胃為主脾胃盡為火邪所燦而腎水有不立時乾乾者乎治法宜急救脾胃矣然而救脾則胃火愈熾救胃則脾土立崩此中之消息最難惟當速救腎水之乾枯而已方用玄參三兩甘菊花一兩熟地一兩麥冬二兩芡實五錢水煎服此方名為救枯丹用玄參以散其脾胃浮遊之大甘菊以消其胃中之邪麥冬以滋其肺中之液助熟地以生腎水庶幾滂沱大雨自天而降而大地焦枯立時優渥何旱魃之作祟乎又恐過於汪洋加入芡實以健其土氣而仍是腎經之藥則脾腎相宜但得其灌溉之功而絕無侵凌之患故一劑而謔語定再劑而口渴除三劑而厥亦止身亦涼也此症世人未知治法即仲景張使君亦未嘗談及天師因士鐸之請特傳神奇治法以為傷寒門中之活命丹也

此症用清土

石膏一兩麥冬一兩生地一兩甘草
一錢金銀花五錢白朮三錢水煎服

一冬月傷寒大汗而熱未解腹又痛不可按人以為邪發於外未盡而內結於腹中乃陽症變陰之症也余以為不然夫傷寒而至汗大出是邪隨汗解宜無邪在其中何至腹痛此乃陽氣盡亡陰亦盡泄腹中無陰以相養有似於邪之內結而作痛蓋陰陽兩亡之急症也夫痛以可按為虛不可按為實何以此症不可按而

世人不俱
而亡陽
亡陽即
是亡陰
此等誤
論非誤
論指授
安得發
所千發
耶未發

陰不能
濟以致
亡陽亦
發前人
所未發

面如珠
紅或紫
時有紫
者唇焦

又以為虛乎不知陰陽兩亡腹中正在將絕之候不按之已有疼痛難忍之時况又按而傷其腸胃安得不重增其苦所以痛不可按也如遇此症急不可緩方用急救陰陽湯用人參二兩黃芪三兩當歸一兩熟地二兩甘草二錢白朮二兩水煎服一劑而腹痛頓止身熱亦解汗亦盡止矣此方用參芪以補氣使陽回於陰之內用當歸熟地以補血使陰攝於陽之中用白朮甘草和其腸胃而通其腰膈使陰陽兩歸於氣海關元則亡者不亡而絕者不絕也倘認是陽症變陰純用溫熱之劑加入肉桂乾薑附子之類雖亦能回陽於頃刻然內無陰氣陽回而陰不能攝亦旋得而旋失矣

此症用救亡散

亦易奏功

人參當歸熟地各一兩甘草

二錢附子一片水煎服

一冬月傷寒大汗熱解腹微痛腰不可俯仰人以為邪在腎經未出欲用稀益丸加防已治之非其治也此乃發汗亡陽陽虛而陰不能濟之故也夫陰陽相根此症因汗泄過多陽氣無幾而陰又自顧不遑不敢引陽入室而陽無所歸故行於腹孤陽無主而作痛腎中之陰又因陽氣不歸而孤陰無伴不敢上行於河車之路故腰不可以俯仰方用引陽湯治之杜仲一錢山藥五錢甘草一錢茯苓二錢芡實三錢人參三錢肉桂三分白朮五錢水煎服一劑而腹痛止二劑而腰輕三劑而腑仰自適矣此方助陽氣之旺而不去助陰氣之微益陰之所以杜陽者欺陽氣之衰也予所以助陽而不助陰也倘用稀益防已以重損其陰陽則終身不為廢人者幾希矣

此症濟陽湯

亦可

杜仲二錢山藥一兩甘草一錢人參五錢白朮五錢破故紙一錢水煎服

一冬月傷寒大汗氣喘不能息面如珠紅口不能言呼水自救却僅能一口而不欲多飲人以為熱極欲用白虎湯以解其陽明之火也而不知此為戴陽之症乃上熱而下寒也若用白虎湯雖多加人參下喉即亡矣方用八味地黃湯半觔大鍋煎湯恣其渴飲必熟睡半日醒來汗必止氣必不喘面必清白口必不渴矣蓋

似發時胎
與人之水
則欲飲
而口不
冷此足
亦易證
不如今
明誤人
性命矣

此證初
起原屬
內傷乃
庸醫者
作外感
治之則
成戴陽
症矣既

而己其
面有珠
紅熱又
則無有
不死者

論此快
胃益信
之胃非
之胃也

是熱不

是熱不

是熱不

此症原不宜汗而汗之以致大發其汗汗既大出而陽邪盡洩陽氣盡散陰亦隨之上升欲盡從咽喉而外越以皮毛出汗而陰氣奔騰不得盡隨汗泄故直趨咽喉大路不可止抑矣陰既上升陽又外洩不能引陰而回於氣海陽亦隨陰而上而陰氣遂逼之而不可下故氣喘不能息也且陽既在上火亦在上者勢也況陰盡上升則腎宮寒極不既無火而上火不得歸源故泛炎於面而作紅硃之色也上火不散日日作渴呼水自救者救咽喉之熱而非欲救腸胃之熱也夫實熱多成於胃火而胃熱之病必多號咷狂呼之狀今氣雖喘息而甯口欲言語而不得非虛熱而何此真所謂上假熱而下真寒也八味地黃湯補水之中仍是補火之藥下喉之時火得水而解入胃之後水得火而甯調和於上下之間灌注於肺腎之際實有妙用也夫發汗亡陽本是傷氣也何以治腎而能奏功耶不知亡陽之症內無津液一致內火沸騰我大補其真陰則胃得之而息其燭胃大一息而腎之關門閉矣腎之關門閉而胃之土氣自生胃之土氣生而肺金之氣有不因之而得養者乎肺氣一生自然清肅之令行母呼子歸同氣相招勢必下引腎氣而自歸於子舍矣腎氣既歸而腎宮之中又有溫和春色以相薰又得汪洋春水以相育則火得水而生水得火而悅故能奏功之神且速也

返火湯治此症亦神
熟地三兩山茱萸一兩肉桂三錢水煎服

一冬月傷寒發厥面青手冷兩足又熱人以為直中陰寒也宜用理中湯治之而不知非其治也此乃肝氣邪鬱而不散風邪在半表半裏之間也若用理中湯治之必熱發狂而死矣夫直中陰寒之症未有不從足而先冷者也今兩足既熱其非直中肝經明矣夫邪既不在肝經似乎不可徑治肝經矣然而邪雖不在肝經之內而未嘗不在肝經之外也邪在門外與主人何豫而忽現發厥面青手冷之症耶不知震隣之恐猶有警惕之心豈賊在大門之外而主人有不張惶色變者乎倘用理中湯是用火攻以殺賊賊未擒燒而房舍先焚賊且乘火而突入於中庭必至殺主人而去矣治法用小柴胡湯加減以散其半表半裏之邪而肝氣自安外邪化為烏有方用柴胡二錢白芍五錢甘草一錢當歸一錢五分黃芩一錢半夏一錢水煎服一劑

是陰症
之真見
到

失汗之
症經治
內傷治
非到者
斷不誤
輕用誰
知教膽
用之無
不奏功

餘熱未
解用清
熱散是

而手溫再劑而厥止身熱盡除而面青自白矣

此症用七賢

湯亦甚效

白芍白朮各五錢甘草一錢肉桂三分柴胡一錢丹皮三錢天花粉二錢水煎服一劑即安

一冬月傷寒身熱汗自出惡寒而不惡熱人以為陽明之症也欲用石膏湯治之而不知非也汗出似陽明然陽明未有不惡熱者今不惡熱而惡寒此陽氣甚虛邪欲出而不出內熱已解而內寒未散之症也此症必因誤汗所致方用補中益氣湯人參三錢黃芪二錢白朮二錢當歸二錢柴胡一錢升麻四分陳皮一錢甘草一錢加桂枝五分水煎服一劑而汗止身涼寒亦不惡矣夫補中益氣之湯非治傷寒之症也李東垣用之以治內傷之病實有神功我何所取乎不知傷寒之中亦有內傷之病正不可拘拘於傷寒而不思治變之方也況此症因誤汗而成者汗已出矣邪之存於經絡者必淺即有畏寒其寒邪亦必不重是外感而兼內傷也補中益氣湯補正之中而仍有祛邪之藥故兼用之而成功也況又加桂枝散寒之味乎倘誤認作陽明之症而妄用白虎湯少投石膏鮮不變為虛寒之病而死矣辨症烏可不明哉

溫正湯亦

可用

人參五錢黃芪一兩當歸五錢柴胡一錢甘草五分神曲一錢桂枝三分水煎服

一冬月傷寒身熱五六日不解譫語口渴小便自利欲卧人以為陽明之餘熱未解也而予以為不然夫譫語雖屬胃熱然胃熱譫語者其聲必高拂其意必怒今但譫語而低聲非胃熱也但既非胃熱何以口中作渴欲飲水以之救耶然口渴飲水水不化痰上湧反直走膀胱而小便自利其非胃熱又明矣夫陽明火盛多致發狂今安然欲卧豈是胃熱之病但既不是胃熱何以譫語口渴不解至五六日而猶然耶不知此症乃心虛之故也心虛則神不守舍而譫語心虛則火起心包而口渴夫心與小腸為表裏水入心而心即移水於小腸故小便自利也治法用茯苓五錢麥冬一兩丹皮二錢柴胡一錢甘草五分水煎服一劑而譫語止二劑而口渴除身熱亦解此乃名為清熱散用麥冬以補心用茯苓以分消火熱用柴胡丹皮甘草以和解

水最喜風有風雨
風必乾則雨
水以風治
若風不
治水之
得快也

其邪氣心氣足而邪不能侵邪盡從小腸以泄出而心中甯靜津液自生故渴除而腎氣上交於心而精自長亦不思臥矣倘疑為胃熱而用白虎或用青龍之湯鮮不敗與矣

涼解湯亦

可用
一錢甘草三分炒杏仁二錢水煎服

一冬月傷寒至五六日往來寒熱胸脇苦滿或嘔或吐或渴或不渴或煩或不煩人以為少陽之病也宜用小柴胡湯和解之夫小柴胡湯治少陽邪之聖藥用之似乎無不宜也以少陽居於表裏之間邪入而併於陰則寒邪出而併於陽則熱故痰結於胸而苦滿欲吐不吐欲渴不渴而煩悶生矣用柴胡湯以和解之自易奏功然而止可一用而不可常用也蓋少陽膽水最喜者水耳其次則喜風柴胡風藥得之雖可以解慍然日以風藥投之則風能燥濕愈見乾枯必以大雨濟之則鬱鬱葱葱其扶疎青翠為何如耶譬之炎夏久旱禾苗將至枯槁必得甘露足庶乎可救故用柴胡湯之後必須用補水之劑以濟之方用濟生湯熟地五錢玄參五錢麥冬三錢山茱萸一錢山藥三錢茯苓二錢白芍三錢柴胡五分神麴三分竹茹一團水煎服一劑而煩滿除再劑而寒熱止三劑而前症盡失也此方多是直補腎水之味直補其膽水之源則膽汁不枯足以禦邪而有餘況加入白芍柴胡仍散其半表半裏之邪安得不收功之速乎倘疑傷寒之後不宜純用補腎之藥恐胃氣有傷難以消化不知少陽之症由太陽陽明二經傳來大燥水涸不但膽汁為邪所逼半致乾乾而五臟六腑盡多炎燥是各經無不喜聆霖雨非惟少陽膽水一經喜水也然則用補水之藥正其所宜何至有停隔之虞哉

此症用和隔

散亦妙

柴胡一錢白芍一兩生地五錢玄參三錢麥冬二錢茯苓二錢竹茹一團白芥子一錢水煎服

一冬月婦人傷寒發熱至六七日晝則了了夜則譫語如見鬼狀按其腹則大痛欲死人以為熱入血室而不知非止熱入血室也雖亦因經水適來感寒而血結故成如瘧之狀然而其未傷寒之前原有食未化血包