

金匱方略

羅振湘著



中華民國二十五年冬十二月初版

金匱方症歌括

此書有著作權翻印必究

全册定價大洋貳角半分

著作者 潛陽羅振

校正者 衡陽劉嶽嵩

參校者 受業男建藩建萱建芟

印刷者 湖南第一監獄第三科

專售處 長沙振湘醫社

地址南正街二十三號



南京中医药大学图书馆版权所有

自序

余因傷寒論爲醫者必讀之書。又爲醫者難讀之書。故著方症歌括。以減少讀者之腦力與時間矣。然金匱要略。係仲師治雜病之書。醫者豈可須臾離哉。書凡九卷。方症二百餘條。較之傷寒。亦非易易。於是金匱方症歌括。又不得不繼爲著述也。或者曰是書之作。專示人以捷徑。恐學者置原書於不顧。寧不爲原書之大害耶。不知中醫書籍。汗牛充棟。幾有竭其畢生之力。而尙難以盡悉者。與其博學而無成。何若守約之爲貴。使學者於讀原書有得之餘。再取此書讀之。乃知此書之作。並非斷簡原書。實有功於原書也。况近來科學發明。要皆可爲醫學之基礎。西醫東漸。又何莫非中醫所當參。可見醫者應讀之書。比從前又增數倍。如謂中醫自有應讀之書。不必若是汎求。是中醫不

金匱方症歌括 自序

二

求進境之語。苟欲求進境。使中醫變爲世界最精之醫。非如此研究不可。由此觀之。則中醫豈易學乎。人生天地。不過數十寒暑。縱能過目成誦。孰若有化繁爲簡之書。事半而功倍。今之書肆中。往往集數十百家。成二鉅冊。並不分門別類。刪其繁冗。歸於至當。殊不謂然。但是項偉大著作。非一人精力與經驗所能及。要在有改進國醫之責者。合全力爲之。乃克有濟。余茲著要亦不外斯意歟。是爲序。

中華民國二十五年十二月穀旦瀏陽羅振湘瑾仁序於長沙之醫社

金匱方症歌括

金匱計二百四十三方今刪去十卷中二十九方祇有二百一十四方
括計九十六首附方三十四

金匱方

痓溼暎病方 共十一方

葛根湯

大承氣湯

麻杏薏甘湯

防已黃耆湯

白朮附子湯

甘草附子湯

一物瓜蒂散

苦參湯

百合狐惑陰陽毒方 共十三方

百合滑赭湯

百合雞子黃湯

百合洗方

枯萎牡蠣散

甘草瀉心湯

苦參湯

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲去雄椒湯

雄黃薰法

百合滑石散

百合地黃湯

百合知母湯

人參白虎湯

瘧病 共三方附三方

鼈甲煎丸

附外台牡蠣散

中風歷節 共七方附五方

白虎加桂枝湯

柴胡去半加葛根湯

蜀漆散

柴胡桂薑湯

候氏黑散

頭風摩散

風引湯
桂枝知母湯

礬石湯

附近效尤附湯

附古今錄驗續命湯
①附越婢加尤湯

血痺虛勞 共九方附二方

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍牡湯

小建中湯

黃耆建中湯

薯蕷丸

酸棗仁湯

附千金炙甘草湯

附肘後獺肝散

天雄湯
八味腎氣丸

大黃麤蟲丸

市秦市難次軟上風共十方附七方

附千金炙甘草湯

附肘後獺肝散

甘草乾薑湯

○射干麻黃湯

阜莢丸

厚朴麻黃湯

○澤瀉湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

○桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

○附外台炙甘草湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

○桂枝去芍加皀湯

附千金生薑甘草湯

附千金葶藶大棗湯

○附千金葶藶大棗湯

外台桔梗白散

奔猝病共三方

奔猝湯

桂枝加桂湯

茯桂甘棗湯

胸痺心痛氣短

共九方附一方

栝萎薤白白酒湯

栝萎薤白半夏湯

栝萎薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏草湯

橘皮生薑湯

薏苡附子湯

桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食共十一方附五方

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

烏頭桂枝湯

當歸生薑羊肉湯

附外台烏頭湯

附外台柴桂湯

附外台走馬湯

大承氣湯

瓜蒂散

五臟風寒積聚共三方

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑芩尤湯

痰飲咳嗽共二十三方附一方

苓桂尤甘湯

腎氣丸

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加芩硝去石湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

葶藶大棗瀉肺湯

小半夏加茯苓湯

已椒麯黃丸

小半夏湯

五苓散

已椒歷黃丸

附外台茯苓飲

小半夏湯
十棗湯

五苓散
小青龍湯

桂茯五味甘草湯

桂苓味甘去桂加薑辛湯

苓甘味加薑辛半湯

苓甘味加薑辛半杏湯

苓甘味加薑辛半黃大湯

小半夏茯苓湯

消渴小便不利淋病

共八方

腎氣丸

五苓散

文蛤散

栝蔞瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病
共十二方附一方

防己黃耆湯

越婢湯

越婢加朮湯

甘草麻黃湯

防己茯苓湯

麻黃附子湯

杏子湯

蒲灰散

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂去芍加麻辛附湯

附外台黃耆防己湯

黃痺共十方附二方

茵陳蒿湯

桂枝加黃耆湯

大黃硝石湯

小建中湯

驚悸吐血衄血胸滿瘀血共六方

桂枝去芍加漆龍牡湯

黃土湯

嘔吐噦下利共二十五方附二方

吳茱萸湯

小半夏湯

猪苓湯

茯苓澤瀉湯

生薑半夏湯

橘皮湯

文蛤湯

大半夏湯

小柴胡湯

半夏瀉心湯

黃芩加半薑湯

四逆湯

大黃甘草湯

半夏乾薑湯

橘皮竹茹湯

梔子大黃湯

硝石礬石湯

茵陳五苓散

小半夏湯

附瓜蒂散

附千金麻黃醇酒湯

柴胡湯

柏葉湯

瀉心湯

生薑半夏湯

四逆湯

小承氣湯

白頭翁湯

桂枝湯

橘皮湯

通脈四逆湯

附外台黃芩湯

共六方附一方

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

排膿散

排膿湯

附陳氏治梅毒方

王不留行散
黃連粉

跌蹶手臂腫轉筋狐疝蛇虫

共五方

藜蘆甘草湯

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠

共十方附一方

桂枝湯

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

桂枝茯苓丸

乾薑人參半夏湯

金匱方症歌括 目錄

八

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮湯

附保產無憂散

婦人產後共九方附三方

小柴胡湯

大承氣湯

當歸生薑羊肉湯

陽旦湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸湯

附生化湯

婦人雜病共二十方

小柴胡湯

小青龍湯

瀉心湯

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

溫經湯

王瓜根湯

旋覆花湯

膠艾湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

小建中湯

腎氣丸

蛇牀子散

狼牙湯

腎氣丸

膏髮煎

雜療

祇選一方

四時退熱加減柴胡飲

蛇牀子散

小兒疳蟲蝕齒方

狼牙湯

金匱方症歌括

湖南國醫院醫務主任
兼湖南國醫學校教授 羅振湘著

中央國醫館理事兼
湖南國醫學校校長 劉嶽嵩校正

金匱方共二百十三方
附三十四方

痓溼喝病方

栝蔞桂枝湯

葛根湯見傷寒

大承氣湯

見傷寒（痓）

桂枝湯內裏根增。柔痓几几證可憑。發熱不寒汗自出。沉遲脈外太陽徵。氣衝無汗湯宜葛。噤滿脚攣用大承。

栝蔞桂枝湯方栝蔞根三錢桂枝三錢芍藥三錢甘草二錢生薑三錢大棗十四枚微汗汗不出食頃啜熱粥發之

太陽病其證備身體強几几然脈反沉遲此爲痓栝蔞桂枝湯主之

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯主之

痘爲病胸滿口噤臥不著席脚顫急必齦齒可與大承氣湯

麻黃加朮湯 麻黃杏仁薏苡甘草湯 (溼)

麻黃加朮溼家嘗。遍身煩疼汗則康。麻杏薏甘風溼用。身疼

晡熱不爲殃

麻黃加朮湯方麻黃三錢去節桂枝二錢炙草一錢白朮四錢杏仁二十四個去皮尖先煮麻黃去上沫納諸藥煮服覆取微汗

溼家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗爲宜慎不可以火攻之

麻黃杏仁薏苡甘草湯方麻黃五分杏仁三個去皮尖薏苡五分炙草五分右剉麻豆大每服煎八分去渣溫服微汗避風

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風溼此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也
按麻黃古方常用三四錢今時人體弱有難服此重分者用者慎之

防已黃耆湯

桂枝附子湯 見傷寒

白朮附子湯 見傷寒

甘草

附子湯 見傷寒

防已黃耆法最工。脈浮身重溼因風。惡風汗出虛邪襲。朮草

棗薑六味充。氣腎歸麻寒入咽。芍藥加朮不自由。桂十

各加附。症見傷寒治亦同。

防已黃耆湯方 防已一兩 甘草五錢 炙白朮七錢 半黃耆一兩 一分

右剉麻豆大每服五錢 七生薑四片 大棗一枚 水盞半煎八分去滓溫服喘者加麻黃五分 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝者加桂枝三分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如虫行皮中 從腰下如冰後坐被上又以被繞腰下令微汗差

風溼之脈浮身重汗出惡風者 防已黃耆湯主之

傷寒八九日風溼相搏身體疼不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者 桂枝附子湯主之 若大便堅小便自利者 去桂枝加白朮湯主之

風溼相搏骨節疼頑掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身體腫者 甘草附子湯主之

白虎人參湯

見傷寒

瓜蒂湯

(喝)

渴病熱乾汗惡寒。人參白虎正宜餐。脈微身熱與疼重。瓜蒂爲湯愈勿難。

瓜蒂湯方 瓜蒂二十七個剉以水一升煮取五合去滓頓服

太陽中熱者渴是也 汗出惡寒身熱而渴 白虎加人參湯主之

太陽中渴身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也 一物瓜蒂湯主之

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯 百合滑石代赭石湯 百合雞子黃湯 百合

地黃湯 百合洗方 栀子牡蠣散 百合滑石散 (百合)

百合病情察溺時。發汗傷陰用百知。下後熱深百滑赭。吐因
傷藏百雞施。未經三法百和地。變渴百湯洗勿遲。洗後渴仍
宜棗蠣。熱須百滑兩般治。

百合知母湯方百合七枚知母一兩先各另煎去渣再合煎取一升半分溫再服

百合雞子湯方百合七枚擘雞子黃一枚煎如前法溫服

百合地黃湯方百合七枚生地黃汁一茶盃煎如前法分溫再服中病止大便當如漆

百合滑石代赭石湯方百合七枚滑石一兩碎綿裹代赭石如彈丸大一枚碎綿裹先煎白合另
煎滑石代赭取一升去滓合煎取升半分溫再服

百合洗方百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹹豉

枯棗牡蠣散爲細末飲服方寸七日三服

百合滑石散方百合一兩炙滑石三兩右爲散飲服方寸七日三服當微利者止服熱則除

論曰百合病者百脈十宗悉致其病耽意欲食復不能食常伏伏不能汎欲寐不寐吁承女