

秦伯未先生編輯
實用中醫藥學

黃毅陳无咎題

中華民國十九年七月初版
 中華民國廿五年三月三版

版權所有
 禁止翻印

外埠代售處

實用中醫學

平裝四冊定價三元四角
 精裝一冊定價三元七折

編纂者 上海秦伯未

發行者 上海中醫書局

總發行所 上海中醫書局
山東路廿六號帶鉤橋北境

印刷者 國光印書局
上海南成都路新大沽路口

電話 三三七四三

廣州雙門底 汕頭居平路 暹京天外天街 蘇州吳趨坊 太原中正街
 林記書莊 育新書社 世界書局 新華書局 中國醫書社
 中醫改進會



南京中医药大学图书馆版权所有

幼科學

最新
 醫學

初生.....一

不啼 眼不開 不乳 吐不止

不小便 不大便 垂癰 重舌

重齕重齕 噤風 鵝口 撮口

臍風 臍濕 臍瘡 臍突

胎驚 胎癩 內釣 胎風

胎熱 胎寒 胎肥胎怯 胎黃

胎赤 覘乳 夜啼 赤游風

初生無皮

雜病.....二一九

天痘 水痘 痧疹 急驚風

慢驚風 疳 虛羸 癰疾

龜胸 遺尿 五遲 五軟

五硬

附種牛痘法.....五二一

概說 施術 器械 痘苗

消毒 時令 年齡 感應

時疫病專書

腦膜炎新書

沈朗清著
一冊實洋三角

伏邪新書

劉吉人著
一冊一角七折

霍亂指南

翟冷仙著
一冊一角七折

痧疫指迷

費養莊著
一冊一角七折

霍亂平議

凌禹聲著
一冊一角七折

燥氣總論

陳葆善著
一冊五角半七折

吊脚痧方論

徐子默著
一冊一角七折

溫疫論補註

吳又可著
一冊六角七折

疫痧草

陳耕道著
一冊一角七折

疫喉淺論

夏春農著
二冊四角七折

痧痘病專書

痘疹遂生編

莊一夔著
一冊一角七折

中國痘科學

卜惠一著
一冊三角七折

時痘論

朱鳳禪著
一冊一角七折

治瘡全書

董西園著
一冊四角七折

近世牛痘學

劉泌子著
一冊三角八折

上列各書。均切實用。而腦膜炎新書。近世牛痘學諸種。尤爲中醫界未有之著述。尙有各種。不及備載。請閱本局書目提要。每書之下。附有淺顯之說明。足供參攷。

上海山東路二十六號

中醫書局發行

實用中醫學

上海秦之濟伯未述

受業

陳昌順錦樓
弟之萬又安校

第九編 兒科學

□ 初生

▲ 不啼

兒生落地。啼聲卽發。形生命立矣。有不啼者。俗云草迷。多因臨產時生育艱難。以致兒生氣閉不通也。急以葱鞭其背。使氣通則啼。又有時值天寒之際。兒氣爲寒所傷。亦不能啼。宜用熏臍帶法。急爲挽回。庶氣通而啼聲出也。若氣絕無聲。面青甲黑。是形雖存而命已不立。安望其生。

▲ 眼不開

小兒初生眼不開者。因孕婦飲食不節。恣情厚味。熱毒熏蒸。以致熱蘊於內也。

治法當以熊胆少許。蒸水洗眼上。一日七次。如三日不開。用生地黃湯。凡初生小兒。須洗令淨。若洗不淨。則穢汁浸漬於眼眥中。使眼赤爛。至長不瘥。洗眼方

熊胆

黃連各少許

生地黃湯 治初生小兒眼不開。

乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸去蘆

瓜蒌根

甘草

▲不乳

不乳謂初出胞胎不吮乳也。嬰兒初出胎時。其聲未發。急以手拭其口。令惡血淨盡。不得下咽。即無他病。若拭口不全。惡穢入腹。則令腹滿氣短。不能吮乳。當用一捻金治之。或產母取冷過度。胎中受寒。致令兒腹痛多啼。面色青白。宜用茯苓丸治之。若四肢厥逆。理中湯治之。

茯苓丸

赤茯苓

川黃連去蠶

枳壳炒等分

▲吐不止

兒自胞胎既脫以後。有因便秘。腹中穢惡不淨。令兒腹滿。其吐不止者。木瓜丸主之。若生育時觸冒寒邪。入裏犯胃。則曲腰而啼。吐沫不止。香蘇飲溫散之。又有胎前受熱。面黃赤。手足溫。口吐黃涎酸粘者。二陳湯加黃連主之。若胎前受寒。面青白。四肢冷。口吐清稀白沫者。理中湯主之。

木瓜丸

木瓜

麝香

膩粉

木香

檳榔各等分

香蘇飲

藿香

蘇葉

厚朴薑炒

陳皮

枳 壳 麩 炒

茯 苓

木 香 煨

炙 甘 草

黃連二陳湯

半 夏 薑 製

陳 皮

茯 苓

生 甘 草

黃 連 薑 炒

▲不小便

小兒初生不尿者。多因在胎時。母恣食噉。熱毒之氣。流入胎中。兒飲其血。是以生而臍腹腫脹。如覺臍四旁有青黑氣色。及口撮。即不可救也。如未有青黑色。不飲乳者。宜服導赤散。熱盛者。八正散主之。外用豆豉膏貼臍上。則小便自通矣。

導赤散

生 地 黃

木 通

生 甘 草

淡 竹 葉

八正散

扁蓄

瞿麥

滑石飛

木通

赤苓

車前子

生大黃

生梔子

豆豉膏

淡豆豉二勺

田螺十九個

葱一大束

▲不大便便

小兒初生之日或次日即大便者。俗云下臍屎。此腸胃通和。幽門潤澤也。若至二三日不大便者。名曰鎖肚。乃胎中受辛熱之毒。氣滯不通也。其兒必面赤腹脹。不乳多啼。宜先用硃蜜法治之。設若不應。用一捻金量兒與之。繼令婦人以溫水漱口。唾兒前後心手足心並臍下共七處。以皮見紅赤色爲度。仍以輕粉半錢蜜少許溫水化開。時時少許服之。以通爲止。如更不通。即是肛門內合。當以物透而通之。金簪爲上。玉簪次之。須刺入二寸許。以蘇合香丸納入孔中。糞出爲快。若肚腹膨脹不能乳食。作呻吟聲。至於一七。則難望其生矣。

蘇合香丸

蘇合香油 五錢入安
息香內

安息香 一兩另為末用無
灰酒半斤熬膏

丁香

青木香

白檀香

沉香

華撥

香附子

訶子 煨去肉

烏犀 鎊

硃砂 各一兩水飛

熏陸香

片腦 各五錢研

麝香 七錢半

▲垂癰

一名懸癰。凡喉裏上齶腫起。如蘆籜盛水狀者。即是蘆籜蘆筍也。此乃胎毒上攻。可以綿纏長鍼。留刃處如粟米許。大以刺決之。令氣泄。去青黃赤血。汁若一日未消。來日又刺之。不過三刺。自消盡。餘小小未消。三刺亦止。刺後再以鹽湯洗拭。急用如聖散。或一字散搽刷。

如聖散

鉛霜

真牛黃

元精石

硃砂 水飛曝乾等分

一字散

硃砂

礪砂各半錢

龍腦

朴硝各一字

▲重舌

重舌者近舌根處。形如舌而短。故名。此因受胎時受熱太盛。致發於上焦。急以雞內金爲末乾摻口內。並用地黃膏摻之內服清熱飲。

地黃膏

鬱金皂莢水煮乾切焙

豆粉各半兩

甘草一分炙

馬牙硝研一錢

清熱飲

黃連生

生地

木通

甘草生

連翹去心

蓮子

▲重齦重齠

兩證皆因小兒在胎有熱。蓄於胃中。故牙根上齠。腫如水泡。名曰重齦重齠。治

法用針刺破。以鹽湯拭淨。外敷一字散。內服清胃散。其腫自消。

生地

丹皮

黃連

當歸

升麻

石膏煨

▲噤風

又名噤口。如果失治。多至不救。其候舌上生瘡如黍米狀。吮乳不得。啼聲漸小。因胎熱所致也。法當清熱疏利。以龍胆湯主之。若肚腹脹硬。二便不通者。紫霜丸主之。又有一種口吐白沫。牙關緊急者。此胎熱內結。復為風邪外襲。當以秘方擦牙散先擦其牙關。次服辰砂全蠍散。中病即止。不可過服。症退當調和脾胃。以勻氣散主之。如口噤不開。服諸藥不效者。擦牙散用指蘸生薑汁於大牙根上擦之。立開。

龍胆湯

柴胡

黃芩

生甘草

鉤藤鉤

赤芍

大黃紙裏煨

龍胆草

蜨去翅足

桔梗

赤茯苓

秘方擦牙散

生南星二錢去皮臍 龍腦少許

辰砂全蠍散 治初生兒口噤

辰砂水飛半錢 全蠍頭尾全去毒二十枚炙 硼砂

龍腦

麝香各一字

▲鵝口

鵝口者。白屑生滿口舌。如鵝之口。故名。由在胎中。受母飲食熱毒之氣。蘊於心脾二經。故生後遂發於口舌之間。治法以清熱瀉脾散主之。外用新棉花蘸水拭口。搽保命散。日敷二三次。白退自安。倘治之稍遲。必口舌糜爛。吮乳不得。則

難痊矣。一法用新棉花纏指頭蘸井水揩拭之。睡時黃丹煨出火氣。搽於舌上。

不效。則煮粟莢汁令濃。以棉纏指頭拭之。春夏無粟莢。煮栗木皮。如用井水法。

亦得。或用牙硝細研。舌上搽之。日三五度。或用桑白皮汁和胡粉傅之。

保命散 治嬰兒初生七日內。胎毒舌上有白屑如米。連舌下有膜如石榴子。

大令兒聲不發。

白礬燒灰

硃砂

水飛各二錢半

馬牙硝半兩

清熱瀉脾散

山梔炒

石膏煨

黃連薑炒

生地

黃芩

赤苓

▲撮口

嬰兒胎氣挾熱。亦因母有邪熱傳染。或生下洗浴當風。襁褓失度。致令嬰兒啼聲不出。乳哺艱難。名曰撮口不開病。七日之內尤甚。舌強唇青。面色黃赤。乃心

脾之熱受自胎中而然也。其症為危候。急當隨症治之。如氣高痰盛者。辰砂礶蠶湯主之。二便秘結者。紫霜丸主之。身熱多驚者。龍胆湯主之。手足抽搐者。撮風散主之。若更口吐白沫。四肢厥冷。雖有神丹終屬無濟。

辰砂礶蠶散

辰砂五分 水飛

礶

蠶一錢選直身者去絲嘴炒

蛇蛻皮一錢炒

麝

香五分

撮風散 治小兒撮口。

赤脚蜈蚣半條炙

鈎

藤二錢半

硃砂

眞礶蠶焙

全蠍梢各一錢

麝

香字

▲臍風

臍者。小兒之根蒂也。名曰神闕。穴近三陰。喜溫惡涼。喜乾惡濕。如斷臍依法。臍風何自而起。惟不知慎重。以致水濕風冷之氣。入於臍中。兒必腹脹臍腫。日夜啼叫。此臍風之將作也。須急用驅風散治之。若寒邪深入。已成臍風者。又當視

其所兼之形症治之。如肚腹脹硬。大便不通者。風兼實也。黑白散主之。面青肢冷。二便不實者。風兼虛也。理中湯主之。痰涎壅盛。氣高喘急者。風兼痰也。辰砂蠶散主之。身體壯熱。面赤口乾者。風兼熱也。龍胆湯主之。面青嘔吐。曲腰多啼者。風兼寒也。益脾散主之。撮口唇青。抽搐不止者。風兼驚也。撮風散主之。若臍邊青黑。口噤不開者。是為內抽。不治。臍風見於一臘者。亦不治。一臘者。七日也。兒生七日。血脉未凝。病已中藏。治之無益。

驅風散

蘇葉

防風

陳皮

厚朴姜炒

枳殼麩炒

木香煨

僵蠶炒

鈎藤鈎

生甘草

黑白飲 治臍風氣實者。及急驚壯熱發搐。

黑牽牛半生半炒

白牽牛半生半炒

大黃生用

陳皮去白

檳榔各半兩

甘草炙三錢

元明粉二錢

益脾散

白茯苓

人參

草果煨

木香濕紙裹煨

甘草

陳皮

厚朴薑製

紫蘇子炒各等分

▲臍濕

兒生洗浴。不可久在水中。任意洗滌。既包裹畢。宜時常留意。勿令尿溼浸臍。如不知慎。遂致肚臍浸漬不乾。此卽所謂臍濕也。須以滲臍散敷之。若嬰兒臍中腫濕。經久不差。至百日卽危。

滲臍散

枯礬

龍骨各二錢煨

麝香少許

▲臍瘡

此因浴兒水入臍中。或尿溼褌袍。致臍中受濕。腫爛成瘡。或一旦解脫。爲風邪