

男
女
秘
密
病
自
醫
法

醫學士 汪企張 校閱
藥劑士 姚祖緒 著述

醫學實驗會出版
大東書局發行

民國八年十二月初版
民國九年三月一日再版

男女秘密病自醫法(全一冊)

定價大洋五角

外埠酌加郵費滙費

版權
所有
不准
翻印

著述者 藥劑士 姚昶緒

校閱者 醫學士 汪企張

發行者 中西醫學實驗會

印刷所 上海大東書局

總發行所 上海四馬路 大東書局



南京中医药大学图书馆版权所有

序

古有諱疾忌醫之說夫疾何所諱而醫何所忌哉推其說之由來或因疾之在秘密處耳我國風俗之習慣男子且然女子尤甚而按年以計夭折於冥冥之中者實不可以俚指數本會有鑒於此舉東西良方一一互參共酌實行經驗而後載諸於編其療治之關於秘密者無乎不備閱是書檢查卽是人自爲醫無所容其忌諱焉又何至有夭折之患哉爰識數語於簡首

民國八年十月朔日醫學實驗會會員王良知序



醫學士汪企張所以設秘密病室之由來

皮膚花柳生殖器諸症世人多不介意然而致命者比比皆是也嘗見古籍每稱疥癩擬之小患殊不知疥癩卽非直接致命之因而往往由其皮膚創處惡物侵入至潰爲癰腐爲疽間接可以致命至若花柳病之爲害禍子孫弱種族盡人知之更無庸鄙人喋喋也惟是皮膚花柳各症或多罹隱處或污穢難堪以世俗之憎愛遂生羞惡之觀念往往棄置不治終成劇症莫救以余歷年所見坐是致命者實繁有徒爲之浩歎茲姚君伯廉以世俗不可敝屣習慣不能廢除乃隨世俗心理編秘密病自醫諸法一書以爲患此類病者援救然有非醫不治者來商諸余思所以補濟之余謂醫本有秘守隱病之責爲道德保障是可置勿慮然世俗既深惡宣露且更不願負秘密病之名入醫者之門則我輩不妨在候診室之內設普通診治室其內更闢一秘密病套室旣不用標榜其密室來診者一如普通病人之人普通診治室受治不露絲毫形跡于同診病人言未已姚君鼓掌稱善爰卽刻日構成用以告秘

男女秘密病自醫法

醫學士汪企張所以設秘密病室之由來

二

密病之不能自治者

英大馬路貴州路口電話中央四四九〇 汪企張啟



凡例

一本書就男女習慣集常人所不肯就醫之病述其最簡單最效之療法故名曰秘密病自醫法

一本書係備普通人自療之用就病症之發見略說其原因凡精深之學說及治法須借手醫生者概不列入

一本書處方悉取材於東西各專門家之記載故注重原文置原名於前附譯名於後原文以拉丁名居多以其各國通用也間有取材於德文書籍者則用德文

一本書之處方各地大藥房均可照方配合

一本書中各處方之藥量悉用法國之瓦 *gramm* 量用小數法記之每瓦約我國二一分六厘

一本書中各處方之藥量悉爲壯年人而設小兒與老年人須酌量減少



男女秘密病自醫法目錄

卷一 男子部

一	白濁自醫法	一
二	下疳自醫法	二
三	橫痃自醫法	三
四	梅毒自醫法	四
五	遺傳梅毒自醫法	五
六	白濁漏膿眼自醫法	六
七	龜頭淋自醫法	七
八	肛門淋自醫法	八
九	預防白濁法	九
十	預防梅毒法	九
十一	預防下疳法	一〇
十二	男子白濁診斷法	一一
十三	梅毒診斷法	一一

十四	軟性下疳診斷法	一二
十五	陽萎自醫法	一二
十六	早泄自醫法	一四
十七	制止淫慾法	一五
十八	見色流精自醫法	一六
十九	酒後交合之害	一六
二十	經期中交合之害	一六
二十一	陰囊水腫自醫法	一七
二十二	睪丸不下自醫法	一七
二十三	包莖自醫法	一七
二十四	包皮上翻自醫法	一八
二十五	包皮紅腫自醫法	一九
二十六	陽物短小自醫法	一九
二十七	陽物強直自醫法	二〇
二十八	陰囊外傷自醫法	二一
二十九	陰囊象皮腫自醫法	二一

卷二 女子部

三十	手淫防止法……………	一二二	九	月經過多自醫法……………	五
三十一	遺精自醫法……………	一二二	十	經水過少自醫法……………	五
三十二	尿管狹小自醫法……………	一四	十一	經水白色自醫法……………	五
三十三	房事中受寒自醫法……………	二四	十二	經水黑色自醫法……………	五
三十四	陰部贅肉自醫法……………	二五	十三	痛經自醫法……………	六
三十五	寢小便自醫法……………	二五	十四	血奔自醫法……………	六
三十六	角虱自醫法……………	二六	十五	房事中子宮出血自醫法……………	七
一	預防白濁法……………	一	十六	子宮內翻自醫法……………	八
二	預防梅毒法……………	一	十七	子宮癌自醫法……………	九
三	預防下疳法……………	二	十八	陰道癌自醫法……………	九
四	白濁診斷法……………	二	十九	陰核癌自醫法……………	九
五	梅毒診斷法……………	二	二十	陰核肥大自醫法……………	一〇
六	軟性下疳診斷法……………	三	二十一	陰門狼瘡自醫法……………	一一
七	白帶自醫法……………	三	二十二	陰門白癬自醫法……………	一一
八	月經不調自醫法……………	四	二十三	陰門紅腫自醫法……………	一一
			二十四	陰門奇痒自醫法……………	一二

二十五	求姪法	一三
二十六	避姪法	一三
二十七	流產防止法	一四
二十八	子宮下垂自醫法	一五
二十九	會陰破裂自醫法	一六
三十	陰臭自醫法	一六
三十一	陰戶乾燥自醫法	一七
三十二	陰戶翻花自醫法	一七
三十三	鎖陰自醫法	一七
三十四	陰吹自醫法	一八
三十五	陰部生毛法	一八
三十六	異物誤入陰戶自醫法	一九
三十七	陰戶疼痛自醫法	一九
三十八	乳房痛自醫法	一九
三十九	乳癰自醫法	二〇

四十	乳癌自醫法	二一
四十一	放脚易大法	二一
四十二	放脚不使過大法	二二
四十三	處女鑑別法	二三

卷三 雜治部

一	頭髮美麗法	一
二	頭髮拳縮自醫法	二
三	預防白髮法	三
四	預防脫髮法	三
五	瘦者增肥法	三
六	肥者減瘦法	三
七	長身法	四
八	防生皺襞法	五
九	不眠症自醫法	五
十	嗜眠自醫法	六
十一	顏面黃斑除去法	七

十二 面皰自醫法……………八

十三 雀斑除去法……………八

十四 黑痣除去法……………九

十五 口臭自醫法……………一〇

十六 齒痛自醫法……………一〇

十七 睡中齒軋自醫法……………一一

十八 夢話自醫法……………一二

十九 齒牙潔白法……………一二

二十 指爪潔白法……………一三

二十一 油灰爪自醫法……………一三

二十二 狐臭自醫法……………一三

二十三 多屁自醫法……………一四

二十四 汗斑自醫法……………一五

二十五 手汗過多自醫法……………一五

二十六 脚汗過多即脚癬自醫法……………一六

二十七 爛脚自醫法……………一七

二十八 手足生繭自醫法……………一七

二十九 酒齶鼻自醫法……………一八

三十 油汗自醫法……………一九

三十一 鬚瘡自醫法……………一九

三十二 鬚髯不生法……………二一

三十三 小腸氣自醫法……………二一

三十四 痔瘡自醫法……………二二

三十五 內痔自醫法……………二三

三十六 痔瘻自醫法……………二三

三十七 頑癬自醫法……………二四

三十八 疥癬自醫法……………二四

三十九 疥瘡自醫法……………二六

四十 癩風自醫法……………二七

四十一 紅色陰癬自醫法……………二八

四十二 癩癧頭自醫法……………二八

四十三	禿髮症自醫法……………	三〇
四十四	匍行疹自醫法……………	三一
四十五	腦漏自醫法……………	三三
四十六	雞眼自醫法……………	三四
四十七	赤眼自醫法……………	三四
四十八	眼生星翳自醫法……………	三五
四十九	眼腐不生法……………	三五
五十	流淚自醫法……………	三五
五十一	耳出膿自醫法……………	三六
五十二	眉毛濃黑法……………	三六
五十三	火傷自醫法……………	三七
五十四	少年白髮病自醫法……………	三八
五十五	圓形脫髮症自醫法……………	三九
五十六	凍瘡自醫法……………	四一
五十七	濕疹自醫法……………	四二
五十八	大麻風自醫法……………	四五

五十九	狼瘡自醫法……………	四六
六十	坐斑瘡自醫法……………	四七
六十一	瘋疹自醫法……………	四八
六十二	乾癬自醫法……………	四九
六十三	紅色糠粃疹自醫法……………	五一
六十四	苔癬自醫法……………	五一
六十五	天泡瘡自醫法……………	五二
六十六	皮膚紅斑自醫法……………	五三
六十七	硬皮病自醫法……………	五三
六十八	白癜風自醫法……………	五四
六十九	魚鱗癬自醫法……………	五四
七十	皮痒症自醫法……………	五五
七十一	皮膚白嫩法……………	五五
七十二	肛門裂傷自醫法……………	五六
七十三	脫肛自醫法……………	五七
七十四	便血自醫法……………	五七

七十五	血尿自醫法	五八
七十六	酒醉速醒法	五八
七十七	煙艸中毒自醫法	六〇
七十八	頭風自醫法	六〇
七十九	頭痛自醫法	六一
八十	骨節酸痛自醫法	六一
八十一	胃痛立止法	六二
八十二	嘔吐立止法	六二
八十三	傷風自醫法	六二
八十四	頭暈自醫法	六三
八十五	暈船自醫法	六三
八十六	衄血自醫法	六三
八十七	失音自醫法	六四
八十八	呃逆自醫法	六四
八十九	黃疸病自醫法	六五
九十	萎黃病自醫法	六五

九十一	喘息自醫法	六六
-----	-------	----

男女
秘密病自醫法 卷上

醫學士 汪企張 校閱
藥劑士 姚昶緒 纂著

男子部

一 白濁自醫法

白濁由交媾而傳染。交媾後約經一星期至三星期。先覺龜頭癢而熱。後則泄尿時覺痛。不時漏出白色之膿液。且時有尿意。須及早醫治。若至六星期後。尙不治愈。不但終身無全治之望。且誘發種種危險之疾病。如尿道狹小、膀胱病、關節腫痛等。自醫之法。以內服爲便。可向藥房購下列諸方之藥服之。

Gonosan Capsul

古諾生丸

是爲治白濁之內服藥中最佳者。價甚貴。每三十粒一瓶。需一元六七角。每日服三次。每次服二粒。飯後用開水送下。外面之殼。係膠質所製。須一同服下。下記諸品。價順次低廉。効力亦順次減弱。服法與上同。

Capsul. ol Santali.

檀香油丸

Capsul. Gonosalvin.

古諾散爾文丸

Capsul. Balsam. Capaivae

古邦淮丸

此外再購下方之藥桿。每日朝夕二次。每次用一根。插入尿道中。能自熔。

Suppositoria protargol

坡洛他古尿道坐藥

下列諸條均須禁絕。若犯之。藥物難奏効力。

(一)禁交媾。 (二)禁烟酒。 (三)禁勞動。 (四)禁葱蒜姜椒等刺戟性食物。

白濁之濃液。性甚毒。若誤入眼內。數日即失明。故小便及插入藥桿後。宜用酒精清洗其手。

II 下疳自醫法

下疳有軟性與硬性之別。均由交媾而傳染。交媾後經二三日。龜頭或包皮即生紅點。後漸漸增大而潰爛。有痛且出薄膿者。爲軟性下疳。症較輕。治愈後無後患。自醫之法。每日數次。用五十倍硼酸 2% Bor. los 洗淨後。塗以下方之油藥。

Ung. Iodoform

20.0

沃度仿謨軟膏

110.0

用清潔之軟布包之。大約一二三星期即愈。

交媾後經三星期至六星期。始於龜頭或包皮。生硬塊。無痛無膿。亦不增大者。爲硬性下疳。症狀雖輕。實係梅毒最初之一現象。此硬塊消退後。隔數日或數星期。全身即發梅毒疹。故發生此硬塊時。一方塗以下方之油藥。使速消退。一方即請醫生注射六零六。免致全身發疹。難以隱匿。

Ung. Hydrargyri

10.0

水銀軟膏

10.0

III 橫痃自醫法

無論傳染白濁或軟性下疳或硬性下疳（即梅毒）後。均發生橫痃。惟白濁與軟性下疳之橫痃。痛甚劇。極易生膿。硬性下疳之橫痃。毫不覺痛。亦不生膿。能自消退。消退後。全身之梅毒疹發現矣。自醫之法。有痛者。初起時。即安靜。不可走動。塗以下方之藥水。或可望消退。

10% Ichthiol Alcohol

20.0

十倍伊天哇爾酒精

110.0