

公餘全集

毓靈琛藏

光

緒

乙未

刊行

陳修園先生晚餘三書

傷寒真方

歌括

括

宏道堂梓

序

醫之仲景歷矣六經之理至  
傷寒論宋矣自宋景濂學  
士創為紀全書之說而活之  
丙是書者任意刪移多抒臆  
說刀圭家苦無通鑑者閩

陳仲園前紫精杯  
醫經嘗取仲景傳  
寒鴻其旨要兮施辨  
確兮立方例簡兮未於以考  
復詳注其所述之妙未錄  
魏公庭先皇踐阼以殿之顧  
曰真方歌括漢共果得其解

是上衛生之一助也。足矣。引  
仲弓類不泥於徑而亦不背  
於法。神而明之則存乎其  
人矣。

咸豐己未重陽前二日後學

林壽萱謹序

傷寒真方歌括目錄

閩長樂陳念祖修圓著

東治林壽萱校

卷一

太陽上篇方法

太陽中篇方法

計歌括拾壹條

計歌括玖條

太陽下篇方法

太陽救誤變症方法

計歌括參條

計歌括拾捌條

卷二

陽明上篇方法

陽明中篇方法

計歌括拾條

計歌括肆條

陽明下篇方法

計歌括參條

卷三

少陽上篇方法

少陽中篇方法

計歌括陸條

計歌括參條

少陽下篇方法

計歌括壹條

卷四

太陰全篇方法

計歌括貳條

卷五

少陰全篇方法

治南林毒醫校

太陽計歌括陸條

卷六

厥陰全篇方

陰陽易差後勞復病方法

計歌括伍條

計歌伍條

末附魏念庭先生跋語

傷寒真方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

治南林壽萱校

太陽上篇方法

太陽爲寒水之經。主一身之膚表邪之初。傷必自太陽經始。論云。太陽爲病。脈浮頭項。強痛惡寒。統傷寒中風而言也。傷寒詳見中篇

茲請先別中風之病。論云。太陽病。發熱。汗出。惡風。脈浮緩。或見鼻鳴。乾嘔者爲中風病。主以桂枝湯服。湯啜粥得。漒漒微似汗。則愈。若服桂枝湯大汗出不解。所以然者。以風邪得微汗。則除。得大汗。反不除病。不去。則變浮緩之脈。而爲洪大。仍用桂枝湯取微似汗。則愈。倘若不愈。則病如瘧。狀日再發。邪淺欲散宜桂枝二。麻黃一。湯撤其餘邪。則全

愈矣。○前症是汗後餘邪未盡。以小劑爲緩汗法。此症是過經不解。不可不汗。故制此湯以急汗之。不可大汗。故制小劑以小汗之人知。大劑急汗之法。而不知小劑亦有急汗之法也。○若太陽病得之八。九日。頭痛頂強。雖曰久而未去。熱多寒少。往來如瘧。而頻發。本論云二度是邪淺而欲衰。面上反有熱色。身癢必得少汗而全愈。宜桂枝。麻黃各半。湯主之。○桂枝症面兼喘者。宜桂枝加厚朴杏仁湯主之。○若燒針針處核起。因驚而發奔豚者。宜灸其核。以桂枝加桂湯主之。○若奔豚症欲作未作。其悸只在臍下者。宜茯苓桂枝甘草大棗湯主之。○若悸在心下。义手冒心者。因發汗過多所致。宜桂枝甘草湯主之。○若悞汗遂漏不止。惡風。小便難。四肢拘急者。宜桂枝加附。

子湯主之。○若桂枝症誤下之後胸滿者是陰邪盛于陽位恐芍藥附和陰氣宜桂枝去芍藥湯急散之。若兼惡寒者恐薑桂力微宜桂枝去芍藥加附子湯以溫散之。○若汗後陽虛陰氣凝聚身痛者以桂枝新加湯行其陽氣。○又有太陽傳入本腑症發熱六七日不解煩渴飲水水入卽吐小便不利者宜五苓散表裏兩解之。又有太陽裏症而表邪自在下後心下滿小便不利者宜桂枝去桂加茯苓白朮湯利水則表邪自化此皆太陽症虛邪之方法也。

桂枝湯

成功。

發熱自汗是傷風桂葛生薑芍棗逢頭痛項強浮緩脈必須稀粥合

芍藥桂枝生薑各三錢。炙草三錢。大棗四枚。水煎溫服。須臾啜稀粥。溫覆取微似汗。○此方最切於時用。中風汗自出者用之。服麻黃湯復煩者用之。下後脈仍浮者用之。氣沖利不止者用之。陰症脈浮為欲愈亦用之。

桂草辛甘化陽助太陽融會肌氣。芍草苦甘養陰啟少陰莫安營血。薑佐桂枝行陽棗佐芍藥行陰。此方本不發汗藉熱粥之力充胃氣以達於肺令風邪從皮毛而解。不傷氣血為諸方之冠。

時醫以桂枝湯麻黃湯地非此方時。非冬月。戒不敢用。以羌獨蕘。苦荆防代之。而不知此等藥更燥烈害人也。桂枝湯以桂枝為君。色赤人心生血。得芍藥之苦以和之。為陰陽調和之劑。麻黃湯以

麻黃爲君。比物輕清走表。絕無辛烈之味。悍濁之氣。又佐之桂枝。入心化液。杏仁入肺降氣。甘草安內攘外。不加薑之上行棗之留中。逕走肌表。不傷津液。觀蒼苔羌獨之類。孰和平。孰峻烈耶。

桂枝二麻黃一湯。

汗出不徹邪還襲。如瘧頻來時。翕翕桂枝湯二二麻黃。表後脈洪籍此輯。

桂枝一錢三分。芍藥生薑各一錢。炙草七分。麻黃七分。杏仁十六箇。

大棗一枚。先煮麻黃去沫。後入諸藥溫服。○此是麻黃症。只用桂枝湯。汗不徹之故。故又作此湯。再解其肌。微解其表。此又桂枝後。更用麻黃法也。○按柯韻伯云。麻黃湯桂枝湯兩方。各煎聽用。加各半湯。

則各取其半而合服之。此湯則取桂枝湯一分，麻黃湯一分，合而服之。猶水陸之師各有節制，兩軍相爲表裏，異道夾攻之義也。後人等其分兩合爲一方，與葛根青龍輩何異？

桂枝麻黃各半湯

面熱身癢，感雖輕，小汗輕施，顧衛營。麻杏桂薑芍棗草減之，各半定方名。

桂枝一錢三分。  
芍藥生薑炙草麻黃各八分。  
杏仁七枚。  
大棗一枚半。

先煎麻黃去沫，入諸藥煎溫服。○此方原小劑治欲退之餘邪，活人借用之，以代解肌諸方。

桂枝加厚朴杏仁湯。

桂枝厚朴杏仁湯諸喘皆須疎利方誤下喘成還用此去邪下氣本相當。

卽桂枝湯加厚朴各一錢

杏仁十四枚

五分

○論云喘家作桂枝湯加厚

朴杏仁主之言本然之喘也又云太陽症下之微喘者表未解也此

湯主之言誤下之喘也

本風桂枝加附子湯 照桂枝湯加附各一錢。

桂枝加桂湯 照桂枝湯加桂二錢

太陽誤下遂拘急湯本杜仲加附子更有桂起作奔豚桂枝加桂湯  
宜察名遠漏症乃汗多脫液陽虛之候此方固陽即所以止汗止汗即所以救液此桂枝加附子湯歌也。  
○又加桂枝者取味重則能達下也○此桂枝加桂湯歌也。

茯苓桂枝甘草大棗湯

欲作奔豚臍下悸。八錢茯苓桂枝四二甘四棗水甘瀉直伐腎邪安內志。

茯苓八錢桂枝四錢甘草二錢大棗四枚取水揚三五百遍名甘瀉

水用甘瀉水三杯先煮茯苓至二杯入諸藥煮七分溫服○此方安腎以鎮水使水不凌心補脾以制水使水不泛溢

桂枝甘草湯

人手冒心因過汗心下悸動欲得按桂枝炙草合辛甘斂液安心固汗漫

桂枝四錢炙草二錢水煎服○辛從甘化陽中有陰故能補陽以止

汗。生心液而定悸。

桂枝去芍藥湯。○卽桂枝湯去芍藥。誤下後胸滿是陰邪盛於陽位。用此湯急散之。不用芍藥者。恐其寒性下行。領陰邪入於腹中。而爲腹滿等症也。○桂枝去芍藥加附子湯。○卽前方加附子一錢。○惡寒爲陰氣凝聚。恐薑桂力薄。故加附子。○按此卽下篇桂枝附子湯方也。但分兩不同。主治遂別。而方名亦因以異耳。

桂枝去芍因胸滿。脈促令平舒上脘。若稍惡寒。陽弱。速加附子。不客緩。

按喻嘉言謂陽邪盛於陽位。故胸滿脈促。不知陽邪胸滿多兼喘。