

全国卫生专业技术资格考试丛书

2014

护理学专业 (护师)

资格考试全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编写

赠

条码见封底

- ✓ 2013 年考试试题选编
- ✓ 2014 年考试全真模拟卷 2 套
- ✓ 200 元网上学习费用



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

护理学专业（护师） 资格考试全真模拟及精解

北京大学医学部专家组 编写

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (护师) 资格考试全真模拟及精解/北京大学医学部
专家组编. —3 版. —北京: 北京大学医学出版社, 2013. 11
(全国卫生专业技术资格考试丛书)
ISBN 978-7-5659-0660-2

I. 护… II. 北… III. 护理学-护士-资格考核-题解
IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 234012 号

护理学专业 (护师) 资格考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学医学部专家组
出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)
地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内
网 址: <http://www.pumpress.com.cn>
E-mail: booksale@bjmu.edu.cn
印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司
经 销: 新华书店
责任编辑: 刘 燕 李 娜 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生
开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 15.75 字数: 394 千字
版 次: 2013 年 11 月第 3 版 2013 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5659-0660-2
定 价: 39.00 元
版权所有, 违者必究
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

全国卫生专业技术资格考试丛书——

护理学专业（护师）系列

《全国卫生专业技术资格考试丛书》——护理学专业（护师）系列是北京大学医学出版社组织北京大学护理学院专家编写的全国首套针对护理学专业（护师）资格考试的考前辅导用书。本丛书从2004年启动，根据考生的个性需求，品种逐年增多；根据大纲变化和考生反馈，内容持续更新。

2013年考试大纲新增“医疗机构从业人员行为规范”，“医学伦理道德”的要求由“了解”改为“熟悉”。

《护理学专业（护师）资格考试全真模拟及精解》根据考试大纲全新改版，按照考试形式分卷编写，题后附有答案解析和出题思路分析。有助于考生全真模拟考试环境，透析命题规律，提高应试技巧。

本书是“全国卫生专业技术资格考试——护理学专业（护师）”考生的考前必备用书。

编者

2013年9月

【双核系列】

● 护理学专业（护师）资格考试核心考点

本书精选近千个核心考点，并附有“考点串联”和“名师点拨”板块，总结了作者多年的教学和考前培训经验。开本适宜，便于携带。

● 护理学专业（护师）资格考试核心2000题

本书按照考试形式分卷编写，精选两千多道试题，试题后直接附答案及解析，便于考生有针对性地复习。

全国卫生专业技术资格考试丛书—— 护理学专业（护师）系列

【经典系列】

- ◎ 护理学专业（护师）资格考试应试指导
紧扣最新大纲，精炼展现大纲内容。
- ◎ 护理学专业（护师）资格考试习题集
习题质量高，题量丰富，涵盖大纲全部考点。
- ◎ 护理学专业（护师）资格考试全真模拟及精解
全真模拟考试情景，答案后附有解析，帮助考生了解考题的难易度和考点分布。
- ◎ 护理学专业（护师）资格考试历年考题汇编及精解
汇总历年考试真题，专家解析。根据真题会重复出现的规律反复练习，可帮助考生透析命题规律，提高应试技巧。

【双核系列】

- ◎ 护理学专业（护师）资格考试核心考点
本书精选近千个核心考点，并附有“考点串联”和“名师点拨”板块，总结了作者多年的教学和考前培训经验。开本适宜，便于携带。
- ◎ 护理学专业（护师）资格考试核心 2000 题
本书按照考试形式分卷编写，精选两千多道试题，试题后直接附答案及解析，便于考生有针对性地复习。

护理学专业（护师） 资格考试全真模拟试卷（一）

目 录

护理学专业（护师）资格考试全真模拟试卷（一）	(1)
全真模拟试卷（一）答案及精解	(45)
护理学专业（护师）资格考试全真模拟试卷（二）	(83)
全真模拟试卷（二）答案及精解	(127)
护理学专业（护师）资格考试全真模拟试卷（三）	(163)
全真模拟试卷（三）答案及精解	(211)

1. 患者，女，22岁，给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作，诊断为哮喘。引起该患者哮喘发作最可能的过敏原是

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 动物毛屑
- D. 病毒感染
- E. 细菌感染

2. 妊娠期妇女出现最早、最重要的症状是

- A. 尿频
- B. 呕吐
- C. 停经
- D. 乳头刺痛
- E. 乳房轻度胀痛

3. 小儿先能抬头后能坐，之后能走，是遵循了下列哪项发育顺序

- A. 由上到下的顺序
- B. 由近到远的顺序
- C. 由粗到细的顺序
- D. 由低级到高级的顺序
- E. 由简单到复杂的顺序

4. 临床用途最广的皮片是

- A. 刃厚皮片
- B. 薄形皮片

5. 患者，男，31岁，因高热、咽痛就诊，扁桃体可见脓性分泌物。诊断为扁桃体炎。该病主要病原体是

- A. 螺旋体
- B. 衣原体
- C. 细菌
- D. 病毒
- E. 支原体

6. 属于外源性致癌因素的是

- A. 放射线
- B. 遗传因素
- C. 内分泌因素
- D. 免疫因素
- E. 心理因素

7. 宫颈糜烂的好发部位是

- A. 宫颈阴道部
- B. 宫颈鳞-柱状上皮交界处
- C. 宫颈管内
- D. 宫颈部
- E. 宫颈外口

8. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是

- A. 吸烟
- B. 肿瘤
- C. 感染
- D. 变态反应
- E. 辐射

9. 有关胎盘早剥的叙述，正确的是

- A. 是指前置胎盘在胎儿娩出后从子宫壁剥离
- B. 是指正常位置的胎盘在胎儿娩出前从子宫壁剥离
- C. 多发生于妊娠 28 周后
- D. 分娩期不易发生
- E. 对孕妇无影响

10. 肺炎链球菌肺炎最主要的感染途径是

- A. 空气吸入
- B. 血行播散
- C. 淋巴液播散
- D. 上呼吸道定植菌误吸
- E. 邻近感染部位蔓延

11. 急性乳腺炎常见的致病菌为

- A. 溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 厌氧菌
- E. 肺炎链球菌

12. 风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄患者容易并发血栓栓塞的主要原因是

- A. 肺循环淤血
- B. 下肢静脉淤血
- C. 肺动脉淤血
- D. 血管本身病变
- E. 心房颤动导致栓子形成

13. 急性心肌梗死的发病机制是

- A. 病毒感染
- B. 冠状动脉暂时性痉挛
- C. 冠状动脉完全闭塞
- D. 肺动脉供血不足
- E. 主动脉供血不足

14. 婴儿期每日每公斤体重所需能量为

- A. 140kcal
- B. 130kcal
- C. 120kcal
- D. 110kcal
- E. 100kcal

15. 急性心肌梗死患者发生左心衰竭的主要

原因是

- A. 肺部感染
- B. 心脏负荷加重
- C. 房室传导阻滞
- D. 情绪激动
- E. 心肌收缩力减弱和不协调

16. 有机磷农药中毒后出现毒蕈碱样症状的原因是

- A. 农药直接兴奋交感神经
- B. 农药直接兴奋迷走神经
- C. 锥体束受损
- D. 脊髓前角炎
- E. 乙酰胆碱蓄积

17. 容易引起急性肾衰竭的损伤是

- A. 挫伤
- D. 扭伤
- C. 挤压伤
- D. 裂伤
- E. 刺伤

18. 患者，男，59 岁，主因间断胸骨后闷痛，门诊初步诊断为冠心病、稳定型心绞痛。据此可以判断下述胸痛的诱因中，与该患者病情不符的一项是

- A. 体力劳动
- B. 饱餐
- C. 受寒
- D. 睡眠
- E. 吸烟

19. 下列属于肝硬化患者发生肝性脑病诱发因素的是

- A. 吃甜食
- B. 上消化道出血
- C. 饮浓茶
- D. 低蛋白饮食
- E. 3 天排便 1 次

20. 乙肝疫苗第一次接种的年龄是

- A. 出生时
- B. 1 个月
- C. 2 个月
- D. 3 个月

- E. 6 个月
21. 与消化性溃疡发病相关的损害性因素中, 占主导的是
- 幽门螺杆菌感染
 - 饮食失调
 - 吸烟
 - 精神因素
 - 胃酸、胃蛋白酶
22. 有关糖尿病对孕妇的影响, 不正确的是
- 受孕率较高
 - 流产率较高
 - 妊娠期高血压疾病发生率较高
 - 手术产率较高
 - 羊水过多发生率较高
23. 肝的营养供应来源是
- 肝动脉
 - 肝动脉和门静脉
 - 肝静脉
 - 门静脉
 - 下腔静脉
24. 患者, 男, 42 岁, 饱餐后出现上腹持续性疼痛并向腰背部放射, 伴恶心、呕吐, 诊断为急性胰腺炎。入院后收集的资料中提示该患者发病原因的是
- 其父亲因冠心病去世
 - 平时喜食素食
 - 不嗜烟酒
 - 有胆绞痛史
 - 24 岁时做过阑尾手术
25. 肾结核的原发病灶主要在
- 骨关节
 - 肺
 - 肠道
 - 淋巴结
 - 腹膜
26. 慢性再生障碍性贫血的类型属于
- 大细胞正常色素性贫血
 - 大细胞高色素性贫血
 - 正常细胞性贫血
 - 小细胞低色素性贫血
 - 小细胞正常色素性贫血
27. ABO 血型不合引起的新生儿溶血症最常见于
- 母亲为 O 型, 新生儿为 A 型
 - 母亲为 A 型, 新生儿为 B 型
 - 母亲为 B 型, 新生儿为 A 型
 - 母亲为 A 型, 新生儿为 O 型
 - 母亲为 AB 型, 新生儿为 O 型
28. 婴儿营养不良的主要原因是
- 喂养不当
 - 患传染病
 - 双胎早产
 - 生长发育迅速
 - 消化系统结构或功能异常
29. 高血压脑出血最常见的发病部位为
- 延髓
 - 脑室
 - 小脑
 - 壳核
 - 脑叶
30. 颅内压增高时机体的生理反应不包括
- 脑脊液分泌减少
 - 呼吸加快
 - 心率减慢
 - 血压升高
 - 脑脊液吸收增加
31. 开放性气胸产生纵隔扑动的主要原因是
- 患侧肺萎缩
 - 健侧肺膨胀不全
 - 纵隔移向健侧
 - 呼吸时两侧胸膜腔内的压力改变
 - 患侧胸膜腔内压力超过大气压
32. 急性白血病患者缓解期出现中枢神经系统白血病的主要原因是
- 免疫功能低下
 - 多数化疗药不能通过血脑屏障
 - 疗程不够
 - 化疗药剂量不足
 - 对化疗药产生耐药性
33. 苍白密螺旋体感染所致的疾病是

- A. 淋病
B. 梅毒
C. 宫颈癌
D. 尖锐湿疣
E. 生殖器疱疹
34. 妊娠期高血压疾病最基本的病理变化是
A. 胎盘绒毛退行性变化
B. 水钠潴留
C. 全身小动脉痉挛
D. 弥散性血管内凝血
E. 肾小管重吸收功能降低
35. 与静脉麻醉相比，吸入麻醉的优点是
A. 诱导迅速
B. 操作方便
C. 药物安全、无爆炸性
D. 对呼吸道无刺激
E. 容易调节麻醉深度
36. 脑血栓形成的最常见原因是
A. 脑动脉粥样硬化
B. 糖尿病
C. 高脂血症
D. 高血压
E. 贫血
37. 患儿，男，8岁，近半年来常感觉体力活动后容易疲乏。学校体检发现：血红蛋白为82g/L，则该患儿的贫血程度属于
A. 无贫血
B. 轻度贫血
C. 中度贫血
D. 重度贫血
E. 极重度贫血
38. 维持细胞外液渗透压的重要离子是
A. K^+
B. Na^+
C. Mg^{2+}
D. H^+
E. Ca^{2+}
39. 休克早期相当于微循环改变的
A. 微循环收缩期
B. 微循环痉挛期
C. 微循环扩张期
D. 微循环衰竭期
E. 微循环抑制期
40. 肾单位是肾结构和功能的基本单位，其主要组成部分是
A. 肾小球和肾小囊
B. 肾小体和集合管
C. 肾小球和肾小管
D. 肾小体和肾小管
E. 皮质和髓质
41. 重症肺炎和轻型肺炎的区别是
A. 持续高热
B. 唇周发绀，伴三凹征
C. 肺实变体征
D. 咳嗽、气促明显
E. 中毒症状明显，并累及全身其他系统
42. 下列关于肾性高血压的描述不正确的是
A. 肾性高血压绝大多数是容量依赖型
B. 限制水钠摄入可改善肾性高血压
C. 肾性高血压可加重肾功能损害
D. 肾性高血压一般不会引起高血压脑病
E. 肾性高血压具有原发性高血压的一般症状
43. 小儿重度脱水丢失水分占体重的百分比为
A. $<5\%$
B. $5\% \sim 7\%$
C. $8\% \sim 10\%$
D. 10% 以上
E. 20% 以上
44. 正常育龄妇女的骨盆出口横径平均值是
A. 7.5cm
B. 8cm
C. 8.5cm
D. 9cm
E. 9.5cm
45. 系统性红斑狼疮最容易受损的部位是
A. 大脑

- B. 心脏
C. 肾
D. 脾
E. 肺
46. 有关孕激素的作用, 正确的是
A. 促进子宫发育
B. 促使乳腺管增生
C. 使宫颈黏液变稀薄
D. 促进阴道上皮角化
E. 使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜
47. 一个 3 岁小儿平均血压的正常值是
A. 60/40mmHg
B. 86/58mmHg
C. 96/60 mmHg
D. 100/60mmHg
E. 110/80mmHg
48. 使肾病综合征病情加重或复发的最常见诱因是
A. 感染
B. 焦虑
C. 活动增多
D. 暴饮暴食
E. 蛋白质摄入不足
49. 类风湿关节炎引起自身免疫反应的因素是
A. 自身抗体 IgM
B. 外源性抗体
C. 自身抗体 IgA
D. 胶原蛋白
E. II 型胶原抗体
50. 小儿时期最常见的贫血为
A. 大细胞性贫血
B. 正细胞性贫血
C. 营养性缺铁性贫血
D. 营养性巨幼红细胞贫血
E. 再生障碍性贫血
51. 2 个月以下小婴儿化脓性脑膜炎最常见的病原体是
A. 水痘病毒
B. 肺炎链球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
E. 轮状病毒
52. 甲状腺功能亢进最主要的病因是
A. 精神刺激
B. 细菌感染
C. 过度劳累
D. 自身免疫
E. 外部创伤
53. 在我国引起门静脉高压症的主要原因是
A. 酒精性肝硬化
B. 门静脉畸形
C. 肝炎后肝硬化
D. Budd - Chiari 综合征
E. 肝外门静脉血栓形成
54. 水痘患儿应隔离至
A. 出疹后 5 天
B. 出疹后 10 天
C. 出疹后 15 天
D. 部分皮疹结痂
E. 全部皮疹结痂
55. 细菌性肝脓肿最常见的感染途径是
A. 胆道感染
B. 经开放性伤口
C. 经血液循环
D. 经淋巴途径
E. 细菌栓子脱落进入
56. 甲状腺功能亢进患者的大便次数多, 是因为
A. 肠蠕动过快
B. 甲状腺素过少
C. 高热
D. 饮水过多
E. 进食过多
57. 导致“功血”患者子宫内膜不规则脱落的直接发病机制是
A. 黄体过早衰退
B. 黄体萎缩不全
C. 黄体发育不良
D. 无黄体形成

- E. 无排卵
58. 高位截瘫是由于损伤了
- A. 颈段脊髓
- B. 胸段脊髓
- C. 腰段脊髓
- D. 骶尾段脊髓
- E. 马尾神经
59. 妊娠期妇女生殖系统的生理变化特点是
- A. 外阴变薄，弹性增加
- B. 阴道皱襞减少
- C. 子宫颈分泌物减少
- D. 足月时子宫容积可达 1000ml
- E. 无排卵
60. 急性腹膜炎发生休克的主要原因是
- A. 剧烈疼痛
- B. 腹膜吸收大量毒素，血容量减少
- C. 肠内积液刺激
- D. 大量呕吐致液体丢失
- E. 腹胀引起呼吸困难
61. 实质性脏器破裂时，腹腔内血液不凝固的主要原因是
- A. 血液被腹膜渗液稀释
- B. 凝血因子生成障碍
- C. 凝血酶原减少
- D. 出血量大
- E. 腹膜的脱纤维作用
62. 关于绒毛膜癌的病理改变，正确的是
- A. 为蜕膜组织，未见绒毛结构
- B. 腺体增生，并有不典型细胞
- C. 绒毛结构及滋养细胞增生和分化不良
- D. 滋养细胞极度不规则增生，未见绒毛结构
- E. 滋养细胞增生，间质水肿，间质内胎源性血管消失
63. 急性化脓性骨髓炎多见于
- A. 儿童
- B. 老年男性
- C. 老年女性
- D. 青壮年男性
- E. 青壮年女性
64. 异位妊娠发生的部位最常见于
- A. 宫颈
- B. 子宫残角
- C. 腹腔
- D. 卵巢
- E. 输卵管
65. 单纯性甲状腺肿的主要病因是
- A. 碘缺乏
- B. 自身免疫反应
- C. 甲状腺素需要量增高
- D. 甲状腺素合成障碍
- E. 甲状腺素分泌障碍
66. 腹外疝内容物最常见的是
- A. 小肠
- B. 盲肠
- C. 大网膜
- D. 阑尾
- E. 膀胱
67. 肛瘘形成的主要原因是
- A. 肛裂
- B. 内痔
- C. 外痔
- D. 直肠肛管周围脓肿
- E. 直肠脱垂
68. 分泌胃蛋白酶的胃黏膜细胞是
- A. 主细胞
- B. 壁细胞
- C. 黏液细胞
- D. G 细胞
- E. 嗜银细胞
69. 医务人员在医疗实践中，有责任为患者的隐私保密，这主要是体现医学伦理原则中的
- A. 尊重原则
- B. 有利原则
- C. 不伤害原则
- D. 公正原则
- E. 人道主义原则
70. 患者，男，46 岁，慢性肾炎病史 5

- 年,病情稳定。近1周来,受凉后出现发热、咳嗽等表现,自行服药,效果欠佳,遂来就诊。查体示双侧眼睑水肿,双下肢水肿(+);实验室检查示Hb 120g/L,血BUN 18.9mmol/L, Cr 340mol/L。导致该患者病情加重的原因是
- 劳累
 - 高血压
 - 感染
 - 服用肾毒性药物
 - 水肿
71. 某初产妇,足月妊娠,破膜12小时临产,因持续性枕后位行产钳助产,产后出血不多。产后第5天体温为37.8~38.7℃,两乳稍胀,但无肿块,宫底脐下2cm,轻压痛,血性恶露,量多有臭味,会阴切开伤口已愈合。该产妇最可能的临床诊断是
- 早期乳腺炎
 - 会阴侧切伤口感染
 - 阴道炎
 - 急性子宫内膜炎
 - 扁桃体炎
72. 长途行军导致第2、3跖骨骨折属于
- 直接暴力
 - 间接暴力
 - 肌肉牵拉
 - 疲劳性骨折
 - 病理性骨折
73. 患者,男,34岁,蛛网膜下腔阻滞下行阑尾切除术,术后发生尿潴留,其最主要的原因是
- 手术部位疼痛
 - 不习惯病室排尿
 - 不习惯卧床排尿
 - 精神紧张
 - 麻醉反应
74. 患者,男,46岁,因溃疡病致幽门梗阻,每天晚饭前出现呕吐,量大,为宿食。该患者最易出现的电解质紊乱是
- 低钾低氯性代谢性酸中毒
 - 低钾低氯性代谢性碱中毒
 - 低钾高氯性代谢性酸中毒
 - 低钾高氯性代谢性碱中毒
 - 高钾高氯性代谢性酸中毒
75. 某术前患者,医嘱术前30分钟给予阿托品肌内注射,其目的是
- 稳定情绪
 - 提高痛阈
 - 减少麻醉药物毒副作用
 - 减少呼吸道分泌物
 - 解除平滑肌和血管痉挛
76. 患儿,女,9岁,多饮、多食、多尿,消瘦2个月。查空腹血糖13mmol/L,尿糖(++++) ,尿酮体(+)。该病的主要病理生理机制是
- 胰岛素绝对缺乏
 - 胰岛素相对缺乏
 - 胰岛素受体缺乏
 - 胰岛素亲和力下降
 - 胰岛素受体抗体产生
77. 8个月患儿,面黄来诊。诊断为营养性巨幼红细胞贫血,下列处理正确的是
- 预防发生心功能不全
 - 口服胃蛋白酶
 - 口服维生素C
 - 口服铁剂
 - 肌肉注射维生素B₁₂
78. 患者,男,19岁,1天前出现脐周疼痛,呈阵发性,约5小时后疼痛转移并固定于右下腹部,诊断为急性阑尾炎,该患者在发病开始时表现为脐周疼痛的机制为
- 阑尾尖端指向脐周或上腹部
 - 胃肠功能紊乱
 - 内脏神经反射
 - 体神经反射
 - 阑尾位置
79. 患者,男,45岁,肝硬化腹水患者,拟

行肠内营养支持，宜选择的肠内营养制剂是

- A. 必需氨基酸配方
- B. 高糖配方
- C. 低蛋白配方
- D. 高支链氨基酸配方
- E. 高维生素配方

80. 患者，女，28岁，第一胎，孕33周。产科检查：触诊胎头在腹部右侧，胎臀在腹部左侧。胎心在脐周听到。胎先露为

- A. 枕先露
- B. 肩先露
- C. 面先露
- D. 足先露
- E. 臀先露

81. 5岁女童，2周前患咽扁扁桃体炎，近日因眼睑水肿来医院就诊，以急性肾小球肾炎收入院，其前驱感染的病原体是

- A. A族乙型溶血性链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 念珠菌

82. 患者，女，48岁，G₃P₂。近2年来月经周期不规则、持续时间长、经量增加。其向门诊护士咨询避孕措施，护士应指导其选用

- A. 阴茎套
- B. 长效避孕针
- C. 宫内节育器
- D. 安全期避孕
- E. 短效口服避孕药

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每道题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方

框涂黑。

(83~85题共用题干)

患者，男，30岁，咳嗽、咳痰8年，心悸、气急2年，3天前受凉后咳嗽、咳痰加重，咳脓性痰，呼吸困难不能平卧，伴发热、烦躁。查体：神志模糊，嗜睡，明显发绀，颈静脉充盈，桶状胸，双下肢轻度水肿，肝颈静脉回流征阳性，三尖瓣区收缩期杂音，双肺广泛湿啰音。血气分析：pH 7.56，PaCO₂ 60mmHg，PaO₂ 49mmHg。

83. 此患者最可能的诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 支气管扩张
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性肺源性心脏

84. 此时患者出现的并发症是

- A. 休克
- B. 肺性脑病
- C. 脑血管意外
- D. 感染中毒性脑病
- E. 弥散性血管内凝血

85. 此患者目前最重要的护理措施是

- A. 改善通气和低流量吸氧
- B. 遵医嘱正确给予抗感染治疗
- C. 注重患者的营养摄入
- D. 协助患者呼吸训练
- E. 注重患者的心理护理

(86~87题共用题干)

患者，男，30岁，因急性肠梗阻频繁呕吐，出现口渴、尿少、口唇黏膜干燥、眼窝凹陷、血压偏低。

86. 该患者的脱水类型为

- A. 高渗性脱水
- B. 原发性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 继发性脱水
- E. 等渗性脱水

87. 此类型脱水丢失的是

- A. 水为主
- B. 钠为主
- C. 水与钠比例相当
- D. 钾为主
- E. 钙为主

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑, 每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(88~90 题共用备选答案)

- A. 细数脉
- B. 无脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 奇脉

88. 主动脉瓣关闭不全患者的脉搏是

89. 休克患者的脉搏是

90. 左心衰竭患者的脉搏是

(91~93 题共用备选答案)

- A. 机械性单纯性肠梗阻
- B. 机械性绞窄性肠梗阻
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 痉挛性肠梗阻
- E. 血运性肠梗阻

91. 急性弥漫性腹膜炎时出现的肠梗阻多属于

92. 慢性铅中毒引起的肠梗阻多属于

93. 由于肠壁肿瘤致肠腔狭窄引起的肠梗阻多属于

(94~96 题共用备选答案)

- A. 胎龄满 42 周
- B. 出生体重 4200g
- C. 出生体重在同胎龄儿平均体重的第 85 百分位
- D. 胎龄 37 周, 出生体重 2400g
- E. 胎龄 36 周, 出生体重 2600g

94. 属于巨大儿的是

95. 属于适于胎龄儿的是

96. 属于足月小样儿的是

相关专业知识卷

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列关于浅昏迷的描述错误的是
A. 血压、脉搏、呼吸多无变化
B. 无自主运动
C. 压迫眶上神经有痛苦表情
D. 角膜反射消失
E. 大小便失禁或潴留
2. 下列疾病中，可闻及两肺底湿啰音的是
A. 肺结核
B. 肺脓肿
C. 支气管扩张症
D. 肺淤血
E. 急性肺水肿
3. 属于肿瘤定性诊断方法的是
A. 肝肾功能检查
B. X 线检查
C. 病理检查
D. CT
E. MRI
4. 诊断乳房深部脓肿的依据主要是
A. 皮肤红肿
B. 乳房胀痛
C. 发热
D. 局部波动感
E. 穿刺抽到脓液
5. 关于催产素静脉滴注，正确的是
A. 用于协调性子宫收缩乏力，以加强宫缩
B. 用于胎儿窘迫，需尽快结束分娩的产妇
C. 滴注的速度及剂量始终保持一致
D. 教会孕妇自己调节滴速
E. 用于经产妇引产更敏感
6. 引起核黄疸的血清胆红素浓度一般超过
A. 10mg/dl
B. 12mg/dl
C. 15mg/dl
D. 20mg/dl
E. 25mg/dl
7. 治疗重度妊娠高血压综合征首选的药物是
A. 硫酸镁
B. 异丙嗪
C. 氯丙嗪
D. 苯巴比妥
E. 异戊巴比妥
8. 新生儿肺透明膜病胸部 X 线片表现较特异，可见
A. 两肺透光度增强
B. 两侧肺纹理增粗
C. 支气管充气征
D. 肺大泡
E. 两肺小斑片状阴影
9. 右心室增大时，其心尖搏动的位置
A. 向左移位
B. 向右移位
C. 向右下移位
D. 向左上移位
E. 向左下移位
10. 肠梗阻患者非手术治措施中最重要的
是
A. 禁食
B. 胃肠减压
C. 补液
D. 半卧位
E. 应用抗生素

11. 肠痿患者最常见的电解质紊乱是
 - A. 低钾、低钠
 - B. 低钾、高钠
 - C. 高钾、高钠
 - D. 高钾、低钠
 - E. 低钾、钠正常
12. 硫酸镁治疗妊娠期高血压疾病剂量过大时, 最先出现的毒性反应是
 - A. 血压过低
 - B. 呼吸减慢
 - C. 心率减慢
 - D. 膝反射减弱或消失
 - E. 尿量过少
13. 进行内生肌酐清除率检查前 3 日的饮食是
 - A. 高热量饮食
 - B. 高蛋白饮食
 - C. 无肌酐饮食
 - D. 多纤维素饮食
 - E. 正常饮食
14. 维生素 D 缺乏性手足抽搐症发作时的急救处理首选
 - A. 葡萄糖酸钙静脉滴注
 - B. 甘露醇快速静脉滴注
 - C. 维生素 D₃ 肌肉注射
 - D. 高浓度氧面罩吸入
 - E. 地西洋肌肉注射
15. 给营养不良患儿肌肉注射苯丙酸诺龙的目的是
 - A. 增加机体的抵抗力
 - B. 促进脂肪合成代谢
 - C. 增强机体的糖代谢功能
 - D. 促进营养物质的消化吸收
 - E. 促进体内蛋白质的合成
16. 高钾血症患者静脉注射葡萄糖酸钙的主要目的是
 - A. 补充钙剂
 - B. 纠正酸中毒
 - C. 对抗钾离子对心肌的抑制作用
 - D. 降低神经肌肉的应激性
 - E. 降低血钾
17. 抗休克最首要的治疗措施是
 - A. 积极处理原发疾病
 - B. 及时纠正酸碱平衡失调
 - C. 早期应用血管活性药物
 - D. 及时、快速、足量补充血容量
 - E. 应用强心药以增加心肌收缩力
18. 患者, 男, 56 岁, 近 2 个月来低热、咳嗽、咳痰、痰中偶带血丝, 体重下降 3kg, X 线胸片示右上肺有炎症浸润及空洞性病变, 最可能的诊断是
 - A. 肺脓肿
 - B. 肺结核
 - C. 肺癌
 - D. 支气管扩张合并感染
 - E. 肺囊肿合并感染
19. 结核菌素试验结果观察的时间是注射后
 - A. 20 分钟
 - B. 1 小时
 - C. 6~12 小时
 - D. 24~36 小时
 - E. 48~72 小时
20. 可疑宫颈癌患者进行碘试验的目的是
 - A. 预防碘过敏
 - B. 选择治疗方法
 - C. 筛查早期宫颈癌
 - D. 确定肿瘤的临床分期
 - E. 确定活组织取材部位
21. 有关羊水栓塞的处理, 错误的是
 - A. 纠正呼吸、循环衰竭
 - B. 抗过敏
 - C. 给予抗生素预防感染
 - D. 防止凝血功能障碍
 - E. 等待自然分娩
22. 诊断呼吸衰竭最主要的依据是
 - A. 原发病史
 - B. 呼吸困难的临床症状
 - C. 缺氧和二氧化碳潴留的体征
 - D. 排除引起呼吸困难的有关疾病
 - E. 血气分析

23. 某支原体肺炎患者, 其治疗首选的药物是
- 链霉素
 - 可特因
 - 青霉素
 - 甲泼尼龙
 - 红霉素
24. 改善成人急性呼吸窘迫综合征患者缺氧的最佳措施是
- 持续高流量吸氧
 - 按时使用有效抗生素
 - 呼气末正压通气
 - 避免输液过量、过快
 - 鼓励深呼吸和排痰
25. 慢性脓胸胸廓成形术患者术后胸廓局部垫硬枕或压沙袋的目的是
- 减少出血
 - 避免胸壁漏气
 - 控制反常呼吸
 - 减轻局部疼痛
 - 利于肺复张
26. 小儿单纯性肥胖症的正确饮食结构为
- 低蛋白、低糖、低脂肪
 - 高蛋白、低糖、低脂肪
 - 低蛋白、高糖、低脂肪
 - 高纤维素、低糖、低蛋白
 - 维生素、矿物质和纤维素为主
27. 对注意力缺陷多动障碍唯一有效的药物是
- 神经兴奋剂
 - 神经抑制剂
 - 镇静剂
 - 抗生素
 - 催眠药
28. 急性心肌梗死所致心律失常发生率最高的时间为急性心肌梗死后
- 头 24 小时内
 - 1~3 天
 - 4~7 天
 - 2 周以内
 - 1 个月以内
29. 患者, 男, 65 岁, 高血压 20 余年, 3 小时前急诊以广泛前壁急性心肌梗死收入院。下列情况中, 提示该患者不能应用溶栓治疗的是
- 室性期前收缩二联律
 - 血压 180/115mmHg
 - 3 年前做过胆囊切除术
 - 伴发急性左心衰竭
 - 年龄大于 60 岁
30. 急性一氧化碳严重中毒者最好的氧疗措施是
- 氧气湿化瓶内加乙醇
 - 低流量持续吸氧
 - 高流量间歇吸氧
 - 高压氧舱治疗
 - 静脉注射过氧化氢溶液
31. 急性胰腺炎非手术治疗期间使用的药物中不能抑制胰腺分泌的是
- 雷尼替丁
 - 抑肽酶
 - 生长抑素
 - 碳酸氢钠
 - 阿托品
32. 硬膜外阻滞麻醉最危险的并发症是
- 全脊髓麻醉
 - 脊神经根损伤
 - 硬膜外血肿
 - 硬膜外感染
 - 硬膜外导管折断
33. 股骨干骨折行垂直悬吊皮牵引治疗的患儿应在
- 1 岁以内
 - 2 岁以内
 - 3 岁以内
 - 4 岁以内
 - 5 岁以内
34. 孕妇羊水生化测定中反映胎儿肺成熟度的指标是
- 肌酐测定