

中 医 药 物 学

張氏新中醫叢書

中醫藥物學

梅縣懷濟醫院印行



南京中医药大学图书馆版权所有

版 權 所 有

不 許 翻 印

中華民國二十一年十月初版

中 醫 藥 物 學

一冊定價大洋伍角

著 者

梅縣張恭文

參 校 者

林會謨 梁國權

梁介文

溫志光 羅茂錫

出 版 者

梅縣懷濟醫院

發 行 處

梅縣老廟前
懷濟醫院

代 印 者

梅縣新羣公司

梅縣中醫學校校長題

樂學南針

楊奎公題

題辭

六氣類能爲疾患 却憑湯藥止其淫

羨君闡發神農旨 利濟功同海樣深

柯陳而後自成家 絕勝羣芳譜草葩

持向碧紗窻下讀 一燈紅映吉祥花

徵雪道人楊侶乾氏題

恭文先生新編藥物學出版題詞

閑將草木數從頭
寒熱溫平性不侔
力大却能除疾苦
功奇也可已憂愁
研經熟與探蘭秘
著論無須借箸謀
精闡軒岐靈素奧
新編藥物萬家謳

梅縣中國學校校長李宏度題

恭文學兄雅玩

嶺東醫界作先鋒 學說洋洋是正宗

瀏覽最新中藥論 方傳海外盡羅胸

羨君醫術學西中 國粹翻新道貫通

言論奇花爭怒放 彌天亞雨又歐風

醫生蕭梓材題

中醫藥物學

自序

醫者唯一之任務在解除人羣疾苦爲治療工作以拯救危難恢復健康也然醫又非徒託空言能治愈疾病必也藉藥物之力以行其作用始克有濟此古今中外俱一同轍而不得或缺者考藥物治病始於神農神農嘗百草教民醫藥是以藥療病之始夫藥者乃合動物植物礦物之一切有機體及無機體等類而供用因人之百體生理有偏盛偏衰而一疾病必藉藥物以調人身之盛衰而歸之和平是故以藥愈病夫藥品中有產地形態基本成分功用主治用量用法禁忌製法等不同非詳加考覈洞澈於中豈能運用自如以奏其效常觀諸家本草類皆揚厲鋪張繁而無當且其說與真理刺謬者甚多難期實用予心憾之爰不揣淺陋將古今中外言藥物之專書擇其精當之說益以經驗依仲景學說中選用藥品之次第按次編纂庶幾藥物之功無隱不顯研究施用得所遵循豈不善乎書成遂以爲序

中華民國二十一年六月下澣張恭文序於梅西懷濟醫院

中醫藥物學 例言

例言

一本書係根據漢張仲景所撰傷寒論及金匱玉函經二書所選之藥品而編輯其藥名之次序亦以書中先後見者爲次序

一金匱玉函經中所選之藥品其藥性已詳於傷寒論所選者則不再詳者則依編述

一本書所載藥品每味首列產地次基本次形態次成分次性質次功用次主治次用量次用法次禁忌次製法將綱舉目張閱者一覽了然極便研究

一本書每藥所舉之用量亦經再三研究俾作標準然宜多宜少亦在臨症者之運用總以不越過中毒之極量爲止

一本書論列藥品抉髓掄精推闡淨盡其分析形性功用主治等不遺餘蘊無隱不顯無微不彰凡方脈家及研究藥物學者不可不人手一編

一是書祇求實用不尚浮詞字句間不免粗尙望閱者諒之

藥性總義

關於溫度之調濟

- 一溫 能活潑神經。使局部血行暢利。
- 二熱 刺激神經。使局部微絲血管擴大。血液增多。
- 三涼 沉靜神經。使局部血行和緩。
- 四寒 刺激神經。使局部微血管收縮。分泌增多。

關於進行之方法

- 一升或表 刺激肺部。或末梢神經。使微血管起充血現象。
- 二吐 刺激胃腑。使之爲反動。而成吐嘔現象。
- 三降或攻下 刺激腸神經。使蠕動急速。粘膜起充血作用。
- 四利或滲 刺激心臟。使血液循環加速。或刺激腎臟。使微血管擴大。泌尿增多。
- 五瀉或斂 刺激皮膚。或粘膜。使微血管收束。制止分泌。

六補養 壯健神經。滋養血液。或調節神經。清潔血液。

一凡藥之升降。浮沉。散斂。攻補。行氣。行血。其分別。有在形色氣味上辨者。有在枝幹。花葉根苗上辨者。如升麻用根。中多孔竅。吸引水氣。上達苗葉。氣味甘辛。故主上升。而去在上之風寒。若牛膝。其根堅實。無升達之孔竅。且味苦瀉。而氣不發。故主達下。而去在下之濕痺。是以同一藥根。主升。主降。全在氣味上分別也。

又如紫蘇。葉能發汗。幹則開胸。子可降氣。同是一物。其降散。則又有子葉之分。又如紅花之色紅。行血中之滯。白菊花之色白。清氣之熱。同是花。而色之赤白。入氣入血。有如此之別。此舉辨藥之凡例。學者須先明此。而後諸藥可知。

凡藥味苦者。屬火。入心。味酸者。屬木。入肝。味甘者。屬土。入脾。味辛者。屬金。入肺。味鹹者。屬水。入腎。此五味分配五行。而入五臟之義也。

凡藥色赤者。屬火。入心。色青者。屬木。入肝。色黃者。屬土。入脾。

色白者。屬金。入肺。色黑者。屬水。入腎。此五色配五行。而入五臟之義也。

凡藥味苦者。能瀉。能燥。能堅。味酸者。能瀼。能收。味甘者。能補。能和。能緩。味辛者。能散。能潤。能橫行。味鹹者。能潤下。能軟堅。味淡者。能利竅。能滲泄。此五味之用也。

凡寒熱溫涼氣也。酸苦甘辛鹹味也。氣爲陽。味爲陰。氣厚者爲陽中之陽。薄者爲陽中之陰。味厚者爲陰中之陰。薄者爲陰中之陽。氣薄則發泄。厚則發熱。味厚則泄。薄則通。辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味滲泄爲陽。重濁沉降爲陰。清陽出上竅。濁陰出下竅。清陽發腠理。濁陰走五臟。清陽實四肢。濁陰歸六腑。此陰陽之義也。

凡輕虛者。浮而升。重實者沉而降。味薄者升而生。氣薄者降而收。氣厚者浮而長。味厚者沉而藏。味平者化而成。氣厚味薄者。浮而升。味氣厚薄者。沉而降。氣味俱厚者。能浮能沉。氣味俱薄者。可升可降。酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮。熱無沉。此升降浮沉之義也。

凡質之輕者。上入心肺。重者下入肝腎。中空者發表。前實者攻裏。爲枝者。達四肢。爲皮者。達皮膚。爲心爲幹者。內行臟腑。枯燥者。入氣分。潤澤者。入血分。此上下內外各以其內相從也。

凡藥各有形性氣質。其入諸經有因形類者。有因性相從者。有因氣相求者。有因質相同者。自然之理可以意得也。有相須者。同類而不可離也。爲使者。我之佐使也。惡者奪我之能也。畏者受彼之制也。反者兩不可合也。殺者制彼之毒也。此異同之義也。凡藥酒製取其升提。羌製取其溫散。入鹽走腎而軟堅。用醋注肝而收斂。童便製則除劣性而降下。米泔浸。則去燥氣而和中。乳製潤枯生血。蜜炙甘緩益元。麵煨抑酷勿傷上膈。黑豆甘草湯浸取其解毒使之和平。此製法各有所宜也。

凡用藥品宜新鮮。始不失其真性。然有宜陳久者。半夏南星只壳桔皮之類。宜陳久者。減其酷烈之性也。是以新陳之不同。用之貴各得其宜也。

中醫藥物學目次

封面 題字 題詞一 題詞二 題詞三

自序 例言 藥目

- | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 桂枝 | 2 白芍 | 3 甘草 | 4 生薑 | 5 大棗 | 6 葛根 | 7 附子 | 8 麻黃 |
| 9 杏仁 | 10 知母 | 11 石膏 | 12 粳米 | 13 人參 | 14 茯苓 | 15 白朮 | 16 乾薑 |
| 17 大黃 | 18 芒硝 | 19 半夏 | 20 黃芩 | 21 黃連 | 22 五味 | 23 細辛 | 24 厚朴 |
| 25 豬苓 | 26 澤瀉 | 27 肉桂 | 28 枝子 | 29 香豉 | 30 枳實 | 31 禹餘糧 | 32 柴胡 |
| 33 飴糖 | 34 桃仁 | 35 龍骨 | 36 鉛丹 | 37 牡蠣 | 38 蜀漆 | 39 水蛭 | 40 蠱蟲 |
| 41 亭力 | 42 甘遂 | 43 瓜蒌 | 44 文蛤 | 45 巴豆 | 46 貝母 | 47 花粉 | 48 芫花 |
| 49 大戟 | 50 赤石 | 51 旋覆 | 52 代赭石 | 53 瓜蒂 | 54 赤小豆 | 55 生地 | 56 阿膠 |
| 57 麥冬 | 58 麻仁 | 59 滑石 | 60 蜜 | 61 土瓜根 | 62 豬胆汁 | 63 茵陳 | 64 吳萸 |
| 65 黃柏 | 66 連翹 | 67 生梓白皮 | 68 雞子黃 | 69 豬膚 | 70 桔梗 | 71 葱白 | 72 人尿 |
| 73 烏梅 | 74 當歸 | 75 蜀椒 | 76 木通 | 77 升麻 | 78 玉竹 | 79 天冬 | 80 白頭翁 |
| 81 秦皮 | 82 竹葉 | | | | | | |

中醫藥物學

梅縣張恭文撰述

受業閩杭

林會謨
梁介文

同參校

上編 傷寒論選用之藥

桂枝

產地

桂枝產於中國之廣西廣東肇慶六屬羅定及安南等處以泗綸出者爲最

幼

基本

屬樟科爲肉桂樹之枝也

性質

氣味辛溫無毒

功用

氣薄升浮入手太陰肺經足太陽膀胱經溫經通脈調和營衛開腠理解表發汗使邪從汗出而汗自止無過汗傷表之患利肺氣補中益氣除煩止唾除邪利關節

主治

主上氣欬逆咳嗽結氣喉痺鼻癰吐吸傷寒頭痛自汗中風自汗心痛脅痛

脅風去冷風疼痛骨節攣痛手足痛風皮膚風濕泄奔豚散下焦蓄血

用量 每次五分至錢半

禁忌 性能動血血虛火炎者勿用

白芍

產地 白芍產於四川中江渠河者爲川芍產安徽亳州者爲亳芍產浙江杭州者

爲杭芍五六月出新

形態 川芍色畧紅黃質畧結味畧苦亳芍色肉氣味均同

成分 白芍內含安息香酸

性質 氣味苦平微寒無毒

功用 氣薄味厚升而微降乃陽中之陰入肺肝脾三經又能至血海爲肺脾行經

之藥有興奮及收斂之作用能除邪氣破堅積散惡血去瘀清熱和血脈斂

陰養血退熱除煩斂汗瀉肝火安脾肺緩中止痛益氣補腎氣去水氣利大

小腸膀胱強五臟固腠理又能蝕膿

主治 邪氣驚狂中惡時行寒熱時疾骨熱頭痛惡風臟腑壅氣肺氣急脹喘咳善

噫骨哽白喉肺癆脅痛心下痞脾虛中滿腰痛腹痛痢疾後重腸風下血痔瘻小兒急性胃腸病目赤目濇肝血不足積聚血痺疝瘕鼻衄血崩經漏一切血病胎前諸疾關節風濕消癰腫發背金瘡痘瘡疥雷丸爲使

用量

每次一錢至二錢

用法

治骨哽嚼細燕汁積聚爲末開水服小兒痘瘡爲末酒服

入補脾藥宜酒炒酒炒則補陰

入止血藥宜醋炒 入和營藥及下痢後重血熱癰毒藥酒洗生用

入血虛水腫腹脹藥宜桂酒煎用

同白朮補脾 同川芎瀉肝 同人參補氣 同當歸補血 同甘草養陰

同黃連止瀉痢 同防風發痘瘡 同薑棗溫經散濕

禁忌

虛寒勿用產後虛寒尤忌凡中寒腹痛作泄腹中冷痛腸胃中冷者亦忌用

惡石斛芒硝鼈甲小薊反藜蘆

甘草

產地

甘草產內蒙古俗稱王爺地此處地廣人稀每年收穫由山西顧工入去掘