

萬病驗方大全

海上名醫鑒定



上海
國醫
學社
印行



上海中医药大学图书馆版权所有

萬病驗方大全

青浦陸清潔編輯

婦人科門

【調經系】

【活血通經類】

凡服調經之藥。宜於行經時多服數劑。下次經期即準矣。若丸藥則宜常久服之乃效。

【不及期而經先行】多而黑者有熱也。用歸身。川芎各七分。赤芍。生地。知母。麥冬。地骨皮各一錢。甘草五分。水煎。空心服。性急燥多怨多妬者。氣血俱熱。且有鬱也。用製香附。炒研歸身。川芎。白芍。條芩。炒。黃連各一錢。生草五分。生地七分。水煎服。形瘦素無

他疾者。血熱也。用歸身。生地。川芎。赤芍。黃芩。炒。黃連。炒。各一錢。生草五分。水煎。食前服。兼服三補丸和之。「三補丸」專治血熱。黃芩。黃柏。黃連。俱炒。各等分。蜜丸。開水下。形瘦素多疾。且熱者。衝任內傷也。用「四物人參知母湯」。歸身。白芍。台黨。熟地。知母。麥冬。各一錢。川芎七分。炙草五分。薑棗引。水煎。食前服。更宜常服。地黃丸。「地黃丸」治女子衝任損傷。及腎虛。血枯。血少。血閉之症。用熟地八兩。山藥

四兩。山萸肉四兩。白茯苓。丹皮。去骨。澤瀉。去毛。各三兩。蜜爲丸。空心開水下。如曾誤服辛熱。煖宮之藥者。則其衝任伏火也。用「四物加黃柏知母湯」。歸身。赤芍。生地。黃柏。炒。知母。木通。各一錢。川芎七分。生草五分。水煎。食前服。更服三補丸。（見前）和之。如形肥多瘡多鬱者。則其血虛氣熱也。用歸身。川芎。生地。各七分。陳皮。去白。法半夏。雲苓。生草。各五分。條芩。炒。香附。童便。炒。黃連。各一錢。薑引。水煎服。

【一月而經再行】如性急多怒氣者。則其傷肝以動衝任之脈。用

「四物」加柴胡湯歸身川芎

白芍生地柴胡黨參條芩生草

黃連煎服更宜常服補陰丸以

瀉衝任之火（補陰丸）黃柏知

母（去皮毛炒）各等分蜜爲丸

每服五十丸如曾服辛熱之藥

者用「四物」加黃柏知母湯

及「三補丸」（見前）如傷衝任

之脈者用「四物」黨參知母

麥冬湯及「地黃丸」（見前）

【數月而經一行】瘦人則其脾胃

弱氣血虛用「十全大補湯」

及「地黃丸」（見前）肥人則其

多痰兼氣血虛用「六君子」

加「蒼莎導痰丸」黨參川芎

半夏各七分製甘草五分白朮
雲苓陳皮蒼朮米泔水浸歸身
香附童便炒枳殼各一錢薑引
「蒼莎導痰丸」香附童便炒
蒼朮各二兩陳皮雲苓各一兩
五錢枳殼半夏製南星炙草各
一兩生薑自然汁浸麵餅爲丸
淡薑湯下

【經行或前或後】悉從虛治用「

加減八物湯」一合黨白朮茯苓

炙草當歸川芎陳皮丹參香附

製丹皮各一錢薑棗引水煎服

「烏雞丸」此丸端治婦人脾

胃虛弱衝任損傷血氣不足經

候不調以致無子者服之屢驗

白毛烏骨雄雞一隻（查藥物

備要便知）以糯米喂養七日

勿令飲蟲蟻野物用繩弔死去
毛與腸雞以一觔爲率用生地
熟地天冬麥冬各二兩放雞肚
內甜美酒十碗入砂罐煮爛
取出再用桑柴火上焙去藥更
以餘酒淹盡焙至焦枯研細末
再加杜仲二兩（鹽水炒去絲
）台黨炙草肉蓯蓉酒洗固脂
炒小茴炒砂仁各一錢川芎白
朮丹參歸身茯苓各二兩香附
四兩（醋浸三日焙）共研末
和上末酒調麵糊爲丸每服五
十丸空心溫酒下或米湯下「
烏雞湯」與上「烏雞丸」同
功白毛烏骨雞一隻一切與上
同益母草一兩小黑豆一茶杯
共放雞腹內水酒各半蒸熟空

心食雞與湯。食一二次。以後月經時刻不差。其效無比。

【又方】治婦人經期不對。（赤白帶下及腹痛。）熟地六兩。酒條芩一兩。定經草四兩。人參一兩。阿膠二兩。製香附二兩。砂仁二兩。羌紅花七分。燈心七條。青仁烏豆各四十九粒。用雄雞一隻。約一斤。將藥入雞腹內。酒二盞。沉爛。將雞腹藥渣。曬乾研末。米糊爲丸。如桐子大。每服二兩。滾水送下。

【又方】治婦人經期不對。當歸二兩。川芎二兩。白芍一兩。熟地三兩。炙芪三兩。生地三兩。半白粳十二粒。杜仲二兩。半。定經草八分。香附五分。洋參一兩。半。芡實

三兩。炙草八分。椿白皮二兩。水不拘。蒸豬肚一個。服之即效。

【又方】熟地二兩。酒丹參一兩。酒當歸二兩。製香附一兩。酒淮膝分。肉桂四分。炒澤瀉一兩。水碗半。煎八分。服如進前。再加條芩八分。白芍八分。如退後者。可加當歸八分。連子丸二兩。經母草一兩。川芎八分。

【經行或多或少】瘦人經水來少者。氣血虛少也。用「四物」加人參湯。台黨。川芎。白芍。歸身。生地。香附。童便炒。炙草各二錢。薑棗引。水煎服。肥人經水來少者。痰凝經遂也。用「二陳」加芎歸湯。陳皮。茯苓。歸身。川芎。香附。童便炒。枳殼各一錢。半夏八分。

製甘草五分。滑石三分。薑引水煎服。凡經水來太多者。不問肥瘦。皆屬熱也。用「四物」加芩連湯。歸身。白芍。知母。生地。條芩。黃連各一錢。川芎。熟地各五分。黃柏七分。水煎服。兼服「三補丸」見前。

【逐日經來幾點則止】或五日或十日。又來數點。一月常三四次。面色青黃。宜用「艾膠湯」。阿膠炒。熟地各一錢。艾葉二錢。川芎八分。棗三枚。水煎。空心服二劑。再用陳皮五錢。良薑。枳殼。三稜。烏藥各八分。檳榔。砂仁。紅花。莪朮各六錢。共爲末。煮粥爲丸。如梧子大。每服三四十九。即愈。【經行不止往來無時】竹紙三十

張燒灰。淡酒半觔和勻。頓清溫服。

【經來不止形如魚腦足痛不能動履】乃下元虛冷更兼風邪所致。宜用「疎風止痛散」。當歸。天麻。僵蠶。烏藥。牛膝。獨活。石南藤。乳香。紫荊花。骨碎。補各一錢。川芎五分。薑三片。葱白三箇。酒煎空心服。

【經來不止形如牛膜昏迷倒地】硃砂一錢。白茯苓一兩。水和爲丸。薑湯送下五十粒。立效。

【經來不止或下血胞大如雞蛋】割開內如石榴子。其婦昏迷。不知人事。此虛症也。宜用「十全大補湯」。(見前)薑棗引水煎空心服。三五帖立效。內有甘草。

肉桂末。二味。米炒令老。肉桂味辛。恐動血。宜加減用之。爲要。

【經來有白蟲如雞腸滿腹疼痛】宜殺蟲由大便出。先用「追蟲丸」。後用「建中湯」。補之。「追蟲丸」。續隨子。檳榔。牽牛。大戟。各五分。麝香三分。甘遂。莞花。各一錢。米糊爲丸。如桐子大。每服十丸。酒送下。「建中湯」。白芍一兩。黃芪。肉桂。甘草。各五錢。共爲末。米湯下。

【經來成塊如葱白色如死猪血】黑色。頭昏。目暗。唇麻。此虛症也。用「補內當歸丸」。(見後)甚效。【經來結成一塊如皂角一條痛不可忍】不思飲食。此血滯也。用元胡四錢。髮灰三錢。共爲末。

酒調送下。服至半月。其塊自消。

【腹大如鼓經來如蝦蟆子】此症二三月經水不來。以致七八月腹大如鼓。人以爲孕。一日崩下。血其胞血中有物如蝦蟆子。昏迷不知人事。宜服「十全大補湯」。(見前)。

【經來如禽獸形】月經如禽獸形。欲來傷人。先將綿塞陰戶。用沒藥一兩。研末。滾開水調下。即愈。【月經過期形如屋漏水】頭昏目暗。小腹作痛。更兼白帶。喉中臭如魚腥。惡心吐逆。先用「理經四物湯」。後用「補內當歸丸」。自愈。「理經四物湯」。當歸。二錢。川芎。八分。生地。三錢。柴胡。七分。香附。醋炒。元胡。醋炒。白芍。酒

炒焦白朮各一錢五分。黃芩酒炒一錢。補內當歸丸。當歸續斷白芷阿膠厚朴茯苓肉蓯蓉漂淨焙乾蒲黃炒黑莢肉各一兩。川芎八錢。熟地一兩五錢。甘草乾薑各五錢。附子二錢。蜜爲丸。空心溫酒下七八十九。

【經來紫色】色紫者熱也用「四物」加香附黃連湯歸尾川芎赤芍香附製生地黃連甘草丹皮各一錢水煎服。

【經來脅內塊作痛其色深黃】宜治塊爲先用「四物」元胡湯當歸川芎白芍各八分元胡一錢熟地一錢五分薑三片酒煎加沉香三分磨兌食後服。

【經來全白色五心煩熱小便作痛】此氣血虛也宜用前「附子烏雞丸」。

【經來疼痛小便如刀割】此血門不開宜用牛膝三兩乳香一錢麝香二分水一碗半煎牛膝至一碗臨服磨乳香入內空心服一劑即愈如係火症用「辰砂益元散」(滑石甘草辰砂也)。

【行經腹痛】凡經水將行腰脹腹痛者此氣滯血實也用「桃仁四物湯」歸尾川芎赤芍丹皮香附製元胡索各一錢生地紅花各五分桃仁二十五粒水煎服如瘦人則其有火加黃連炒黃芩炒各一錢肥人則其有痰如枳殼蒼朮各一錢。

【經後腹痛】凡經水過後腹中痛者此虛中有滯也用「加減八物湯」台黨白朮香附醋炒茯苓歸身川芎白芍生地各一錢炙草木香各五分青皮七分薑棗水煎服。

【經來潮熱不思飲食】此症經來胃氣不開不思飲食須開胃不宜別樣只取雄雞頭頂上血調酒飲立效。

(按)此法係辟穢偶法非開胃正法也開胃正法者何因濕邪者治之平胃散即蒼朮厚朴陳皮甘草因積食者治之消積保和丸即神麴山查茯苓半夏陳皮連翹萊菔子麥芽也。

【經少腹大如漏胎狀】此名腸覃因經行之時寒氣自肛門而入者此虛中有滯也用「加減八物湯」台黨白朮香附醋炒茯苓歸身川芎白芍生地各一錢炙草木香各五分青皮七分薑棗水煎服。

客於腸外。以致經血凝滯。月信雖行。而血卻少。其腹漸大。如孕子狀。爲胎漏。肚盛。婦人半年以後。氣盛而除。虛怯者。必成脹病。用「桂枝桃仁湯」。桂枝。檳榔各一錢五分。白芍。生地。枳殼。各一錢。桃仁二十五粒。炙草五分。薑棗引水煎服。更宜常服。「四製香附丸」(見後)。

【經閉不通】「蠶沙飲」。通治經閉。蠶沙四兩。炒半黃色。用黃酒一觔半。甜酒亦可用。瓦罐煎滾。瀝去蠶沙。將酒入瓶封好。溫食一二杯。卽通。甚效。如因脾胃損傷。血枯不行者。用「加減補中益氣湯」。台黨。白朮。名二錢。炙耆。柴胡。各七分。歸身。白芍。川芎。

陳皮。各一錢。神麴。炒。麥芽。炒。炙草。各五分。薑棗引水煎服。更宜服前「參朮大補丸」。烏雞丸。以經行爲度。如因氣鬱血閉不行者。用「開鬱二陳湯」。陳皮。茯苓。蒼朮。香附。製。川芎。各一錢。半夏。製。青皮。莪朮。檳榔。各七分。甘草。木香。各五分。薑引水煎服。更宜服「四製香附丸」。以經行爲度。「四製香附丸」。此婦人常用之要藥也。淨香附一觔。用酒醋鹽水。童便。各浸三日。焙研。烏藥。八兩。共爲末。醋糊爲丸。開水下。如因痰者。用前「蒼沙導痰丸」。更服上「開鬱二陳湯」。去莪朮。加枳殼一錢。服有衍期未嫁之女。偏房失寵之

妾。寡居之婦。菴院之尼。欲動而不能得。遂憾憤而不能伸。多有閉經之疾。含羞強忍。不欲人知。致成癆瘵之病。終不可救者。宜服「四製香附丸」。參朮大補丸。攻補兼行。庶幾可瘳。此七情之變。無以法治者。也有經閉不行。骨蒸潮熱。脈虛者。用「增減八物柴胡湯」。台黨。茯苓。各一錢。炙草五分。歸身。白芍。生地。麥冬。知母。柴胡。有汗。加地骨皮。無汗。加牡。丹皮。各二錢。淡竹葉十五片。水煎服。凡婦人血虛有熱者。皆可服之。如熱太甚。服此不平者。加黑乾薑一錢。神效。有經閉發熱。喉燥。唇乾。脈實者。用「四物涼膈散」。歸身。川芎。

赤芍。生地。黃芩。酒炒。黃連。酒炒。山梔。炒黑。連翹。桔梗。各一錢。生甘草。薄荷。葉各五分。淡竹。葉十瓣。水煎服。凡血實形盛。脈有力。皆可服之。

【又方】治婦人經閉有年。阿膠一兩半。白芍一兩。當歸一兩。川芎一兩。枳殼一兩。香附一兩半。台烏一兩半。元胡一兩。卷柏一兩。甘草四分。沉香八分。木香八分。分。順氣丸二粒。水碗半煎八分。

【經閉腹大如孕】此名石瘕。因行經之時。寒氣自陰戶而入。客於胞門。以致經血凝聚。月信不行。其腹漸大如孕子狀。婦人壯盛者。半年之後。小水長而消矣。若

虛怯者。必成腫病。用一溫經湯。歸身。川芎。赤芍。莪朮。台黨。炙草各五分。川牛膝。故紙。小茴。炒各一錢。黃棗。引水煎服。更宜常服。四製香附丸。見前。

【室女經閉偏身浮腫】室女月水初行。不識保養。誤用冷水洗手。血見冷水。則凝不出。面色青黃。偏身浮腫。作水腫治之。不效用。通經丸。通血消腫。即愈。通經丸。三稜。莪朮。赤芍。川芎。當歸。紫苑。劉寄奴。各八分。穿山甲一片。凡爲末。米糊爲丸。酒送下。

【婦女因開甑爲熱氣所衝。面目腫大。經水不通】舊蒸飯布。越舊越好。燒灰。用鍋蓋上氣。

水。甑蓋上氣水。亦可。調敷。隨敷。隨消。經水亦通。無蒸飯布。甑底。燒灰。亦可。

【婦女疝疾。經水不調】面色黃瘦。咳嗽。燒熱。或吐血。或不吐血。不思飲食。精神疲倦。熟地。乾薑。當歸。蒲黃。赤芍。甘草。各三錢。小黑豆五錢。共研細末。另用肉桂三錢。去皮。研末。入藥拌勻。每用二錢。外加男子指甲七箇。瓦上焙黃。研細。入藥內。臨睡時。用熱淡黃酒沖服。出汗。不要受風。每日服一劑。共服四劑。其效如神。此四日。只要開水。紅糖。拌飯食。或食稀粥。千萬不可另吃別物。並忌受驚氣惱。是所至要。

【經逆上行。從口鼻出】急用。犀

角地黃湯。犀角。白芍。丹皮。枳實各一錢。黃芩。橘紅。百草霜。一卽鍋底煙子。以燒草者爲佳。燒煤炭者斷不可用。桔梗各八分。生地二錢。甘草三分。水煎空心服。數劑卽愈。

【又方】用韭菜搗汁一盞。入童便半盞。蒸熱服。極效。若無童便。其功稍緩。

【又方】先以好陳墨磨水一盞服。其血立止。次用歸尾。紅花各三錢。水一鍾半煎八分服。

【經水從口鼻出咳嗽氣緊】宜推血下行。當用「紅花散」七貼。次用「冬花散」止嗽下氣。不須五六帖。熱去自安。「紅花散」紅花。黃芩。蘇木各八分。花粉。

六分。水煎空心服。（冬花散）冬花蕊。粟殼。桔梗。枳殼。蘇子。紫苑。知母各八分。桑皮。炒石膏。杏仁各一錢。水煎服。

【婦人乾血癆症奇方】牛七三兩。香附六分。當歸六分。茯苓一兩。芡實一兩半。故紙一兩半。夏一兩。熱地一兩。麥冬六分。陳皮四分。甘草四分。紅花三分。薄荷三分。元肉三兩。紅棗五粒。清水煎服。

【又方】凡婦人女子因行經失調。至乾血癆者。用新刺之猪血。乘熱一碗飲之。或難尋新刺猪血。可用猪血不添水者。熱水煖之可飲。

【月經不通】或兩三月。或半年一

載者。用麻子仁二升。桃仁二兩。研勻。熟酒一升。浸一夜。服一升。便通。（普濟方）

【又方】薏苡根一兩。水煎服。不過數服。甚妙。（海上方）

【又方】凌霄花爲末。每服二錢。食前溫酒送下。（徐氏胎產方）

【又方】芥子二兩。爲末。每服二錢。熱酒食前服。（仁存方）

【又方】益母草膏常服。輒有神效。（海上方）

【又方】葶塵一升。爲末。蜜丸彈子大。綿裹納陰中。入三寸。每丸一宿。易之。有汗出止。（千金方）

【又方】厚朴不拘多少。薑汁炙香。細切。濃煎。去渣。空心服。不過三四劑。卽痊。屢驗。但惟形實氣盛。

者宜之。(本草綱目)

【又方】月經不通。腹大如甕。氣短欲死者。虎杖一斤。去頭。曬乾。切。土瓜根汁。牛膝汁。各二斗。水一斛。浸虎杖一宿。煎取二斗。入二汁。同煎如餲。每酒服一合。日再夜一宿。血當下。(聖惠方)

【又方】菴藟子一升。桃仁二升。酒浸去皮尖。研勻。入瓶內。以酒三斗。浸封五日。後每飲三合。日三服。量小者不拘。凡婦人宿有風冷。留血積聚。因而不通者。服此效。(聖惠方)

【室女經閉】當歸尾沒藥各一錢。爲末。紅花浸酒。面北飲之一日一服。(普濟方)

【又方】茜草三錢。陳酒一鍾。水煎

服三劑。如經仍未通。再服三劑。必效。(肘後方)

【又方】室女經閉。恍惚煩熱。鉛粉半兩。生地黃汁一合。調服。日三次。(聖惠方)

【月經不調】熟地黃八兩。當歸二兩。黃連一兩。並酒浸一夜。焙研爲末。煉蜜丸。梧子大。每服七十丸。米飲溫酒下。(禹講師經驗方)

【又方】阿膠一錢。蛤粉炒成珠。研末。熱酒沖服。卽效。(乾坤祕韞)

【又方】月經不調。氣血乖和。不能受孕。或生過一胎。停隔多年者。全當歸五兩。切片。遠志肉五兩。甘帶湯洗。用稀夏布袋盛。甜三白酒十斤。浸之。蓋好。浸七日。後

晚溫服。隨量飲之。勿間斷。(千金方)

【又方】香附一味。末。醋吸服。效。(崔氏方)

【又方】熟附子去皮。當歸等分。每服三錢。水煎服。(普濟方)

【月經久閉】因病或身體虧弱。久斷經者。是用紅棗。紅糖。生薑。馬蘭豆根各四兩。合煎。日三服。勿間斷。至經水復來爲止。極效。(婦人明經論)

【又方】蠶砂四兩。砂鍋炒半黃色。入無灰酒一壺。煮沸澄清。溫服一盞。(千金方)

【又方】絲瓜絡煨研。每三錢。酒服。(仁存堂方)

【又方】生地汁八兩。熬乾一半。大

黃末一兩。同熬爲丸。梧子大。熟水下五粒。(醫鑑)

【痛經不孕】玉蘭花將開未足。每歲一朵。(如二十歲用二十朵)每日清晨。空心水煎服。有效。(良方集要)

【痛經方】新胭脂泡濃汁。去渣。拌蕎麥麵爲丸。服之數次。即愈。

【通經祕方】鄭虛菴萬金方。用船上多年灰條。炭火燒紅。淬入好燒酒內。取出候乾。爲末。每服三錢。好酒送下。空心服。第二服。紅花酒下。第三服。大黃酒下。三次見效如神。此專通經用者。審之。

【經閉方】蓬頭七個。陳福珍酒半觔。將蓬頭置酒中。飯饌上蒸熟。臨臥服之。連服三日。即愈。

【血瘕】經閉結成血瘕。腹脅脹痛。欲死者。

水紅花馬鞭草各一斤。洗淨。煎濃去渣。熬成膏。配入當歸生地。川芎白芍酒炒各二兩。沒藥去油。紅花烏藥木香各一兩。延胡五靈脂各一兩五錢。俱爲末。和前膏少加米糊。爲丸。桐子大。每日空心溫酒送下。五七十九。以好爲度。

【經閉】土鱉虫一個。炙存性。上好血珀末五錢。麝香三錢。酒打和爲丸。每服三分。

【治乾血癆奇方】過三年者不治。用白鴿一隻。去肚腸淨。入血竭一年者一兩。二年者二兩。三年者三兩。用針線縫住。用無灰酒

煮數沸。令病人服之。瘀血即行。如心中慌亂者。食白煮肉一塊。即止。

【補虛類】

【經過期後行】色淡而少者。氣虛血少也。用「八物湯」。川芎白芍茯苓台黨歸身生草生地白朮各等分。薑棗引水煎。食後服。如性急燥多怒多妬者。則其氣逆血少也。照上八物湯。加香附炒青皮各等分。水煎服。兼常服「蒼沙丸」。以調之。「蒼沙丸」。和中開鬱。蒼朮米泔水浸。香附(童便浸一日夜)各三兩。條芩酒炒一兩。共爲末。湯浸蒸餅爲丸。開水下。如形瘦素無他疾者。則其氣血俱不足也。用十

全大補湯。台黨。白朮。土炒。茯苓。炙草。當歸。川芎。白芍。俱酒炒。熟地。炙。薯。各一錢。肉桂。五分。薑。棗。引水煎服。如形瘦食少。則其脾胃衰弱。氣虛血少也。用「異功散」。加當歸。川芎。湯。台黨。白朮。茯苓。炙草。陳皮。歸身。川芎。各一錢。薑。棗。引兼服。地黃丸。（見前）如肥人及飲食過多之人。則溼其痰壅滯。脇肢迫塞也。用「六君子」。加歸。芎。湯。台黨。白朮。茯苓。炙草。陳皮。半夏。製。歸身。川芎。香附。各一錢。薑。引兼服。蒼沙丸。如素多痰者。則其脾胃虛損。氣血失養也。用「參朮大補丸」。台黨。川芎。砂仁。石菖蒲。各五錢。白朮。茯苓。陳皮。蓮肉。歸身。各

五分。炙草。三錢。山藥。一兩。共爲末。薄荷。包。米。煮飯爲丸。米湯下。【經來淡色】色淡者虛也。台黨。白朮。茯苓。歸身。川芎。白芍。熟地。炙草。香附。製。各一錢。炙草。五分。薑。棗。引水煎服。並常服地黃丸。（見前）

【經如綠水】此症全無血色。乃大虛大寒。不可用涼藥。宜用「附子烏雞丸」。服之半月。非但病愈。又能懷孕。「附子烏雞丸」。附子。三錢。鹿茸。一兩。則用鹿膠。一兩。真山藥。茯苓。肉桂。蒲黃。炒黑。當歸。黃肉。各五錢。白芍。一兩。熟地。一兩。五錢。淨烏雞肉。去皮。油。酒。蒸。三兩。米糊爲丸。空心酒送下百丸。

【經如黃水】此係虛症。不可用涼藥。須煖其經。以和其血。次月血勝而愈。宜用「加味四物湯」。當歸。烏藥。川芎。元胡。小茴。白芍。各八分。熟地。一錢。薑。棗。引水煎。空心服。

【治婦人臟燥之症】好哭悲傷。顫狂。罵人。如有鬼神。平時女人好哭。自己不知其故。服之最妙。生甘草。一兩。小麥。一升。紅棗。十枚。水六升。煮三升。分三次服。卽愈。

【雜治類】

【經來狂言如見鬼神】麝香。二分。辰砂。遠志。去心。甘草。各一錢。柴胡。桔梗。茯神。各二錢。木香。五分。台黨。八分。水煎。不拘時服。後用

「茯苓丸」茯苓。茯神各八錢。

遠志去骨六錢。硃砂三錢。猪心

一箇。稀粥爲丸。如桐子大。用金

銀花湯送五十九丸卽愈。

【經來常嘔吐不思飲食】丁香。乾

薑各五分。白朮一錢。爲末。每清

農米湯下。

【經來食物卽吐】此症乃痰在胸

膈。飲食不能下胃。先用「烏梅

丸」。化去痰涎。後用「九仙奪

命丹」。烏梅丸。木香。雄黃各

五錢。草菓一個。乳香。沒藥各一

錢。烏梅爲丸。如彈子大。每早口

含化一丸。「九仙奪命丹」。草

菓一個。厚朴。茯苓各一錢。枳殼

木香。山查。陳皮。蒼朮各一錢。共

爲末。薑湯下。

【經來咳嗽】此症喉中出血。乃肺

金枯燥。急用「茯苓湯」。退其

嗽。再用「烏蘇丸」。除其根。「

茯苓湯」。茯苓。川芎。蘇葉。前胡

半夏。製。桔梗。枳殼。乾薑。陳皮。各

八分。當歸。生地。白芍各一錢。台

黨五分。桑白皮六分。甘草三分。

薑三片。水煎。空心服。「烏蘇丸」

「萊菔子九錢。貝母四兩。共爲

末。蜜丸。桐子大。空心。滾開水送

下五十九丸。

【經來大小便俱出】此名蹉經。因

吃熱物過多。積久而成。宜用「

分利豬苓散」。去其熱毒。調其

陰陽。卽安。分利五苓散。猪苓。澤

瀉。白朮。赤苓各一錢。阿膠炒。當

歸。川芎各八分。水煎。空心服。卽

愈。

【又方】竹紙三十張。燒灰。淡

酒半斤。和勻。頓清溫服。（婦人

良方）

【又方】丹參。曬研。每二錢。溫酒下。

（醫學正傳）

【又方】竹紙燒灰。溫酒調服。（乾

坤祕輶）

【月經逆行】先以京墨磨汁服。次

用當歸尾。紅花各一錢。水一鍾

半。煎八分。溫服。其經卽順。（聖

濟總錄）

【又方】菲菜搗汁一盞。入童便半

盞。蒸熱服。極效。若無童便。其功

稍緩。（唐仲舉方）

【又方】魚膝切炒。新綿燒灰。每服

二錢。米飲調下。（本草綱目）

【經來房事相撞】俗名撞紅。用明雄（水飛淨）三錢。好酒冲服。一次即愈。

【止瀉類】

【經水不止】白芍藥。香附子。熟艾葉各一錢半。水煎服。（熊氏補遺）

【又方】赤石脂。破故紙一兩。爲末。每服二錢。米湯調下。（普濟良方）

【又方】船茹一斤。淨洗。河水四升。半煮取二升。分二服。（本草綱目）

【又方】羊前左脚脛骨一條。紙裹泥封。令乾。煨赤。入樓欄灰各等分。每服一錢。溫酒送下。（本草綱目）

【又方】簪葉灰。蠶紙灰。等分爲末。每服二錢。米飲下。（聖濟總錄）

【又方】木賊炒三錢。水一盞。煎七分。溫服。日一服。（本草綱目）

【又方】敗蒲扇燒灰。酒服一錢。（本草綱目）

【又方】桑耳焙研。每服二錢。食前熱酒下。日三服。久疾失治者。皆可服之。（普濟方）

【又方】槐耳炒黃。赤石子各一兩。爲末。食前熱酒服一錢。（聖惠方）

【又方】梅葉焙。樓欄皮灰各等分。爲末。每服二錢。酒調下。（聖濟總錄）

【又方】烏梅肉炙。芍藥各等分。每二錢。水酒各半煎服。（本草綱目）

目

【又方】側柏葉。木賊。炒微焦。各等分爲末。每服二錢。米飲下。（聖濟總錄）

【又方】紅雞冠花一味。曬乾爲末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥猪肉。（集效方）

【又方】牡蠣煨研。米醋捏成團。再煨研末。以米醋調艾葉末熬膏。丸梧子大。每醋湯下四五十九。（本草綱目）

【又方】青竹茹炙爲末。每服三錢。水一盞煎服。（普濟方）

【又方】赤石脂炒。煙盡研。每服二錢。當歸兩片。酒一盞。煎六分。熱服三五度。取效。（經效方）

【帶下系】

【補虛類】

【白帶白濁白淫】陳皮半夏製。白茯苓。白朮。益志仁。鹽水炒。研。蒼朮各一錢。炙草五分。升麻。柴胡各七分。薑引水煎服。

【又方】治婦人白帶。生地一錢半。當歸二錢。條芩二錢。桔紅四分。白雞冠花二錢。水不拘。煎出味和「甯神丹」一粒。空心服之妙。

【又方】赤茯苓二錢。連子一錢半。淮山藥一錢。芡實一錢。車前一錢。椿皮一錢半。白雞冠花一錢半。香附二錢。砂仁二錢。陳皮一錢。木通八分。朱苓七分。澤瀉八分。元參一錢。連須二錢。水二碗。煎一碗。再用渣碗四煎七分服之。

【又方】炒白朮一錢。茅蒼朮三錢。車前子三錢。山藥一錢。製陳皮五分。高麗參二錢。炒白芍五分。柴胡六分。荆芥草五分。製半夏一錢。甘草一錢。水三碗。煎一碗。臨睡服之。可飲二劑。如重再加二劑。至六劑全愈。

【赤白帶下】帶久不止者。專以補虛為主。宜服「十全大補湯」。去地黃。如陳皮。半夏。乾薑。更服「參朮大補丸」。(俱見前)以補脾胃之虛。及服「補宮丸」。以補下元之耗。「補宮丸」鹿角霜。茯苓。白朮。白芍。白芷。牡蠣。(煨童便炒)。真山藥。龍骨。煨。赤石脂。各五錢。乾薑炒二錢。五錢。醋煮爲丸。空心米湯下。

【又方】白朮五錢。真雲苓二錢。車前子一錢。雞冠花三錢。水煎服。無論久近。其效如神。赤帶用白雞冠花。白帶用赤雞冠花。反之爲妙。

【又方】赤白帶下。諸藥不效。年久不愈。此乃濕熱也。貫衆一個。去皮毛。以好陳醋。泡透。漫火燒熟。爲末。空心米湯下。每服二錢。亦百發百中之方也。

【又方】治赤白帶。熱地二兩。甘杞一兩半。川芎一兩半。金英一兩半。白椿根二兩。石蓮二兩。丹皮一兩半。澤瀉一兩半。銀杏三兩。蓰蓉一兩半。南芡二兩。炙草六分。金釵一兩。茯神二兩。牡豕三兩。煨。各藥煎水成湯。水不拘多。

少。出味爲度。乃以藥湯和牡蠣小肚一個并合。『固脾補腎丸』五兩。〔此丸各藥房均有兌〕合燉而食。甚有靈效。

【赤白帶下。臍腹疼痛】白芍二兩。炒。乾薑五錢。共爲細服。每服三錢。空心溫米湯下。效驗如神。

【五色帶下】年久古磚一塊。燒極紅。赤。以油煎麵餅七箇。安放磚上。再用黃瓜根研末。鋪麵餅上加布兩層。令病人坐上。使藥氣薰入腹中。當有蟲出。治三五次。蟲盡卽愈。

【治婦人女子帶下。虛脫症。極效方】芡實粉二兩。白茯苓二兩。赤石脂一兩。煨。牡蠣一兩。醋煨。禹餘糧一兩。煨。牛角腮一兩。炙。

黃。共爲末。好醋一盃。拌和前藥。晒乾。再搗末。打糊爲丸。每服二錢。

【治婦人久積冲虛。小便白濁。并滑數不禁】用鹿角屑炒黃。爲末。每服二錢。酒空心下。

【白帶年久不愈】赤白帶下。諸藥不能療治者。

貫衆一個。全用。〔揉去毛及花萼〕。以米醋蘸溼。慢火炙熟。爲末。空心米飲下。每服二錢。累試甚驗。能不再發。

【醫治白帶立愈方】白帶。以人乳和稀粥久食之。自愈。

【又方】白木槿花。裝猪肚內。煮熟。連肚帶花。服之。頗效。

【又方】白雞冠花。煎水服之。亦效。

【又方】真蕎麥麵。不拘多少。雞子清和丸。如梧桐子大。每服三錢。早晚空心送下。

【又方】白棉花子。仁四兩。烘晒九次。打爛。米糟爲丸。每服二三錢。開水送下。

【又方】蓮蓬壳炙灰。研細末。用熟雞子。去黃。取白。裹末服之。頗效。

【又方】選青色無沙眼之牡蠣。煨紅。冷定。又煨七次。研細。腐漿調下。二錢。

【又方】沙參爲末。每服二錢。米飲湯下。亦效。

【醫治赤帶立愈方】赤帶。用紅雞冠花。曬乾。爲末。每日空心酒服。自愈。

【醫治赤白帶下立愈方】赤白帶。

下。用炒杜仲五兩。斷續三兩。白
蔘三兩。煎湯服之。甚效。

【又方】黃荊子二兩。炒黑研末。米
糊爲丸。每服二錢。燈心煎水送
下。

【又方】白果去皮。煮熟蜜餞。每日
清晨吃七粒。再食炒馬料豆一
兩。白滾水送下。數日愈。

【又方】豆蔻仁一枚。乳香一小塊。
麵裹煨黃焦。同麵研細。每米飲
湯服二錢。日二次。自愈。

【醫治室女白帶立愈方】室女白
帶。以金毛狗脊（煨去毛）白
朮各一兩。鹿茸（酒蒸焙）二
兩。共爲末。用艾煮醋汁打糯米
糊丸。如梧子大。每服五十丸。空
心溫酒下。自愈。

【醫治年久白帶立愈方】年久白
帶。用白果十個。搗爛。豬油一錢。
用豆腐漿沖服。一月自愈。

【醫治帶下有膿立愈方】帶下有
膿。用白芷一兩。單葉紅蜀葵根
二兩。白芍藥。白枯礬。各半兩。爲
末。以蠟化丸。梧子大。每空心及
食前服十九。俟膿盡自愈。

【醫治白淫立愈方】白淫。用炒車
前子三兩。白蔘二兩。煎服立
效。

【又方】糙糯米。花椒。等分。炒爲末。
醋糊丸。梧子大。每服三四十九。
食前醋湯下。亦效。

【醫治白沃立愈方】白沃。經水不
利。子臟堅僻。中有乾血。卽下白
沃。如漿者是也。用礬石燒杏仁。

各一分。研勻。煉蜜丸。棗核大。納
入子臟中。日一易之。自效。

【血崩系】

〔補虛類〕

【血崩不止】（參看後老婦血崩
方）燈心一根。蘸香油點燃。燒
大敦穴。十下。卽止。穴在兩足大
趾外側甲縫內中間。不上不下。
卽是如止而又崩。卽在原處燒。
之。若原處起泡。將泡挑破。燒之。
無不止矣。此治崩症神效第一
方也。止後再請名醫用藥調理。
以免復發。

【又方】凡婦人有血崩血枯之症。
其頭頂心必有紅髮數根。拔之。
燒灰酒調空心服。甚效。

【又方】陳蓮蓬殼五錢（燒灰存