

5

中醫百日通

中國醫藥 入門叢書 湯頭入門

上海中西醫藥書局印行

中醫	5
	083 (1-15)
	2

叢書
總目

診脈入門	內經入門	女科入門	外科入門【附療科】
辨舌入門	金匱入門	產科入門	傷科入門
藥性入門	傷寒入門	痘科入門	喉科入門
湯頭入門	溫病入門	幼科入門	眼科入門

中國醫藥
入門叢書

(湯)
(頭)
(入)
(門)

上海
中西醫藥書局印行



南京中医药大学图书馆版权所有


中國醫藥入門叢書

中醫百通日六十種

● 眼科入門	● 喉科入門	● 傷科入門	● 外科入門	● 痘科入門	● 幼科入門	● 產科入門	● 女科入門	● 溫病入門	● 傷寒入門	● 金匱入門	● 內經入門	● 湯頭入門	● 藥性入門	● 辨舌入門	● 診脈入門
定價洋三角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋五角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角

附
外科

全部六十種加錦套定價洋伍圓正



編輯者 陳景歧

校閱者 吳嘉寶

發行者 吳駿公

印刷者 中西書局

發行所 上海望平街中市
中西書局總店

外埠函購注意

本局發行各類書籍，依照定價大都為特價六折發售，外埠函購加寄費一成，如蒙惠顧，請直接函寄「上海望平街中西書局總店」，即妥，郵票代洋十足通用，如需圖書目錄函索即寄。

中國醫藥
入門叢書
湯頭入門目錄

【一】徐靈胎方劑論

一. 方藥離合論

二. 古方加減論

三. 方劑古今論

四. 古今方劑大小論

五. 煎藥法論

六. 服藥法論

【二】方耕霞新輯湯頭歌訣

一. 表散之劑

人參敗毒散

附方一

杏蘇散

銀喬散

桑菊飲

防風鮮毒湯

竹葉柳芽湯

普劑消毒飲

甘露消毒飲

麻黃湯

附方一

桂枝湯

附方四

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯

九味羌活湯

小續命湯

再造散

五積散

羌活勝濕湯

三物香薷飲附方四

川芎茶調散

金沸草散

蒼耳散

清震湯

香蘇飲

牛蒡豆豉湯

二、攻裏之劑

大小承氣湯附方二

調胃承氣湯附方二

增液承氣湯附方一

大小陷胸湯附方一

大柴胡湯附方二

涼膈散

蜜煎導附方三

水香檳榔丸

枳實導滯丸

疏鑿飲

舟車丸

滾痰丸附方二

實脾飲

清氣化痰丸附方一

枳實消痞丸附方一

八正散

五苓散附方二

茵陳蒿湯附方一

龍胆瀉肝湯

導赤散

瀉黃散附方一

瀉白散

瀉青丸

葶蘆大棗湯

潔古芍藥湯

附子瀉心湯附方一

半夏瀉心湯附方二

潤腸丸

通幽湯附方一

萬氏牛黃丸附方一

紫雪丹

至寶丹附方一

太乙玉樞丹

蘇合香丸

活絡丹附方一

三、和解之劑

小紫胡湯

黃連湯附方一

逍遙散

藿香正氣湯

六和湯

平胃湯附方三

保和丸附方一

越鞠丸附方一

四磨飲附方一

蘇子降氣湯

旋覆代赭湯

橘皮竹茹湯

二陳湯附方三

丁香柿蒂湯附方一

半夏天麻白朮湯三子養親湯

定喘白果湯

五皮飲附方一

清脾飲

絕瘧七寶飲附方一

何人飲附方三

鱉甲飲子

達原飲

橘核丸附方一

中滿分消湯

韭汁牛乳飲附方一

瓜蒌薤白湯

梔子豆豉湯

黃土湯

腳氣雞鳴散

順風勻氣散

獨活寄生湯附方一

痛瀉要方

奔豚湯

清暑益氣湯

三仁湯

四·寒涼之劑

白虎湯

附方二

竹葉石膏湯

犀角地黄湯

六一散

附方五

葛根芩連湯

消斑青黛飲

化斑湯

清宮湯

冬地三黃湯

玉女煎

清瘟敗毒散

神犀丹

甘露飲

附方二

沙參麥冬飲

杏仁滑石湯

清燥救肺湯

清胃散

當歸六黃湯

附方一

秦艽白朮湯

附方一

滋燥養營湯

左金丸

附方四

補肺阿膠湯

千金葶莖湯

豬腎薺苳湯

消渴方

小薊飲子

清心蓮子飲

白頭翁湯

黃連阿膠湯

附方二

清骨散

五·溫熱之劑

理中湯附方二

眞武湯

四逆湯

白通湯

吳茱萸湯附方一

四神丸

苓桂朮甘湯附方二

芪附湯附方二

天台烏藥散

回陽救急湯

大順散附方一

來復丹

黑錫丹

半硫丸附方一

漿水散

六·補益之劑

四君子湯附方四

四物湯附方三

小建中湯附方三

補中益氣湯附方一

歸脾湯

參苓白朮散

養心湯

人參養營湯

金匱腎氣湯附方六

炙甘草湯附方一

生脈散

地黃飲子

右歸飲附方一

當歸補血湯附方一

七寶美髯丹

天王補心丹

紫苑湯

黃芪楚甲散

妙香散

黑地黃丸

虎潛丸

通關滋腎丸附方一

大定風珠

小定風珠

河車大造丸 斑龍丸

七. 固瀉之劑

金鎖固精丸 眞人養臟湯 茯苓丹 桑螵蛸散

訶子散 桃花湯附方一 柏子仁丸 陽虛自汗牡蠣粉附方一

猪肚丸 萆薢分清飲附方一

八. 因證之劑

瓜蒂散附方三 稀涎散附方二 烏梅丸 化蟲丸

集效丸附方一 葛花解醒湯 燒禪散 妊娠六合湯

達生散附方一 交加飲子 清魂散 黑神散

羚羊角散 牡丹皮散 天仙藤散 白朮散

竹葉湯 紫苑良方 失笑散 如聖湯附方一

生化湯

保產無憂散

參朮飲

升陽舉經湯

附方一

真人活命飲

托裏十補湯

痴狗咬靈方

錫類散

中國醫藥
入門叢書

湯頭入門

〔一〕徐靈胎方劑論

一·方藥離合論

方之與藥。似合而實離也。得天地之氣。成一物之性。各有功能。可以變易血氣。以除疾病。此藥之力也。然草木之性。與人殊體。入人腸胃。何以能如人之所欲。以致其效。聖人爲之製方。以調劑之。或用以專攻。或用以兼治。或相輔者。或相反者。或相用者。或相制者。故方之既成。能使藥各全其性。亦能使藥各失其性。操縱之法。有大權焉。此方之妙也。若夫按病用藥。藥雖切中。而立方無法。謂之有藥無方。或守一方以治病。方雖良善。而其藥有一二味與病不相關者。謂之有方無藥。譬之作書之法。用筆已工。而配

合顛倒。與夫字形俱備。而點畫不成者。皆不得謂之能書。故善醫者。分觀之。而無藥弗切於病情。合觀之。而無方不本於古法。然後用而弗效。則病之故也。非醫之罪也。而不然者。卽偶或取效。隱害必多。則亦同於殺人而已矣。至於方之大小奇偶之法。則內經詳言之。茲不復贅云。

二・古方加減論

古人製方之義。微妙精詳。不可思議。蓋其審察病情。辨別經絡。參考藥性。斟酌輕重。其於所治之病。不爽毫髮。故不必有奇品異術。而沈痼艱險之疾。投之輒有神效。此漢以前之方也。但生民之疾病。不可勝窮。若必每病製一方。是曷有盡期乎。故古人卽有加減之法。其病大端相同。而所現之證。或不同。則不必更立一方。卽於是方之內。因其現證之異。而爲之加減。如傷寒論中治太陽病用桂枝湯。若見項背強者。則用桂枝加葛根湯。喘

者則用桂枝加厚朴杏子湯。下後胸滿脈促者。桂枝去白芍湯。更惡寒者。去白芍加附子湯。此猶以藥爲加減者也。若桂枝麻黃各半湯。則以兩方爲加減矣。若發奔豚者。用桂枝爲加桂枝湯。則又以藥之輕重爲加減矣。然一二味加減。雖不易本方之名。而必明著其加減之藥。若桂枝湯倍用芍藥而加飴糖。則又不名桂枝加飴糖湯。而爲建中湯。其藥雖同而義已別。則立名亦異。古法之嚴如此。後之醫者。不識此義。而又欲託名用古。取古方中一二味。則卽以某方目之。如用柴胡。則卽曰小柴胡湯。不知小柴胡之力。全在人參也。用猪苓澤瀉。卽曰五苓散。不知五苓之妙。專在桂枝也。去其要藥。雜以他藥。而仍以某方目之。用而不效。不知自咎。或則歸咎於病。或則歸咎於藥。以爲古方不可法。今病嗟乎。卽使果識其病。而用古方。支離零亂。豈有效乎。遂相戒以古方爲難用。不知全失古方之精義。故

與病毫無益而反有害也。然則當何如。曰。能識病情與古方合者。則全用之。有別證。則據古法加減之。如不盡合。則依古方之法。將古方所用之藥。去取損益之。必使無一藥之不對於證。自然不倍於古人之法。而所投必有神效矣。

三。方劑古今論

後世之方。已不知幾億萬矣。此皆不足以名方者也。昔者聖人之製方也。推藥理之本原。識藥性之專能。察氣味之從逆。審臟腑之好惡。合君臣之配偶。而又探索病源。推求經絡。其思遠。其義精。味不過三四。而其用變化不窮。聖人之智。真與天地同體。非人之心思所能及也。上古至今。千聖相傳。無敢失墜。至張仲景先生。復申明用法。設爲問難。注明主治之證。其傷寒論金匱要略。集千聖之大成。以承先而啓後。萬世不能出其範圍。此之

謂古方與內經並垂不朽者。其前後名家如倉公扁鵲華佗孫思邈諸人。合有師承。而淵源又與仲景微別。然猶自成一家。但不能與靈素本草。綫相傳。爲宗枝正脈耳。旣而積習相仍。每著一書。必自撰方千百。唐時諸公。用藥雖博。已乏化機。至宋人並不知藥。其方亦板實膚淺。元時號稱極盛。各立門庭。徒騁私見。迨乎前明。蹈襲元人緒餘而已。今之醫者。動云古方。不知古方之稱。其指不一。若謂上古之方。則自仲景先生流傳以外。無幾也。如謂宋元所製之方。則其可法可傳者絕少。不合法而荒謬者甚多。豈可奉爲典章。若謂自明人以前。皆稱古方。則其方不下數百萬。夫常用之藥。不過數百品。而爲方數百萬。隨拈幾味。皆已成方。何必定云某方也。嗟嗟。古之方何其嚴。今之方何其易。其間亦有奇巧之法。用藥之妙。未必不能補古人之所未及。可備參考者。然其大經大法。則萬不能及。其中更

有違經背法之方。反足貽害。安得有學之士。爲之擇而存之。集其大成。刪其無當。實千古之盛舉。余蓋有志而未遑矣。

四·古今方劑大小論

今之論古方者。皆以古方分兩太重爲疑。以爲古人氣體厚。故用藥宜重。不知此乃不考古而爲此無稽之談也。古時升斗權衡。歷代各有異同。而三代至漢。較之今日。僅十之二一。余親見漢時有六升銅量容今之一升二合如桂枝湯乃傷寒大劑。

也。桂枝三兩。芍藥三兩。甘草二兩。共八兩。二八不過一兩六錢爲一劑。分作三服。則一服藥不過今之五錢三分零。他方間有藥品多而加重者。亦不過倍之而已。今人用藥必數品各一二錢。或三四錢。則反用三兩外矣。更有無知妄人。用四五兩作一劑。近人更有用熟地八兩爲一劑者。尤屬不倫。用丸散亦然。如古方烏梅丸。每服如梧子大二十丸。今不過四五分。

若今人之服丸藥。則用三四錢至七八錢不等矣。末藥則用方寸匕。不過今之六七分。今亦服三四錢矣。古人之用藥分兩。未嘗重于今日。周禮遺人凡萬民之食。食者人四鬴。注六斗四升曰鬴。四鬴共二石五斗六升。爲人一月之食。則每日食八升有餘矣。而謬說相傳。方劑日重。卽此一端而荒唐若此。况其深微者乎。蓋既不能深思考古。又無名師傳授。無怪乎每舉必成談笑也。

五·煎藥法論

煎藥之法。最宜深講。藥之效不效。全在乎此。夫烹飪禽魚。羊豕失其調度。尙能損人。况藥專以之治病。而可不講乎。其法載於古方之末者。種種各殊。如麻黃湯。先煮麻黃去沫。然後加餘藥同煎。此主藥當先煎之法也。而桂枝湯又不必先煎桂枝。服藥後須啜熱粥以助藥力。又一法也。如茯苓桂枝甘草大棗湯。則以甘瀾水先煎茯苓。如五苓散則以白飲和服。服後