

黔版中草药彩色图谱系列

XINBIAN ZHONGCAOYAO TUPU JI JINGDIAN PEIFANG 6

新编 中草药 6 图谱及经典配方

主 编：杨卫平 夏同珩 副主编：李朝斗 陈谦海



新编中草药图谱及经典配方

6

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海

编辑委员（按姓氏笔画顺序排列）

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨传东	周 静	周惟粲
苟光前	姜东辉	夏同珩	梅 颖
黄 敏	董发发	潘晓瑛	

贵州出版集团
贵州科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中草药图谱及经典配方. 6 / 杨卫平, 夏同珩主编. — 贵阳: 贵州科技出版社, 2014.5

ISBN 978-7-80662-990-1

I. ①新… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图谱
②中草药—验方 IV. ①R282.7-64②R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第056826号

出版发行	贵州出版集团 贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路289号 (邮政编码: 550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	福建彩色印刷有限公司
版 次	2014年5月第1版
印 次	2014年5月第1次
字 数	288千字
印 张	10
开 本	880 mm × 1 230 mm 1/32
印 数	3 000册
书 号	ISBN 978-7-80662-990-1
定 价	41.00元

前 言

当前，环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题，世界各国民众普遍关注，各国政府也高度重视，积极投入人力、物力，努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业，也是环境问题的一个重要方面，一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品，需要耗费大量的人力、物力、财力，也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展，使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中，遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激，再加上工作紧张，难免身心疲惫，渴求返璞归真，回到农耕田园生活之中；与此同时，也对防病治病提出了新的要求，希望能更多地使用天然药物，以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求，并不过分，同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年，在从事诊病治病的医疗实践中，历代医药人员努力工作，积累了丰富的诊病用药经验，使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验，可供世界各国借鉴和参考，这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势，本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片，并从中挑选出近1 800种常用中草药的照片，为其撰写相关文字，编著成了《新编中草药图谱及经典配方》一书，分六册出版。

全书编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论

述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编杨卫平和编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘冬、梅颖、冷丽、何前松、吴筱枫系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

目 录

面根藤（打碗花）	(1)
旋花（打碗花）	(2)
菟丝子（无娘藤）	(3)
马蹄金（小金钱草、马蹄草）	(4)
蕹菜（空心菜、藤藤菜）	(5)
番薯（红苕）	(6)
藤商陆	(7)
马鞍藤	(8)
北鱼黄草（铃铛子）	(9)
牵牛子	(10)
翼萼藤（白花藤、飞蛾藤）	(11)
竹叶菜（鸭跖草）	(12)
竹节草	(13)
毛蓝耳草（珍珠露水草）	(14)
聚花草（水竹菜）	(15)
紫万年青（蚌兰花）	(16)
猪鼻孔（竹子子）	(17)
紫鸭跖草（鸭舌草）	(18)
亚麻（亚麻子）	(19)
过山青（白骨树）	(20)
米念芭（白花柴）	(21)
眼子菜（水案板）	(22)
水案板	(23)
酸水草	(24)
响叶杨	(25)
毛白杨（白杨）	(26)
柳	(27)
柳树皮	(28)
白杨（大叶杨）	(29)
杨梅	(30)

杨梅树皮	(31)
矮杨梅	(32)
多花野牡丹（破碗掌脚树）	(33)
野牡丹	(34)
野牡丹根（痢疾罐、朝天罐）	(35)
地苌	(36)
大金香炉	(37)
金锦香（天香炉）	(38)
仰天钟	(39)
遍山红	(40)
锦香草（大虎耳草）	(41)
红敷地发	(42)
肉穗草（家阿麻）	(43)
银杏（白果）	(44)
银杏叶（白果叶）	(45)
银耳（白木耳）	(46)
一朵云	(47)
白屈菜	(48)
南黄紫堇（黄断肠草）	(49)
野花生（紫堇、断肠草）	(50)
黄堇（断肠草、水黄连）	(51)
岩黄连	(52)
延胡索	(53)
血水草（广扁线）	(54)
博落回（号筒杆、三钱三）	(55)
虞美人	(56)
罂粟壳	(57)
榆	(58)
玄榔树（榔榆）	(59)
芫夷	(60)

沙糖果(沙朴、小叶朴)	(61)
水葫芦(水浮莲)	(62)
鸭舌草	(63)
雨久花(雨韭花)	(64)
射干	(65)
西红花(藏红花、番红花)	(66)
唐菖蒲(搜山黄)	(67)
扁竹根(蝴蝶花、豇豉叶)	(68)
马蔺草	(69)
小花鸢尾根(六棱麻)	(70)
鸢尾(土知母)	(71)
乌棒子(水黄杨木)	(72)
瓜子金(小远志)	(73)
黄瓜仁草(蓼叶远志)	(74)
远志	(75)
松风草(岩椒草)	(76)
枳实(酸橙)	(77)
代代花(玳玳花)	(78)
青皮	(79)
橘(陈皮、橘皮)	(80)
柚	(81)
化橘红	(82)
柠檬(藜檬)	(83)
香橼	(84)
佛手柑	(85)
甜橙皮	(86)
野黄皮	(87)
黄皮	(88)
白鲜皮	(89)
三叉虎(三叉苦)	(90)
吴茱萸	(91)
金橘	(92)
九里香	(93)
臭山羊(大山羊)	(94)
黄柏(黄皮树)	(95)

枸橘	(96)
芸香(臭草、芸香草)	(97)
茵芋	(98)
见血飞(飞龙掌血)	(99)
栲叶花椒(食茱萸)	(100)
花椒	(101)
大叶花椒	(102)
细叶花椒(小叶刺椒、蜈蚣藤)	(103)
两面针	(104)
竹叶椒	(105)
麻口皮子药	(106)
野花椒(大花椒)	(107)
泽泻	(108)
慈姑	(109)
野慈姑(剪刀草)	(110)
水慈姑	(111)
红果楠	(112)
樟(樟树)	(113)
阴香	(114)
肉桂	(115)
桂枝	(116)
大果木姜子(大果樟、米槁)	(117)
乌药	(118)
香叶树(白背叶)	(119)
毕澄茄(萆澄茄)	(120)
木姜子(黄花子、辣姜子)	(121)
楠木	(122)
檫树	(123)
粉背蕨	(124)
猪笼草	(125)
紫萁贯众(薇菜)	(126)
黑阳参	(127)
紫草	(128)
狗屎花(小绿连草)	(129)
狗屎花根(鸡爪参)	(130)

牙痛草·····	(131)	珊瑚·····	(165)
琉璃草（铁箍散、大琉璃草）·····	(132)	地龙·····	(166)
地仙桃（接骨仙桃草）·····	(133)	水蛭·····	(167)
伏地菜（地胡椒、附地菜）·····	(134)	石决明·····	(168)
矮陀陀（地柑子、九管血）·····	(135)	田螺·····	(169)
朱砂根（紫金牛）·····	(136)	紫贝齿·····	(170)
八爪金龙（百两金、紫金牛）·····	(137)	海螺·····	(171)
平地木（矮地茶）·····	(138)	蜗牛·····	(172)
毛青杠（红刺毛藤、小青）·····	(139)	瓦楞子（瓦垄）·····	(173)
当归藤（大力王、土当归）·····	(140)	珍珠·····	(174)
白花酸藤果（咸酸菴）·····	(141)	珍珠母·····	(175)
大叶酸藤子·····	(142)	牡蛎·····	(176)
杜茎山（水麻叶）·····	(143)	海蛤壳（蛤壳）·····	(177)
叶子花（三角梅、九重葛）·····	(144)	乌贼骨（海螵蛸）·····	(178)
紫茉莉（胭脂花）·····	(145)	鼠妇·····	(179)
凌霄花·····	(146)	虾·····	(180)
紫葳根·····	(147)	蟹（河蟹）·····	(181)
楸木白皮·····	(148)	全蝎（全虫、蝎子）·····	(182)
楸叶·····	(149)	马陆·····	(183)
梓白皮·····	(150)	蜈蚣·····	(184)
梓树叶·····	(151)	蜻蜓·····	(186)
炮仗花·····	(152)	土鳖虫（土鳖、廋虫）·····	(187)
角蒿·····	(153)	桑螵蛸·····	(188)
木蝴蝶（千张纸）·····	(154)	蝗虫（蚱蜢）·····	(189)
椰子·····	(155)	蝼蛄（土狗）·····	(190)
大腹皮·····	(156)	蝉蜕（蝉退、虫衣）·····	(191)
蒲葵·····	(157)	红娘子·····	(192)
槟榔·····	(158)	虫白蜡·····	(193)
血竭·····	(159)	九香虫·····	(194)
棕榈·····	(160)	原蚕蛾（雄蚕蛾）·····	(195)
亚洲醉鱼草（白鱼尾、白花醉 鱼草）·····	(161)	僵蚕（白僵蚕）·····	(196)
黄花醉鱼草（蒙花）·····	(162)	大避债蛾·····	(197)
大叶醉鱼草（药药花）·····	(163)	虻虫·····	(198)
醉鱼草·····	(164)	芫青·····	(199)
		斑蝥·····	(200)

天牛·····	(201)	穿山甲·····	(236)
屎壳郎（独角仙、蜣螂）·····	(202)	兔·····	(237)
蜂蜜·····	(203)	松鼠·····	(238)
蜂房（露蜂房）·····	(204)	五灵脂·····	(239)
蚂蚁（大黑蚁）·····	(205)	中华竹鼠·····	(240)
海星·····	(206)	家鼠·····	(241)
鲨鱼·····	(207)	海豹（海狗肾）·····	(242)
鲫鱼·····	(208)	熊胆·····	(243)
海马·····	(209)	豹骨·····	(244)
海龙·····	(210)	阿胶（驴皮胶）·····	(245)
蟾酥·····	(211)	马（马宝、马肉）·····	(246)
乌龟（龟板、龟甲）·····	(212)	猪胆汁·····	(247)
海龟·····	(213)	鹿茸·····	(248)
玳瑁·····	(214)	鹿角（花鹿角、鹿角屑）·····	(249)
鳖（鳖甲）·····	(215)	鹿角胶（鹿胶、白胶）·····	(250)
蛤蚧·····	(216)	鹿角霜·····	(251)
壁虎·····	(217)	麝香·····	(252)
蛇退（蛇蜕）·····	(218)	牛黄·····	(254)
乌梢蛇·····	(219)	水牛角·····	(255)
蕲蛇·····	(220)	山羊（青羊、青羊角）·····	(256)
野鸭（凫）·····	(221)	黄羊·····	(257)
鹌鹑·····	(222)	羚羊角·····	(258)
鸡内金·····	(223)	虫草（冬虫夏草）·····	(259)
乌骨鸡（竹丝鸡）·····	(224)	狼·····	(260)
孔雀尾·····	(225)	炉甘石·····	(261)
鸽·····	(226)	海浮石（浮海石）·····	(262)
珠颈斑鸠·····	(227)	阳起石·····	(263)
燕窝·····	(228)	阴起石·····	(264)
翠鸟（鱼狗）·····	(229)	自然铜·····	(265)
刺猬（刺猬皮）·····	(230)	雄黄·····	(266)
鼯鼠·····	(231)	雌黄·····	(267)
夜明砂·····	(232)	朱砂（丹砂）·····	(268)
猴枣·····	(233)	水银·····	(269)
血余炭·····	(234)	芒硝·····	(270)
紫河车·····	(235)	鹅管石·····	(271)

钟乳石（石钟乳）·····	(272)	青礞石·····	(286)
寒水石（方解石）·····	(273)	琥珀·····	(287)
赤石脂·····	(274)	胆矾·····	(288)
赭石（代赭石）·····	(275)	禹余粮·····	(289)
磁石·····	(276)	密陀僧·····	(290)
石膏·····	(277)	花蕊石·····	(291)
石英（白石英）·····	(278)	滑石·····	(292)
云母·····	(279)	硼砂·····	(293)
铅丹·····	(280)	白矾（明矾）·····	(294)
白石脂·····	(281)	鄂豆根（胡豆莲、山豆根）·····	(295)
轻粉·····	(282)	大驳骨（鸭子花、大接骨）·····	(296)
红信石（人言、信石）·····	(283)	石耳·····	(295)
硫黄（硫磺）·····	(284)	中文名笔画索引·····	(298)
紫石英·····	(285)	拉丁学名索引·····	(304)

面根藤（打碗花）

【来源及药用部位】旋花科植物打碗花*Calystegia hederacea* Wall.的全草。

【本草论述】《天宝本草》：“健脾开胃，疗瘦肥肌。”

【形态特征】一年生缠绕草本，高8~40cm。具细长白色的根。植株矮小，蔓性。茎自基部分枝，有细棱。单叶互生，具长柄，基部叶片长圆形，上部叶片戟形或3裂，侧叶片近三角形，全缘，叶基戟形或心形。花单生叶腋，具长花梗；苞片宽卵形；萼片5，长圆形；花冠钟状，淡紫色或淡红色；雄蕊5。蒴果卵球形。种子黑褐色。花期夏季。

生于田边、荒地、路旁。全国大部分地区有分布。

【性 味 功 效】甘、苦，凉。健脾，利湿，调经。

【常用配方】1.治小儿脾虚胃弱 面根藤、鸡矢藤各等量，做糕吃。2.治肾虚耳聋 面根藤、响铃草各120g，炖猪耳朵服。

【主要化学成分】茎含防己内酯，掌叶防己碱；叶、花含山萘酚-3-乳糖苷等。

【现代研究】现代临床用于治疗小儿消化不良，便秘，泌尿道感染血尿和月经不调等。



旋花（打碗花）

【来源及药用部位】旋花科植物旋花 *Calystegia sepium* (L.) R.Br.的根。

【本草论述】《本经》：“主益气……其根味辛，主腹中寒热邪气，利小便。”

【形态特征】多年生缠绕草本。全株无毛。茎缠绕或匍匐，有细棱。叶互生，具长柄，叶型多变，常三角状卵形或宽卵形，先端渐尖或锐尖，叶基戟形或心形，全缘或基部稍延伸为具2~3齿缺的裂片。花单生叶腋，具长花梗；苞片2枚，宽卵形；萼片5，卵形；花冠漏斗状，白色或淡红色；雄蕊5；子房无毛，柱头2裂。蒴果卵形。种子黑褐色。花期6~7月，果熟期7~9月。

生于田边、荒地、路旁。全国大部分地区有分布。

【性味功效】甘，温。益气，养颜，涩精。

【常用配方】**1.治胃痛腹胀** 旋花根、苦蒜各20g，水煎服。**2.治红淋、白浊** 旋花根、无娘藤、车前草各20g，水煎服。**3.治失眠** 旋花根、山枝茶、羊奶奶各10g，水煎服。**4.治便秘** 旋花根、土大黄各20g，水煎服。**5.治疝气肿痛** 旋花根、小茴香根各30g，水煎服。

【现代研究】药理研究显示有降血糖作用。现代临床用于治疗劳伤，金疮，蜂窝织炎，遗尿，遗精和蛔虫病等。



菟丝子（无娘藤）

【来源及药用部位】旋花科植物菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam.的种子。

【本草论述】《本经》：“主续绝伤，补不足，益气力，肥健。”

【形态特征】一年生缠绕寄生草本。茎黄色，纤细，多分枝，随处可生出寄生根，伸入寄主体内。叶稀少，鳞片状，三角状卵形。花两性，多数簇生成小伞形或小团伞花序；苞片小，鳞片状；花萼杯状，花冠白色；雄蕊5，雌蕊2。蒴果近球形，稍扁。种子黄色或黄褐色，卵形，表面粗糙。花期7~9月，果熟期8~10月。

生于田边、路边荒地、灌木丛中、山坡向阳处。分布于全国大部分地区。

【性味功效】辛、甘，平。化湿利水，散结消肿。

【常用配方】**1.治水肿** 菟丝子、椿树果各20g，水煎服。**2.治小便淋漓涩痛** 菟丝子、须须药、凤尾草各20g，水煎服。**3.治感冒发热** 菟丝子、竹叶菜各20g，水煎服。**4.治蛔积腹痛** 菟丝子、阳荷根各10g，水煎服。**5.治痈疖肿痛** 菟丝子鲜品适量，捣汁外搽。

【主要化学成分】含槲皮素，紫石英苷，金丝桃苷，胆甾醇，豆甾醇，菜油甾醇， β -谷甾醇，菟丝子多糖，香豆精，生物碱，蒽醌类和皂苷类等。

【现代研究】药理研究显示有增强免疫，增加冠状动脉血流量，减少冠状动脉阻力，减慢心率，降低血压和心肌耗氧，改善微循环，保肝，抗衰老，抑制肠运动和兴奋离体子宫等作用。现代临床用于治疗习惯性流产（滑胎），先兆流产，阳痿，带状疱疹，白癜风和痤疮等。



马蹄金（小金钱草、马蹄草）

【来源及药用部位】旋花科植物马蹄金 *Dichondra repens* G. Forst.的全草。

【本草论述】《百草镜》：“利湿热。治黄疸，臃胀，白浊，经闭。”

【形态特征】多年生匍匐小草本。茎细长，光滑或稍被灰色疏柔毛，节上生根。单叶互生，叶柄长3~7cm；叶片圆形或肾形，直径2~4cm，先端宽圆形，基部阔心形，全缘。花序单生于叶腋，伞梗生于叶腋，每一花梗顶端有花3~6朵；萼片5；花冠钟状，黄色，深5裂；雄蕊5；子房2室。蒴果近球形，膜质。种子黄色至褐色，无毛。花期4月，果熟期7~8月。

生于路旁、草丛、墙下等半阴湿处。分布于长江流域以南各地。

【性味功效】苦、辛，凉。清热利湿，活血止痛。

【常用配方】**1.治黄疸胁痛** 马蹄金、凤尾草、酢浆草各50g，水煎服。**2.治跌打伤痛** 马蹄金50g，酒水各半煎服。**3.治带状疱疹** 马蹄金适量，捣烂取汁涂搽患处。**4.治指疗** 马蹄金、半边莲鲜品各适量，捣烂外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗传染性黄疸型肝炎，胆道结石，泌尿道结石，带状疱疹，化脓性指头炎，跌打损伤，蛇咬伤和外伤性疼痛等。



蕹菜（空心菜、藤藤菜）

【来源及药用部位】旋花科植物蕹菜 *Ipomoea aquatica* Forsk.的嫩茎叶或全草。

【本草论述】《本草纲目》：“捣汁和酒服，治产难。”

【形态特征】一年生蔓生草本，全株光滑。茎中空，匍匐地上或浮水上。叶互生，椭圆状卵形或长三角形，常6~15cm，顶端短尖或钝，边缘全缘或波状，基部心形或戟形，具长叶柄。聚伞花序腋生，有1~5朵花，总花梗长3~6cm；苞片2，小鳞片状；萼片5，卵圆形；花冠漏斗状，白色或淡紫色，顶端5浅裂；雄蕊5；子房2室，柱头头状，有两裂片。蒴果卵球形，无毛。种子卵圆形，2~4颗，密被短柔毛。

生于湿地、土壤肥厚或水田中。我国长江流域至广东等地有栽培。

【性味功效】甘，微寒。清热凉血，利尿，通便，解毒。

【常用配方】**1.治衄血、便血、尿血等** 鲜蕹菜适量，绞汁，加蜂蜜饮服。**2.治虫蛇咬伤** 鲜蕹菜适量，绞汁，和酒饮服；另取渣外敷患处。**3.治大便涩滞不利** 蕹菜适量，同猪肉煮熟，吃肉喝汤。**4.治皮肤湿痒** 蕹菜适量，水煎数沸，候微温洗患部，日洗一次。

【主要化学成分】含蛋白质，脂肪，糖类，维生素A原，维生素B₂，尼克酸和钙、磷、铁等。

【现代研究】现代临床用于治疗糖尿病，皮肤湿疹瘙痒，疱疹，便秘，蛇虫咬伤和鼻出血等。主要作为蔬菜食用。



番薯（红苕）

【来源及药用部位】旋花科植物番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam. 的块根。

【本草论述】《医林纂要》：“止渴，醒酒，益肺，宁心。”

【形态特征】多年生蔓状草质藤本，秃净或稍被皮，有乳汁。块根白色、黄色、红色或有紫色斑。叶卵形至矩圆状卵形，长6~14cm，先端渐尖，基部截头形至心形，全缘，或有角或缺刻。聚伞花序腋生，花数朵生于一粗壮的花序柄上，萼深裂，淡绿色，先端钝，有小锐尖；花冠漏斗状，5短裂，紫红色或白色；雄蕊5；子房2室。


我国各地均有栽种。

【性味功效】甘，平。补中和血，益气生津，通便。

【常用配方】**1.治大便涩滞不通** 番薯煮熟或煨熟食用。**2.治烦热口渴** 生番薯适量，直接食用。**3.治乳疮** 生番薯捣烂敷患处，见热即换，连敷数天。**4.治疮毒发炎** 生番薯洗净磨烂，敷患处。

【主要化学成分】含糖类，蛋白质，胡萝卜素，维生素B₁和C，钙、磷、铁等。

【现代研究】现代临床用于治疗疮痈，便秘和乳腺炎等。



藤商陆

【来源及药用部位】旋花科植物七爪龙*Ipomoea digitata* L.的根及叶。

【本草论述】《广西民间常用草药》：“治水肿腹胀，一切肿毒，瘰癧。”

【形态特征】多年生大型缠绕藤本。根粗壮，近肉质。单叶互生，叶片轮廓圆形或肾形，宽7~15cm，指状5~7深裂，裂口狭而基部浑圆，裂片通常披针形。聚伞花序腋生，花序柄与叶柄等长或更长，花3~5朵或更多；萼片阔卵形，钝头，长达1cm；花冠粉红色或红紫色，阔钟状，基部有一短管，长5~6cm；雄蕊5，内藏；子房上位，花柱合生，蒴果卵形，长1cm左右，4室，4瓣裂；种子被长绵毛。花期夏、秋季。

生于山野、灌丛和路边。分布于广东、广西等地。

【性味功效】苦、寒；有毒。清热解毒，利水消肿。

【常用配方】1.治水肿腹胀 藤商陆根30g，同瘦猪肉60g煲吃。2.治疮疖、痈肿、乳疮及瘰癧 藤商陆根、叶适量，酒糟少许，捣烂，用芭蕉叶包好煨热，敷患处，每日换药一次。

【主要化学成分】含伞形花内酯，蒿属香豆精， β -谷甾醇和蒲公英赛醇乙酸酯等。

【现代研究】药理研究显示有抑制心肌和扩张血管，抑制子宫平滑肌等作用。现代临床用于治疗水肿，皮肤痈疖疮疡溃烂等。

