

中国常绿阔叶林 分类·生态·保育 (表格数据)

**Evergreen Broad-leaved
Forests in China**

**Classification-Ecology-Conservation
(Tables)**

宋永昌 主编



中国常绿阔叶林

分类·生态·保育

(表格数据)

宋永昌 主编

科学出版社

北京

目 录

东部典型常绿阔叶林群落表 (第 5 章)	1
东部柯、青冈集群 (5.1)	1
东部木荷、锥集群 (5.2)	99
东部樟、楠集群 (5.3)	275
西部典型常绿阔叶林群落表 (第 6 章)	301
西部青冈、锥集群 (6.1)	301
西部山地柯集群 (6.2)	326
台湾山地典型常绿阔叶林群落表 (第 7 章)	354
台湾山地青冈集群 (7.1)	354
台湾柯、锥、青冈集群 (7.2)	370
台湾山地樟、楠集群 (7.3)	398
中国季节常绿阔叶林群落表 (第 8 章)	411
大陆东部季节常绿阔叶林 (8.1)	411
大陆西部季节常绿阔叶林 (8.2)	470
台湾季节常绿阔叶林 (8.3)	488
中国适雨常绿阔叶林群落表 (第 9 章)	512
大陆东部适雨常绿阔叶林 (9.1)	512
大陆西部适雨常绿阔叶林 (9.2)	530
台湾适雨常绿阔叶林 (9.3)	541

东部典型常绿阔叶林群落表 (第 5 章)

东部柯、青冈集群 (5.1)

苦槠、柯、青冈优势度型群落表 (5.1.1)

A. 北部青冈优势度亚型群落表

表 5-3 白马骨/青冈群落

Tab. 5-3 *Serissa serissoides/Cyclobalanopsis glauca* Comm.

顺序号 Running No.	1	2
野外样地号 No. of plot	NJ-Ch1	JS-69
样地面积 Size of plot	10 m×20 m	5 m×5 m
日期 Date	1999.8.28	1999.5.5
地点 Place	南京隆昌寺	南京紫金山
海拔 Altitude/m	396	220
坡向 Expose/ (°)	N50E	NE
坡度 Slope/ (°)	30	/
乔木 1 层高 T1: Height/m	14~18	12
乔木 1 层盖度 T1: Coverage/ %	90	80
乔木 2 层高 T2: Height/m	7	/
乔木 2 层盖度 T2: Coverage/ %	5	/
灌木层层高 S1: Height/m	4	4
灌木层层盖度 S1: Coverage/ %	50	30
草本层高 H: Height/m	0.6	0.8
草本层盖度 H: Coverage/ %	20	20
乔木层种数 No. of species (T)	9	2
灌木层种数 No. of species (S)	29	8
草本层种数 No. of species (H)	21	5
层外种数 No. of species (L)	8	4
总种数 No. of species (total)	64	17
植物中文名	拉丁名	层
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	T1/T2
栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i>	T1
多花泡花树	<i>Meliosma myriantha</i>	T1/T2
南京椴	<i>Tilia miquelianana</i>	T1

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B
大叶榉树	<i>Zelkova schneideriana</i>	T1	+	·
枫香树	<i>Liquidambar formosana</i>	T1	+	·
槲栎	<i>Quercus aliena</i>	T1	+	·
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	T1	+	·
湖北鹅耳枥	<i>Carpinus hupeana</i>	T1	+	·
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	S	2·2	2·3
小叶石楠	<i>Photinia parvifolia</i>	S	+	2·2
枸骨冬青	<i>Ilex cornuta</i>	S	1·1	·
油茶	<i>Camellia oleifera</i>	S	1·2	·
山橿	<i>Lindera reflexa</i>	S	1·1	·
莢蒾	<i>Viburnum dilatatum</i>	S	1·1	·
苦茶槭	<i>Acer ginnala</i> subsp. <i>theiferum</i>	S	1·1	·
建始槭	<i>Acer henryi</i>	S	1·1	·
牛鼻栓	<i>Fortunearia sinensis</i>	S	1·1	·
茶茱萸(汤饭子)	<i>Viburnum setigerum</i>	S	+·2	·
朴树	<i>Celtis sinensis</i>	S	+	·
色木槭	<i>Acer mono</i>	S	+	·
豆腐柴	<i>Premna microphylla</i>	S	+	·
老鸦柿	<i>Diospyros rhombifolia</i>	S	+	·
紫楠	<i>Phoebe sheareri</i>	S	+	·
湖北鹅耳枥	<i>Carpinus hupeana</i>	S	+	·
卫矛	<i>Euonymus alatus</i>	S	+	·
毛竹	<i>Phyllostachys heterocycla</i> cv. <i>Pubescens</i>	S	+	·
黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i>	S	+	·
华紫珠	<i>Callicarpa cathayana</i>	S	+	·
女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>	S	+	·
山茱萸	<i>Cornus officinalis</i>	S	+	·
宝华玉兰	<i>Magnolia zenii</i>	S	+	·
多花泡花树	<i>Meliosma myriantha</i>	S	+	·
胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i>	S	+	·
五加	<i>Acanthopanax gracilistylus</i>	S	+	·
青灰叶下珠	<i>Phyllanthus glaucus</i>	S	+	·
糙叶树	<i>Aphananthe aspera</i>	S	+	·
苦树(苦木)	<i>Picrasma quassoides</i>	S	+	·
冬青	<i>Ilex chinensis</i>	S	·	1·2
白檀	<i>Symplocos paniculata</i>	S	·	+·2
豆腐柴	<i>Premna microphylla</i>	S	·	+
刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i>	S	·	+
野柿	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i>	S	·	+
白马骨	<i>Serissa serissoides</i>	H	+	+·2
阔叶山麦冬	<i>Liriope platyphylla</i>	H	+	+

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B
贯众	<i>Cyrtomium fortunei</i>	H	1·2	·
黑足鳞毛蕨	<i>Dryopteris fuscipes</i>	H	+·2	·
紫金牛	<i>Ardisia japonica</i>	H	+	·
万年青	<i>Rohdea japonica</i>	H	+	·
庐山香科科	<i>Teucrium pernyi</i>	H	+	·
薹草一种 (1)	<i>Carex</i> sp. 1	H	+	·
蛇莓	<i>Duchesnea indica</i>	H	+	·
三脉紫菀	<i>Aster ageratoides</i>	H	+	·
羽叶长柄山蚂蝗	<i>Podocarpium oldhami</i>	H	+	·
天南星	<i>Arisaema heterophyllum</i>	H	+	·
杏香兔儿风	<i>Ainsliaea fragrans</i>	H	+	·
紫花堇菜	<i>Viola grypoceras</i>	H	+	·
求米草	<i>Oplismenus undulatifolius</i>	H	+	·
斑叶堇菜	<i>Viola variegata</i>	H	+	·
薹草另一种 (2)	<i>Carex</i> sp. 2	H	+	·
麦冬 (日本沿阶草)	<i>Ophiopogon japonicus</i>	H	+	·
孩儿参	<i>Pseudostellaria heterophylla</i>	H	+	·
薹草再一种 (3)	<i>Carex</i> sp. 3	H	+	·
红盖鳞毛蕨	<i>Dryopteris erythrosora</i>	H	+	·
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	H	·	+
苦楮	<i>Castanopsis sclerophylla</i>	H	·	+
光紫黄芩	<i>Scutellaria laeteviolacea</i>	H	·	+
络石	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	LH	+·2	2·3
薜荔	<i>Ficus pumila</i>	LH	+·2	2·2
鸡矢藤	<i>Paederia scandens</i>	LH	+	+
紫藤	<i>Wisteria sinensis</i>	LS	+	·
扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i>	LS	+	·
藤构	<i>Broussonetia kaempferi</i> var. <i>australis</i>	LS	+	·
华东菝葜	<i>Smilax sieboldii</i>	LS	+	·
海金沙	<i>Lygodium japonicum</i>	LS	+	·
黑果菝葜	<i>Smilax glauco-china</i>	LH		+

资料来源：1. 藤原一绘，阎传海，等。1999. 中日合作南京植被样地调查记录；2. 宋永昌，等。中国东部和日本西部常绿阔叶林比较研究（1998-2000年基金项目编号：39770129）

表 5-4 箬竹/青冈群落

Tab. 5-4 *Phyllostachys nidularia* /*Cyclobalanopsis glauca* Comm.

顺序号 Running number	1	2	3	4	5	6	表 2
野外样地号 No. of plots	金 y8	金 y18	金 y2	金 y17	金 y9		
样地面积 Size of plot/m ²	100	600	100	225	100	4 (100 m ²)	
日期 Date	2001. 11. 4	2001. 11. 5	2001. 11. 4	2001. 11. 5	2001. 11. 4	1983. 3. 16	
地点 Place	岛东端	中东上	中东部	中东部	岛中部	大金山	
海拔 Altitude/m	60	95	90	85	55	40~95	
坡向 Exposition/ (°)	E92	NEN59	SSW201	NE34	SSW204	/	

续表

顺序号	Running number	1	2	3	4	5	6
坡度 Slope/ (°)		20	20	20	30	15	/
乔木 1 层高度 T1; Height/m		6	12	9	9	9	12
乔木 1 层盖度 T1; Coverage/%		85	85	85	90	85	75
灌木层高度 S; Height/m		1.5	6	1.5	2.5	3	1.5~2
灌木层盖度 S; Coverage/%		10	10	5	10	20	60
草本层高度 H; Height/m		0.8	1	0.5	1	1	/
草本层盖度 H; Coverage/%		5	5	5	5	10	45
乔木层种数 No. of species (T)		1	3	2	3	6	5
灌木层种数 No. of species (S)		1	3	3	3	3	5
草本层种数 No. of species (H)		6	8	2	8	11	4
层外种数 No. of species (L)		1	(1)	1	(3)	5	(1)
总种数 No. of species (total)		8	10	6	12	13	14
植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	I. V. %
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	T	5·5	4·4	4·4	4·4	3·3
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	T	·	·	1·1	·	·
红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	T	·	·	·	1·1	·
野桐	<i>Mallotus japonicus</i> var. <i>floccosus</i>	T	·	·	·	+	·
黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i>	T	·	·	·	·	2·2
野柿	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i>	T	·	·	·	·	+·2
白杜(丝棉木)	<i>Euonymus maackii</i>	T	·	·	·	·	+·2
白檀	<i>Symplocos paniculata</i>	T	·	+	·	·	·
木荷	<i>Schima superba</i>	T	·	·	·	·	·
柞木	<i>Xylosma racemosum</i>	T	·	·	·	·	5.7
豆梨	<i>Pyrus calleryana</i>	T	·	·	·	·	10.9
篌竹+水竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> + <i>P. heteroclada</i>	S	2·2	·	+·2	+	1·1
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	S	·	2·2	1·2	·	·
野桐	<i>Mallotus japonicus</i> var. <i>floccosus</i>	S	·	·	+	·	+
白檀	<i>Symplocos paniculata</i>	S	·	+·2	·	+	·
豆梨	<i>Pyrus calleryana</i>	S	·	+	·	·	·
红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	S	·	·	·	·	10.1
小蜡	<i>Ligustrum sinense</i>	S	·	·	·	·	9.3
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	H	+	+·2	+	+	+·2
红盖鳞毛蕨	<i>Dryopteris erythrosora</i>	H	+·2	1·1	+	1·1	+
野桐	<i>Mallotus japonicus</i> var. <i>floccosus</i>	H	+	·	·	+	·
柃木	<i>Eurya japonica</i>	H	+	·	·	·	5.2
五节芒	<i>Misanthus floridulus</i>	H	+	·	·	·	·
白檀	<i>Symplocos paniculata</i>	H	+	+·2	·	·	·
朴树	<i>Celtis sinensis</i>	H	·	+	·	·	·
天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i>	H	·	+	·	+	·

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	I. V. %
枸骨冬青	<i>Ilex cornuta</i>	H	·	+	·	·	·	·
红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	H	·	+	·	+	2	·
紫金牛	<i>Ardisia japonica</i>	H	·	·	·	+	·	sol
海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	H	·	·	·	·	+	·
白杜	<i>Euonymus maackii</i>	H	·	·	·	·	+	·
黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i>	H	·	·	·	·	+	·
鸡桑	<i>Morus australis</i>	H	·	·	·	·	+	·
天葵	<i>Semiaquilegia adoxoides</i>	H	·	·	·	·	·	cop3
蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	H	·	·	·	·	·	cop2
四叶葎	<i>Galium bungei</i>	H	·	·	·	·	·	cop1
小果蔷薇	<i>Rosa cymosa</i>	LT	·	·	1·1	·	+	2
薜荔	<i>Ficus pumila</i>	LH	+	2	·	·	·	·
海金沙	<i>Lygodium japonicum</i>	LH	·	+	·	·	·	·
络石	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	LH	·	·	+	+	·	·
菝葜	<i>Smilax china</i>	LSH	·	·	·	+	+	·
杠香藤	<i>Mallotus repandus</i> var. <i>chrysocarpus</i>	LTS	·	·	·	·	2·1	·
乌蔹莓	<i>Cayratia japonica</i>	LH	·	·	·	·	+	·
女萎	<i>Clematis apiifolia</i>	LH	·	·	·	·	+	·

资料来源：1~5. 达良俊，杨永川. 2001. 大金山植被调查；6. 周秀佳. 1984. 上海的主要自然植被类型及其分布. 植物生态学与地植物学丛刊, 8 (3): 189-198

表 5-5a 檵木/青冈群丛(贵池, 黄山)

Tab. 5-5a *Loropetalum chinense* / *Cyclobalanopsis glauca* Ass. (Guichi, Anhui)

顺序号	Running number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
野外样地号	No. of plots	A6	B7	A3	A5	AB9	A1	gc16	AHS 16	AHS 18	
样地面积	Size of plot/m ²	400	150	400	400	400	100	400	100	100	
日期	Date:	1999	5.25	5.25	5.25	5.25	5.27	5.24	8.5	10.27	10.27
地点	Place:	安徽贵池	滴水岩	麂子排	滴水岩	滴水岩	横冲	五洲村	刘街	火龙潭	火龙潭
海拔	Altitude/m	655	275	260	550	235	400	140	450	480	
坡向	Exposure/ (°)	SW	SW29	NW	/	SE45	/	NE10	SE30	S	
坡度	Slope/ (°)	25	40	35	5	25	/	40	/	42	
乔木层高度	T: Height/m	12	10	12	12	15	7	10	11	12	
乔木层盖度	T: Coverage/%	50	80	70	80	70	60	80	60	80	
灌木层高度	S: Height/m	3	4	4	4	2	4	1.5~2	8	6	
灌木层盖度	S: Coverage/%	70	50	40	60	80	80	40	60	60	
草本层高度	H: Height/m	0.5	1	0.5	0.5	1	0.4	0.2~1	3	2	
草本层盖度	H: Coverage/%	10	30	30	10	20	50	80	40	20	
乔木层种数	No. of species (T)	6	8	6	9	8	4	6	9	10	

续表

顺序号	Running number		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
灌木层种数	No. of species (S)		15	20	12	15	17	23	12	28	20	
草本层种数	No. of species (H)		17	20	24	19	22	10	23	12	10	
层外种数	No. of species (L)		6	8	11	9	5	6	1	9	7	
总种数	No. of species (total)		29	45	35	29	40	37	33	41	39	
植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	Pr
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	TSH	2·2	3·3	2·3	2·2	3·3	2·2	3·2	3	4	V 2-4
櫟木	<i>Loropetalum chinense</i>	TSH	2·2	2·2	+	+	+	·	·	1	1	IV + - 2
毛柄连蕊茶	<i>Camellia fraterna</i>	SH	2·2	+ · 2	2·2	2·2	+	2·2	3·2	1	+	V + - 3
马银花	<i>Rhododendron ovatum</i>	TSH	1·1	1·1	·	+	+	1·2	·	1	+	IV + - 1
豹皮樟	<i>Litsea coreana</i> var. <i>sinensis</i>	TSH	1·1	1·1	1·1	+	+	·	1·2	+	·	IV + - 1
枫香树	<i>Liquidambar formosana</i>	TS	+	+ · 2	·	·	1·1	·	·	1	+	III + - 1
紫弹朴	<i>Celtis biondii</i>	TS	·	1·1	·	·	·	+	2·1	+	+	III + - 2
山胡椒	<i>Lindera glauca</i>	TS	·	+	+	·	+	+	2·2	·	·	III + - 2
港柯	<i>Lithocarpus harlandii</i>	TSH	·	·	+	·	+	·	1·1	1	+	III + - 1
香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i>	TSH	1·2	·	·	1·1	·	·	·	·	·	II 1
甜槠	<i>Castanopsis eyrei</i>	TSH	+	·	·	·	·	·	·	1	2	II + - 2
红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	TSH	+	·	·	1·2	·	·	·	·	+	II + - 1
红枝柴	<i>Meliosma oldhamii</i>	TSH	+	·	·	+	·	·	·	·	·	II +
山槐	<i>Albizia kalkora</i>	TSH	·	+	·	·	+	·	·	·	·	II +
榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i>	TH	·	1·1	+	·	+	·	·	·	·	II + - 1
枳椇	<i>Hovenia acerba</i>	T	·	·	1·1	1·1	·	·	·	·	+	II + - 1
柯	<i>Lithocarpus glaber</i>	TSH	·	·	·	1·1	·	·	·	+	·	II + - 1
大青	<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i>	TSH	·	·	·	·	+	·	·	·	+	II +
江南越桔	<i>Vaccinium mandarinorum</i>	TSH	·	·	·	·	·	2·2	·	+	+	II + - 2
杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	TSH	·	·	·	·	·	·	·	+	+	II +
光叶石楠	<i>Photinia glabra</i>	TS	·	·	·	·	·	·	·	+	+	II +
满山红	<i>Rhododendron mariesii</i>	T	+	·	·	·	·	·	·	·	·	I +
黄连木	<i>Pistacia chinensis</i>	TS	·	2·2	·	·	·	·	·	·	·	I 2
卫矛	<i>Euonymus alatus</i>	T	·	1·1	·	·	·	·	·	·	·	I 1
化香树	<i>Platycarya strobilacea</i>	TSH	·	·	1·1	·	·	·	·	·	·	I 1
黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i>	TSH	·	+	·	·	+	·	+	·	·	II +
苦枥木	<i>Fraxinus insularis</i>	T	·	·	·	·	+	·	·	·	·	I +
短毛椴	<i>Tilia breviradiata</i>	T	·	·	·	·	+	·	·	·	·	I +
木蜡树	<i>Toxicodendron sylvestre</i>	TS	·	·	·	·	·	1·1	·	·	·	I 1
鸡桑	<i>Morus australis</i>	TS	·	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
老鼠矢	<i>Symplocos stellaris</i>	TSH	·	·	·	·	·	·	·	1	·	I 1
薄叶山矾	<i>Symplocos anomala</i>	TS	·	·	·	·	·	·	·	1	·	I 1
尾叶冬青	<i>Ilex wilsonii</i>	TSH	·	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i>	TS	·	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
小叶青冈	<i>Cyclobalanopsis myrsinæfolia</i>	TS	·	·	·	·	·	·	·	+	·	I +

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	Pr	
钻地风	<i>Schizophragma integrifolium</i>	TH	·	·	·	·	·	·	+	·	I +	
红脉钓樟	<i>Lindera rubronervia</i>	TSH	·	·	·	·	·	·	·	+	I +	
山鸡椒	<i>Litsea cubeba</i>	TS	·	·	·	·	·	·	·	+	I +	
小叶猕猴桃	<i>Actinidia lanceolata</i>	TS	·	·	·	·	·	·	·	+	I +	
乌药	<i>Lindera aggregata</i>	SH	+	·	·	+	·	·	+	+	III +	
雀梅藤	<i>Sageretia thea</i>	SH	+	+	·	·	·	·	·	+	II +	
六月雪	<i>Serissa serissoides</i>	SH	·	1 · 1	·	·	·	+	·	+	II + - 1	
芬芳安息香	<i>Styrax odoratissima</i>	SH	·	+ · 2	·	·	·	+	·	·	II +	
华紫珠	<i>Callicarpa cathayana</i>	SH	·	+	+	·	·	·	·	·	II +	
八角枫	<i>Alangium chinense</i>	SH	·	+	·	·	·	+	·	·	II +	
海金子	<i>Pittosporum illicioides</i>	SH	·	+	·	·	·	+	·	·	II +	
茶	<i>Camellia sinensis</i>	SH	·	·	+	·	+	·	·	·	II +	
野梧桐	<i>Mallotus japonicus</i>	SH	·	·	+	·	·	+	·	·	II +	
蔓胡颓子	<i>Elaeagnus glabra</i>	SH	·	·	·	·	+	·	1 · 1	·	II + - 1	
老鸦糊	<i>Callicarpa giraldii</i>	SH	·	·	·	·	·	+	2 · 2	·	II + - 2	
野漆树	<i>Toxicodendron succedaneum</i>	SH	·	·	·	·	·	·	+	·	II +	
杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i>	SH	·	·	·	·	·	·	·	+	II +	
赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i>	SH	·	·	·	·	·	·	+	+	II +	
刺毛越桔	<i>Vaccinium trichocladum</i>	SH	+	·	·	·	·	·	·	·	I +	
莢蒾	<i>Viburnum dilatatum</i>	SH	+	·	·	·	·	·	·	·	I +	
金樱子	<i>Rosa laevigata</i>	SH	·	+	·	·	·	·	·	·	I +	
粉团蔷薇	<i>Rosa multiflora var. cathayensis</i>	SH	·	+	·	·	·	·	·	·	I +	
南烛	<i>Vaccinium bracteatum</i>	SH	·	1 · 1	·	·	·	·	·	·	I 1	
冬青	<i>Ilex chinensis</i>	SH	·	·	+	·	·	·	·	·	I +	
高粱泡	<i>Rubus lambertianus</i>	SH	·	·	·	·	+	·	·	·	I +	
小蜡	<i>Ligustrum sinense</i>	SH	·	·	·	·	+	·	·	·	I +	
豆腐柴	<i>Premna microphylla</i>	SH	·	·	·	·	+	·	·	·	I +	
青灰叶下珠	<i>Phyllanthus glaucus</i>	SH	·	·	·	·	·	+	·	·	I +	
山矾	<i>Symplocos sumuntia</i>	SH	·	·	·	·	·	·	+	·	I +	
野鸭椿	<i>Euscaphis japonica</i>	SH	·	·	·	·	·	·	·	+	I +	
中华胡枝子	<i>Lespedeza chinensis</i>	SH	·	·	·	·	·	·	·	+	I +	
石斑木	<i>Raphiolepis indica</i>	SH	·	·	·	·	·	·	·	1	I +	
野茉莉	<i>Styrax japonicus</i>	SH	·	·	·	·	·	·	·	·	I +	
窄基红褐柃	<i>Eurya rubiginosa var. attenuata</i>	S	1 · 1	1 · 1	·	+	·	1 · 1	1 · 2	·	III + - 1	
格药柃	<i>Eurya muricata</i>	S	·	·	·	·	+	1 · 1	·	1	1	III + - 1
红淡比	<i>Cleyera japonica</i>	S	1 · 1	·	·	+	·	·	·	+	+	III +
阔叶箬竹	<i>Indocalamus latifolius</i>	S	·	·	·	·	4 · 4	·	2 · 2	·	·	II 2 - 4
楤木	<i>Aralia chinensis</i>	S	·	·	·	·	+	+	+	·	·	II +
石楠	<i>Photinia serrulata</i>	S	+	·	+	·	·	·	·	·	·	II +

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	Pr							
杨梅叶蚊母树	<i>Distylium myricoides</i>	S	·	·	·	·	·	1·2	·	·	I 1
白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i>	S	+	·	·	·	·	·	·	·	I +
大叶冬青	<i>Ilex latifolia</i>	S	+	·	·	·	·	·	·	·	I +
柘树	<i>Cudrania tricuspidata</i>	S	·	+	·	·	·	·	·	·	I +
宜昌莢蒾	<i>Viburnum erosum</i>	S	·	+·2	·	·	·	·	·	·	I +
赤杨叶	<i>Alniphyllum fortunei</i>	S	·	+·2	·	·	·	·	·	·	I +
苦茶槭	<i>Acer ginnala</i> subsp. <i>theiferum</i>	S	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
厚壳树	<i>Ehretia thyrsiflora</i>	S	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
锐齿臭樱	<i>Maddenia incisoserrata</i>	S	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
树参	<i>Dendropanax dentiger</i>	S	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
杜茎山	<i>Maesa japonica</i>	S	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
小叶石楠	<i>Photinia parvifolia</i>	S	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
湖北算盘子	<i>Glochidion wilsonii</i>	S	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
具柄冬青	<i>Ilex pedunculosa</i>	S	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
交让木	<i>Daphniphyllum macropodum</i>	S	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
栀子	<i>Gardenia jasminoides</i>	S	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
矩叶鼠刺	<i>Itea oblonga</i>	S	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
山橿	<i>Lindera reflexa</i>	S	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
薹草一种	<i>Carex</i> sp. (细)	H	+	2·2	+	+	+	+	4·2	+	V 2-4
多花黄精	<i>Polygonatum cyrtonema</i>	H	+	·	+	+	+	·	+	·	IV +
鳞毛蕨一种	<i>Dryopteris</i> sp.	H	+	+·2	·	+	+	·	·	·	III +
麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>	H	·	·	1·1	1·2	+	·	+·2	·	III + - 1
淡竹叶	<i>Lophatherum gracile</i>	H	·	1·1	·	·	·	·	+·2	+	II + - 1
狗脊	<i>Woodwardia japonica</i>	H	·	·	·	·	·	1·2	·	+	II + - 1
同形鳞毛蕨	<i>Dryopteris uniformis</i>	H	·	·	·	·	·	1·1	+·2	·	II + - 1
紫金牛	<i>Ardisia japonica</i>	H	+	+	·	1·2	·	·	·	·	II 1 + -
朱砂根	<i>Ardisia crenata</i>	H	+	·	·	+	·	·	·	+	II +
春兰	<i>Cymbidium goeringii</i>	H	·	·	·	+	·	·	·	+	II +
中华薹草	<i>Carex chinensis</i>	H	·	+	+	·	·	·	·	·	II +
黄精	<i>Polygonatum sibiricum</i>	H	·	+	·	·	+	·	·	·	II +
三脉紫菀	<i>Aster ageratoides</i>	H	·	+	·	·	+	·	·	·	II +
玉竹	<i>Polygonatum odoratum</i>	H	·	·	+	·	+	·	·	·	II +
贯众	<i>Cyrtomium fortunei</i>	H	·	·	·	·	+	·	+	·	II +
斜方复叶耳蕨	<i>Arachniodes rhomboidea</i>	H	·	·	·	·	+	·	+·2	·	II +
刺头复叶耳蕨	<i>Arachniodes exilis</i>	H	·	·	·	·	·	·	+·2	·	II +
黄山鳞毛蕨	<i>Dryopteris huangshanensis</i>	H	·	·	·	·	·	·	·	+	II +
牛奶子	<i>Elaeagnus umbellata</i>	H	+	·	·	·	·	·	·	·	I +
甘露子	<i>Stachys sieboldii</i>	H	·	+	·	·	·	·	·	·	I +
乌蕨	<i>Stenoloma chusanum</i>	H	·	+	·	·	·	·	·	·	I +

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	Pr
景天一种	<i>Sedum</i> sp.	H	·	+ · 2	·	·	·	·	·	·	I +
堇菜	<i>Viola verecunda</i>	H	·	+	·	·	·	·	·	·	I +
草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i>	H	·	+	·	·	·	·	·	·	I +
原拉拉藤	<i>Galium aparine</i>	H	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
狭叶四叶葎	<i>Galiogia bungei</i> var. <i>angustifolium</i>	H	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
狭顶鳞毛蕨	<i>Dryopteris lacera</i>	H	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
假黑鳞耳蕨	<i>Polystichum pseudo-makinoi</i>	H	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
序叶苎麻	<i>Boehmeria clidemoides</i> var. <i>diffusa</i>	H	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
山姜	<i>Alpinia japonica</i>	H	·	·	·	+	·	·	·	·	I +
签草 (芒尖 薹)	<i>Carex doniana</i>	H	·	·	·	·	+	·	·	·	I +
小连翘	<i>Hypericum erectum</i>	H	·	·	·	·	+	·	·	·	I +
凤丫蕨	<i>Coniogramme japonica</i>	H	·	·	·	·	+	·	·	·	I +
阔叶山麦冬	<i>Liriope platyphylla</i>	H	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
山莓	<i>Rubus corchorifolius</i>	H	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
疏花野青茅	<i>Deyeuxia arundinacea</i> var. <i>laxiflora</i>	H	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
华东复叶 耳蕨	<i>Arachniodes pseudo-aristata</i>	H	·	·	·	·	·	·	2 · 3	·	I 2
求米草	<i>Oplismenus undulatifolius</i>	H	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
青叶苎麻	<i>Boehmeria nivea</i> var. <i>tenacissima</i>	H	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
边缘鳞盖蕨	<i>Microlepia marginata</i>	H	·	·	·	·	·	·	+	2	I +
杠香藤	<i>Mallotus repandus</i> var. <i>chrysocarpus</i>	H	·	·	·	·	·	·	+	2	I +
远轴鳞毛蕨	<i>Dryopteris dickinsii</i>	H	·	·	·	·	·	·	+	2	I +
蛇足石杉	<i>Huperzia serrata</i>	H	·	·	·	·	·	·	·	+	I +
扭瓦韦	<i>Lepisorus contortus</i>	H	·	·	·	·	·	·	·	+	I +
庐山石韦	<i>Pyrrosia sheareri</i>	H	·	·	·	·	·	·	·	+	I +
兔儿伞	<i>Syneilesia aconitifolia</i>	H	·	·	·	·	·	·	·	+	I +
铁角蕨	<i>Asplenium trichomanes</i>	H	·	·	·	·	·	·	·	+	I +
络石	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	L	+	+ · 2	·	+	+	2 · 2	·	1	+
菝葜	<i>Smilax china</i>	L	·	+	+	+	+	+ · 2	·	1	IV + - 1
南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i>	L	·	·	+ · 2	+	+	·	+	·	III +
三叶木通	<i>Akebia trifoliata</i>	L	·	·	+	+	+	·	·	+	III +
五月瓜藤	<i>Holboellia fargesii</i>	L	·	·	·	·	·	·	·	1	II + - 1
薯蓣	<i>Dioscorea opposita</i>	L	+	+	·	·	·	·	·	·	II +
钝药野木瓜	<i>Stauntonia leucantha</i>	L	+	·	·	+	·	·	·	·	II +
华中五味子	<i>Schisandra sphenanthera</i>	L	·	·	+	+	·	·	·	·	II +
薜荔	<i>Ficus pumila</i>	L	·	·	·	+	+	·	·	·	II +
大叶铁线莲	<i>Clematis heracleifolia</i>	L	·	+	·	·	·	·	·	·	I +
山葡萄	<i>Vitis amurensis</i>	L	·	+	·	·	·	·	·	·	I +
忍冬	<i>Lonicera japonica</i>	L	·	+	·	·	·	·	·	·	I +

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	Pr							
大血藤	<i>Sargentodoxa cuneata</i>	L	·	·	1·2	·	·	·	·	·	I 1
翠云草	<i>Selaginella uncinata</i>	L	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
南蛇藤	<i>Celastrus orbiculatus</i>	L	·	·	+	·	·	·	·	·	I +
单叶铁线莲	<i>Clematis henryi</i>	L	·	·	·	+	·	·	·	·	I +
木通	<i>Akebia quinata</i>	L	·	·	·	·	·	1·2	·	·	I 1
日本薯蓣	<i>Dioscorea japonica</i>	L	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
异叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis heterophylla</i>	L	·	·	·	·	·	+	·	·	I +
鸡矢藤	<i>Paederia scandens</i>	L	·	·	·	·	·	·	+	·	I +
疏花鸡矢藤	<i>Paederia laxiflora</i>	L	·	·	·	·	·	·	+	·	I +

资料来源：1~7：宋永昌，等. 1999. 安徽贵池植被调查（未刊）；8、9：宋永昌，等. 1997~1999. 中日植被比较研究（未刊）；宋永昌，等. 中国东部和日本西部常绿阔叶林比较研究（1998~2000年基金项目编号：39770129）

表 5-5b 檵木/青冈群丛（安徽南部、福建北部）

Tab. 5-5b *Loropetalum chinense / Cyclobalanopsis glauca* Ass. (southern Anhui, northern Fujian)

顺序号 Running number	1	2	3	4	5			
野外样地号 No. of plot	AHZ	AHZ	AHZ	AHZ	FJZ			
样地面积 (乔/灌/草) Size of plot (T/S/H) / m ²	500/80/5	400/64/4	200/32/2	400/64/4	500/80			
日期 Date	1978.10.1	1978.11.15	1978.11.3	1978.10.2	1982.8			
省县 Province & county	皖贵池	皖旌德	皖旌德	皖歙县	闽浦城			
地点 Place	梅村	云乐	云乐	杨村	富岭			
海拔 Altitude/m	400	300	500	200~250	500			
乔木层高度 T: Height/m	6~7	8~9	5~11	8~9	7~10			
乔木层盖度 T: Coverage/%	85~90	95	85	80	75			
灌木层高度 S: Height/m	0.5~3	0.5~5	0.5~3	0.5~2	/			
灌木层盖度 S: Coverage/%	8	75	50	27	/			
草本层高度 H: Height/m	0.1~0.6	0.1~0.4	0.1~0.2	0.3~1	/			
草本层盖度 H: Coverage/%	4	15	1	7	/			
乔木层种数 No. of species (T)	10	4	9	4	/			
灌木层种数 No. of species (S)	13	11	13	23	/			
草本层种数 No. of species (H)	7	3	2	5	/			
层外种数 No. of species (L&E)	4	2	3	6	/			
总种数 No. of species (total)	32	18	24	34	/			
植物中文名	拉丁名	层	I. V. %	I. V. %	I. V. %	I. V. %	I. V. %	Pr
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	TSH	75	70	38	69	48.9	5
檵木	<i>Loropetalum chinense</i>	TSH	2	15	33	3	18.1	5
马银花	<i>Rhododendron ovatum</i>	TSH	1	1	4	4	·	4
杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	TSH	7	+	6	·	·	3
豹皮樟	<i>Litsea coreana</i> var. <i>sinensis</i>	TS	·	3	4	+	·	3
黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i>	TSH	3	·	·	+	6.1	3
甜槠	<i>Castanopsis eyrei</i>	TSH	7	20	·	·	·	2
枫香树	<i>Liquidambar formosana</i>	TS	5	·	10	·	·	2
柯	<i>Lithocarpus glaber</i>	TSH	·	·	30	+	·	2

续表

植物中文名	拉丁名	层	I. V. %	Pr				
山胡椒	<i>Lindera glauca</i>	TS	•	•	•	+	8.3	2
短柄枹栎	<i>Quercus serrata</i> var. <i>brevipetiolata</i>	TS	10	•	1	•	•	2
马尾松	<i>Pinus massoniana</i>	T	•	2	•	•	18.3	2
苦槠	<i>Castanopsis sclerophylla</i>	TS	•	•	•	10	10.3	2
港柯*	<i>Lithocarpus harlandii</i> *	T	10	•	•	•	•	1
天竺桂	<i>Cinnamomum japonicum</i>	TS	7	•	•	•	•	1
蜡瓣花	<i>Corylopsis sinensis</i>	TS	5	•	•	•	•	1
三尖杉	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	T	4	•	•	•	•	1
大青	<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i>	TSH	1	•	•	•	•	1
化香树	<i>Platycarya strobilacea</i>	TSH	1	•	•	•	•	1
红脉钓樟	<i>Lindera rubronervia</i>	TSH	1	•	•	•	•	1
光叶石楠	<i>Photinia glabra</i>	TS	•	15	•	•	•	1
野柿	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i>	TS	•	•	3	•	•	1
山槐	<i>Albizia kalkora</i>	TSH	•	•	1	•	•	1
白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i>	TS	•	•	1	•	•	1
江南越桔	<i>Vaccinium mandarinorum</i>	TSH	•	•	•	+	•	1
老鼠矢	<i>Symplocos stellaris</i>	TSH	•	•	•	+	•	1
木蜡树	<i>Toxicodendron sylvestre</i>	TS	•	•	•	+	•	1
白栎	<i>Quercus fabri</i>	T	•	•	•	•	13.3	1
锥栗	<i>Castanea henryi</i>	T	•	•	•	•	5.8	1
木荷	<i>Schima superba</i>	T	•	•	•	•	3.4	1
尖连蕊茶	<i>Camellia cuspidata</i>	S	1	2	3	•	•	3
毛柄连蕊茶	<i>Camellia fraterna</i>	SH	1	•	•	8	•	2
南烛	<i>Vaccinium bracteatum</i>	SH	•	•	10	5	9.5	3
朱砂根	<i>Ardisia crenata</i>	SH	1	10	1	•	•	3
白马骨	<i>Serissa serissoides</i>	SH	1	•	+	•	•	2
杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i>	SH	•	•	10	•	22.8	2
茶	<i>Camellia sinensis</i>	SH	1	•	•	•	•	1
红淡比(杨桐)	<i>Cleyera japonica</i>	S	•	40	•	•	•	1
厚边木犀	<i>Osmanthus marginatus</i>	S	•	3	•	•	•	1
毛果珍珠花	<i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>hebecarpa</i>	S	•	+	•	•	•	1
柃木一种	<i>Eurya</i> sp.	S	•	•	3	•	•	1
中华绣线菊	<i>Spiraea chinensis</i>	S	•	•	1	•	•	1
赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i>	SH	•	•	1	•	•	1
芬芳安息香	<i>Styrax odoratissima</i>	SH	•	•	•	5	•	1
格药柃	<i>Eurya muricata</i>	S	•	•	•	2	•	1
乌药	<i>Lindera aggregata</i>	SH	•	•	•	+	•	1
莢蒾	<i>Viburnum dilatatum</i>	SH	•	•	•	+	•	1
山矾	<i>Symplocos sumuntia</i>	SH	•	•	•	+	•	1
栀子	<i>Gardenia jasminoides</i>	S	•	•	•	+	•	1
矩叶鼠刺	<i>Itea oblonga</i>	S	•	•	•	+	•	1
鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i>	S	•	•	•	+	•	1

续表

植物中文名	拉丁名	层	I. V. %	Pr				
盐肤木	<i>Rhus chinensis</i>	S	·	·	·	+	·	1
华东野核桃	<i>Juglans cathayensis</i> var. <i>formosana</i>	S	·	·	·	+	·	1
杜鹃属一种	<i>Rhododendron</i> sp.	S	·	·	·	·	4.2	1
苦竹	<i>Pleioblastus amarus</i>	S	·	·	·	·	4.2	1
越桔一种	<i>Vaccinium</i> sp.	S	·	·	·	·	3.7	1
杨桐(黄瑞木)	<i>Adinandra millettii</i>	S	·	·	·	·	3.4	1
狭叶珍珠花	<i>Lyonia ovalifolia</i> var. <i>lanceolata</i>	S	·	·	·	·	3.3	1
细齿叶柃	<i>Eurya nitida</i>	S	·	·	·	·	3.1	1
其他	Others	S	·	·	·	·	13.3	1
狗脊	<i>Woodwardia japonica</i>	H	1	7	1	+	·	4
薹草一种	<i>Carex</i> sp. (细)	H	·	3	1	—2	·	3
蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	H	1	·	·	+	·	2
黄精一种	<i>Polygonatum</i> sp.	H	1	·	·	·	·	1
金星蕨一种	<i>Parathelypteris</i> sp.	H	1	·	·	·	·	1
荩草	<i>Arthraxon hispidus</i>	H	1	·	·	·	·	1
麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>	H	1	·	·	·	·	1
紫萁	<i>Osmunda japonica</i>	H	1	·	·	·	·	1
鳞毛蕨一种	<i>Dryopteris</i> sp.	H	·	5	·	·	·	1
阔叶山麦冬	<i>Liriope muscari</i> (<i>L. platyphylla</i>)	H	·	·	·	5	·	1
韩信草	<i>Scutellaria indica</i>	H	·	·	·	+	·	1
芒萁	<i>Dicranopteris dichotoma</i>	H	·	·	·	·	+++	1
菝葜	<i>Smilax china</i>	L	1	+	1	·	·	3
络石	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	L	1	·	·	1	·	2
地锦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	L	1	·	·	+	·	2
土茯苓	<i>Smilax glabra</i>	L	·	·	1	+	·	2
南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i>	L	·	·	·	+	·	1
薯蓣	<i>Dioscorea opposita</i>	L	+	·	·	·	·	1
牛姆瓜	<i>Holboellia grandiflora</i>	L	·	+	·	·	·	1
海金沙	<i>Lygodium japonicum</i>	L	·	·	1	·	·	1
香花崖豆藤	<i>Millettia dielsiana</i>	L	·	·	·	2	·	1
紫藤	<i>Wisteria sinensis</i>	L	·	·	·	+	·	1

* 原定名为绵柯 (*Lithocarpus henryi*)

资料来源：1~4. 《安徽植被》写作组. 1983. 《安徽植被》一书中原表 3-41 “青冈栎、柯-櫟木-薹草群落” (*Cyclobalanopsis glauca*、*Lithocarpus glaber*-*Loropetalum chinense*-*Carex* sp. Comm.)；原表 3-42 “青冈栎、绵柯-连蕊茶、櫟木-狗脊蕨群落” (*Cyclobalanopsis glauca*、*Lithocarpus henryi*-*Camellia fraterna*、*Loropetalum chinense*-*Woodwardia japonica* Comm.)；原表 3-43 “青冈栎、苦槠-连蕊茶-细叶土麦冬群落” (*Cyclobalanopsis glauca*、*Castanopsis sclerophylla*-*Camellia fraterna*-*Liriope muscari* Comm.)，以及原表 3-44 “青冈栎、甜槠-杨桐-狗脊群落” (*Cyclobalanopsis glauca*、*Castanopsis eyrei*-*Cleyera japonica*-*Woodwardia japonica* Comm.)；5. 引自：林鹏. 1990. 《福建植被》中原表 6-19. “青冈栎-映山红-櫟木-芒萁群丛” (*Cyclobalanopsis glauca*-*Rhododendron simsii*+*Loropetalum chinense*-*Dicranopteris dichotoma* Ass.)

B. 南部青冈优势度亚型群落表

表 5-6 绒毛润楠/青冈群落 (福建北部)

Tab. 5-6 *Machilus velutina/Cyclobalanopsis glauca* Comm. (northern Fujian)

顺序号	Running number		1	2	3	4	5
野外样地号	No. of plot		崇 01	崇 05	崇 08	蒲 17	蒲 32
样地面积	Size of plot/m ²		100	100	100	100	100
日期	Date		1958.8.13	1958.8.15	1985.8.16	1958.8.3	1958.8.3
地点	Place		黄竹凹	大东坑	大东坑	古楼	大路
坡向	Exposure/ (°)		SW12	SE30	SE80	SW86	SE60
坡度	Slope/ (°)		40	35	45	43	70
群落总盖度	Total coverage/%		85	90	80	90	80
乔木层种数	No. of species (T)		10	6	6	5	7
灌木层种数	No. of species (S)		9	19	19	22	18
草本层种数	No. of species (H)		6	4	4	4	4
层外种数	No. of species (L)		7	6	/	4	/
植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B
青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	T/S	2·2/	2·2/	2·1/	3·2/+	3·2/+
绒毛润楠	<i>Machilus velutina</i>	T/S	+/	+	•	+/2·2	/2·1
杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	T/S	•	1·1/	2·1/	2·1/+	2·1/+
柯	<i>Lithocarpus glaber</i>	T/S	2·2/	3·2/	+/+	•	•
杨桐 (黄瑞木)	<i>Adinandra millettii</i>	T	2·1	+	•	2·2	•
櫟木	<i>Loropetalum chinense</i>	T/S	2·2/2·1	•	•	/+	/1·1
矩叶鼠刺	<i>Itea oblonga</i>	T/S	•	2·1/2·1	+/+	+	•
树参	<i>Dendropanax dentiger</i>	T/S	•	•	+/+	/+	/+
密花树	<i>Rapanea nerifolia</i>	T/S	2·1/	/+	•	•	•
毛锥	<i>Castanopsis fordii</i>	T/S	1·1/	/+	•	•	•
蕈树	<i>Altingia chinensis</i>	T/S	+/	/+	•	•	2
钩锥	<i>Castanopsis tibetana</i>	T/S	•	/+	•	•	2·2/2·1
马银花	<i>Rhododendron ovatum</i>	T/S	•	•	•	/2·1	+/2·1
红淡比	<i>Cleyera japonica</i>	T	2·1	•	•	•	1
多毛茜草树	<i>Aidia pycnantha</i> (<i>Randia acuminatissima</i>)	T	+	•	•	•	1
虎皮楠	<i>Daphniphyllum oldhami</i>	T	•	+	•	•	1
苦槠	<i>Castanopsis sclerophylla</i>	T	•	•	2·2	•	1
豹皮樟	<i>Litsea coreana</i> var. <i>sinensis</i>	T/S	•	•	•	1·1/+	•
栲树	<i>Castanopsis fargesii</i>	T	•	•	•	•	1·1
黄杞	<i>Engelhardtia roxburghiana</i>	T/S	•	•	•	•	1·1/2·1
马尾松	<i>Pinus massoniana</i>	T	•	•	•	•	1·1
柃木	<i>Eurya japonica</i>	S	•	•	2·1	2·2	2·1
细齿叶柃	<i>Eurya nitida</i>	S	+	3·1	•	•	2

续表

植物中文名	拉丁名	层	B-B	B-B	B-B	B-B	B-B	Pr
刨花润楠	<i>Machilus pauhoi</i>	S	+	1·1	·	·	·	2
鹿角杜鹃	<i>Rhododendron latoucheae</i>	S	·	1·1	·	1·1	·	2
满山红	<i>Rhododendron mariesii</i>	S	·	1·1	·	+	·	2
大萼杨桐	<i>Adinandra glischrolooma</i> var. <i>macrosepala</i>	S	·	+	+	·	·	2
木蜡树	<i>Toxicodendron sylvestre</i>	S	·	+	+	·	·	2
南烛	<i>Vaccinium bracteatum</i>	S	·	+	1·1	·	·	2
栀子	<i>Gardenia jasminoides</i>	S	·	·	+	2·2	·	2
尖连蕊茶	<i>Camellia cuspidata</i>	S	·	·	·	1·2	1·1	2
苦竹	<i>Pleioblastus amarus</i>	S	·	·	·	2·2	2·1	2
毛冬青	<i>Ilex pubescens</i>	S	·	·	·	+	+	2
乌药	<i>Lindera aggregata</i>	S	·	·	·	+	+	2
箬竹	<i>Indocalamus tessellatus</i>	S	2·1/+	·	·	·	·	1
竹柏	<i>Podocarpus nagi</i>	S	2·1	·	·	·	·	1
木油桐	<i>Vernicia montana</i>	S	1·1	·	·	·	·	1
朱砂根	<i>Ardisia crenata</i>	S	+	·	·	·	·	1
浙江新木姜子	<i>Neolitsea aurata</i> var. <i>chekiangensis</i>	S	+	·	·	·	·	1
建润楠	<i>Machilus oreophila</i>	S	·	1·1	·	·	·	1
山乌柏	<i>Sapium discolor</i>	S	·	1·1	·	·	·	1
罗浮柿	<i>Diospyros morrisiana</i>	S	·	+	·	·	·	1
红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	S	·	+	·	·	·	1
红枝柴	<i>Meliosma oldhamii</i>	S	·	+	·	·	·	1
赤车(赤车使者)	<i>Pellionia radicans</i>	S	·	+	·	·	·	1
刺毛杜鹃	<i>Rhododendron championae</i>	S	·	·	2·1	·	·	1
八角枫	<i>Alangium chinense</i>	S	·	·	+	·	·	1
柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i>	S	·	·	+	·	·	1
甜槠	<i>Castanopsis eyrei</i>	S	·	·	+	·	·	1
天仙果(牛乳榕)	<i>Ficus erecta</i> var. <i>beecheyana</i>	S	·	·	+	·	·	1
蜡莲绣球	<i>Hydrangea strigosa</i>	S	·	·	+	·	·	1
冬青一种	<i>Ilex</i> sp.	S	·	·	+	·	·	1
野梧桐	<i>Mallotus japonicus</i>	S	·	·	+	·	·	1
白楠	<i>Phoebe neurantha</i>	S	·	·	+	·	·	1
野茉莉	<i>Styrax japonicus</i>	S	·	·	+	·	·	1
羊舌树	<i>Symplocos glauca</i>	S	·	·	+	·	·	1
山蜡梅	<i>Chimonanthus nitens</i>	S	·	·	·	1·2	·	1
石斑木	<i>Raphiolepis indica</i>	S	·	·	·	1·1	·	1
华杜英	<i>Elaeocarpus chinensis</i>	S	·	·	·	+	·	1
女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>	S	·	·	·	+	·	1
赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i>	S	·	·	·	+	·	1