

常用中草药

CHANGYONG ZHONGCAOYAO

[图谱及配方]
TUPU JI PEIFANG

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海



贵州科技出版社

常用中草药图谱及配方

3

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海

编辑委员 (按姓氏笔画顺序排列)

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨传东	周 静	周惟繁
苟光前	姜东辉	夏同珩	梅 颖
黄 敏	董发发	潘晓瑛	

贵州科技出版社

贵 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药图谱及配方. 3/杨卫平, 夏同珩主编.
—贵阳: 贵州科技出版社, 2012.9
ISBN 978 - 7 - 5532 - 0034 - 7

I. ①常… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图谱
②中草药—验方 IV. ①R282.7 - 64②R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 219537 号

出版发行	贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路 289 号(邮政编码:550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳德堡快速印务有限公司
版 次	2012 年 9 月第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次
字 数	495 千字
印 张	10.75
印 数	1 ~ 3 000 册
开 本	890mm × 1240mm 1/32
书 号	ISBN 978 - 7 - 5532 - 0034 - 7
定 价	47.00 元

前 言

当前，环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题，世界各国民众普遍关注，各国政府也高度重视，积极投入人力、物力，努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业，也是环境问题的一个重要方面，一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品，需要耗费大量的人力、物力、财力，也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展，使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中，遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激，再加上工作紧张，难免身心疲惫，渴求返璞归真，回到农耕田园生活之中；与此同时，也对防病治病提出了新的要求，希望能更多地使用天然药物，以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求，并不过分，同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年，在从事诊病治病的医疗实践中，历代医药人员努力工作，积累了丰富的诊病用药经验，使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验，可供世界各国借鉴和参考，这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势，本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片，并从中挑选出近1 800种常用中草药的照片，为其撰写相关文字，编著成了《常用中草药图谱及配方》一书，分六册出版。

全书编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特

征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编杨卫平及编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘冬、梅颖、冷丽、何前松、吴筱枫系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

目 录

薯草（一枝蒿）·····	（1）	三叶鬼针草·····	（30）
洋薯草（千叶薯、蜈蚣蒿）·····	（2）	狼把草·····	（31）
土一枝蒿（飞天蜈蚣）·····	（3）	艾纳香·····	（32）
水葫芦根·····	（4）	走马风（六耳铃）·····	（33）
风气草·····	（5）	东风草（毛千里光）·····	（34）
胜红蓟·····	（6）	金光菊（山柳菊）·····	（35）
金边兔耳·····	（7）	金盏草·····	（36）
倒赤伞·····	（8）	金盏菊·····	（37）
叶下花·····	（9）	飞廉·····	（38）
大叶白头翁·····	（10）	天名精·····	（39）
午香草（香附草）·····	（11）	鹤虱（野烟）·····	（40）
通肠香（九里香）·····	（12）	杓儿菜（金挖耳）·····	（41）
牛蒡（恶实、大力子）·····	（13）	金挖耳（挖耳草）·····	（42）
牛蒡根（恶实根、牛菜）·····	（14）	红花·····	（43）
黄花蒿（苦蒿）·····	（15）	鹅不食草·····	（44）
青蒿·····	（16）	野菊花（苦蕒）·····	（45）
艾·····	（17）	茼蒿（茼蒿菜）·····	（46）
牡蒿（齐头蒿）·····	（18）	大蓟·····	（47）
红姨妈菜（鸭脚艾）·····	（19）	线叶蓟（尖叶小蓟）·····	（48）
茵陈（茵陈蒿）·····	（20）	小蓟（小刺菜）·····	（49）
白蒿·····	（21）	虾须草（绿绿草、草麻黄）·····	（50）
山白菊·····	（22）	白酒草·····	（51）
紫菀·····	（23）	线叶金鸡菊（除虫菊）·····	（52）
苍术·····	（24）	野木耳菜（假茼蒿）·····	（53）
白术·····	（25）	大丽菊（大理菊、苕儿花）·····	（54）
云木香（木香）·····	（26）	菊花·····	（55）
鬼针草·····	（27）	蚯疽草（鱼眼菊）·····	（56）
金盏银盘（鬼针草）·····	（28）	鱼眼草·····	（57）
小花鬼针草（鹿角草、小鬼钗）·····	（29）	东风菜·····	（58）

川木香····· (59)	翼齿六棱菊(六棱麻、鹿耳林) (94)
旱莲草(墨旱莲)····· (60)	山紫菀(葫芦七)····· (95)
地苦胆····· (61)	橐吾(接骨丹)····· (96)
一点红(羊蹄草)····· (62)	蜂斗菜····· (97)
一年蓬····· (63)	秋分草(大鱼鳅串)····· (98)
灯盏细辛····· (64)	雪莲····· (99)
佩兰(兰草)····· (65)	丝茅七(仙茅参)····· (101)
山佩兰(单叶佩兰)····· (66)	大红青菜(山青菜)····· (102)
尖佩兰(野马追)····· (67)	狗舌草····· (103)
飞机草(香泽兰)····· (68)	蒲儿根(肥猪苗)····· (104)
萍蓬草(橐吾)····· (69)	千里光(九里光)····· (105)
毛大丁草(兔耳风)····· (70)	豨莶草····· (106)
绵花草(清明菜、小火草)····· (71)	水飞蓟····· (107)
地膏药(宽叶鼠曲草)····· (72)	一枝黄花(金柴胡)····· (108)
细叶鼠曲草(天青地白)····· (73)	苦菜(苦苣、苦蕒)····· (109)
白背三七(玉枇杷、金枇杷)····· (74)	漏芦····· (110)
土三七(血当归)····· (75)	兔儿伞(一把伞)····· (111)
葵花(向日葵)····· (76)	万寿菊····· (112)
葵花根····· (77)	孔雀草····· (113)
菊芋(洋姜)····· (78)	蒲公英(黄花地丁)····· (114)
泥糊菜(豹子草)····· (79)	款冬花····· (115)
白牛胆(大毛香)····· (80)	蟛蜞菊····· (116)
土木香····· (81)	苍耳(藁耳)····· (117)
水朝阳草(金沸草)····· (82)	苍耳子(藁耳子)····· (118)
旋覆花····· (83)	黄鹌菜(黄狗头)····· (119)
金沸草····· (84)	金线兰····· (120)
山苦蕒(野苣)····· (85)	白及····· (121)
剪刀股····· (86)	麦斛(果上叶)····· (122)
苦蕒菜(苦蕒)····· (87)	果上叶····· (123)
马兰(田边菊、鱼鳅串)····· (88)	马牙七····· (124)
野苣荬(丁萝卜)····· (89)	虾脊兰(九子连环草)····· (125)
山苦菜(野洋烟)····· (90)	四里麻····· (126)
苣荬····· (91)	银兰····· (127)
苦苣····· (92)	金兰····· (128)
鹿耳翎(臭灵丹、六棱菊)····· (93)	贝母兰····· (129)

山慈姑·····	(130)	菱角·····	(166)
独蒜兰·····	(131)	甜荞(荞麦)·····	(167)
云南独蒜兰·····	(132)	万年荞(苦荞头、野南荞)·····	(168)
建兰·····	(133)	竹节蓼·····	(169)
蕙兰·····	(134)	篇蓄(扁蓄)·····	(170)
寒兰·····	(135)	拳参(紫参、鸢头鸡、地马蜂)·····	(171)
岩兰(硬叶兰)·····	(136)	头花蓼(四季红、太阳草)·····	(172)
兔耳草·····	(137)	血苕(红药子)·····	(173)
扇脉杓兰(扇子七)·····	(138)	虎杖(花斑竹、酸汤杆)·····	(174)
石斛·····	(139)	胖血藤(毛血藤)·····	(175)
玉凤兰(玉峰兰)·····	(140)	丛枝蓼·····	(176)
天麻·····	(141)	水蓼·····	(177)
斑叶兰·····	(143)	何首乌·····	(178)
见血清·····	(144)	杠板归(蛇倒退、扛板归)·····	(179)
钗子股·····	(145)	荭草(红草、水红花子)·····	(180)
鹤顶兰·····	(146)	花蝴蝶(赤胫散)·····	(181)
盘龙参(米洋参)·····	(147)	雀翘(倒刺林)·····	(182)
喜树·····	(148)	廊茵(大杠板归)·····	(183)
甜菜(恭菜、牛皮菜)·····	(149)	羊蹄(土大黄)·····	(184)
土荆芥·····	(150)	大黄(将军)·····	(185)
藜(藿、灰苋菜)·····	(151)	金不换(土大黄、血三七)·····	(186)
灰藿(灰灰菜)·····	(152)	圆叶蓼(云支花)·····	(187)
地肤子·····	(153)	野菰(牛心草)·····	(188)
菠菜(菠棱菜、角菜)·····	(154)	肉苁蓉(大芸)·····	(189)
芒(芒萁、郎鸡叶)·····	(155)	列当·····	(190)
刺齿贯众(尖耳贯众)·····	(156)	牛泔草(夜抹光)·····	(191)
小贯众(公鸡头)·····	(157)	毛脉柳叶菜(柳叶菜)·····	(192)
大贯众(绵马贯众)·····	(158)	柳叶菜(水接骨丹)·····	(193)
乌韭(乌蕨)·····	(159)	心胆草(水朝阳花)·····	(194)
米仔兰(米兰花)·····	(160)	丁香蓼(水蓬砂)·····	(195)
苦楝皮(川楝皮)·····	(161)	月见草(夜来香)·····	(196)
苦楝子·····	(162)	红花月见草(红花夜来香)·····	(197)
川楝子(金铃子)·····	(163)	穿心草·····	(198)
地黄连(矮陀陀)·····	(164)	秦艽·····	(199)
椿(香椿、椿白皮)·····	(165)	青鱼胆草(小龙胆草)·····	(200)

小儿血参(笔龙胆)·····	(201)	奶浆藤(通光散)·····	(236)
龙胆(龙胆草)·····	(202)	蓝叶藤·····	(237)
石龙胆(蓝花地丁)·····	(203)	奶浆草(奶浆藤、萝藦)·····	(238)
扁蕾·····	(204)	黑骨藤(滇杠柳)·····	(239)
花锚·····	(205)	香加皮(杠柳皮)·····	(240)
黑及草·····	(206)	麻黄·····	(241)
苔菜·····	(207)	珍珠风(珠子树)·····	(242)
獐牙菜·····	(208)	紫珠·····	(243)
贵州獐牙菜·····	(209)	老鸦糊·····	(244)
青叶胆(紫花龙胆)·····	(210)	大叶紫珠·····	(245)
当药·····	(211)	红紫珠(对节树)·····	(246)
蔓龙胆(青鱼胆草)·····	(212)	臭牡丹·····	(247)
冰片·····	(213)	臭牡丹根·····	(248)
金边莲(金边龙舌兰)·····	(214)	大青(大青叶)·····	(249)
龙舌兰·····	(215)	大青根·····	(250)
朱蕉·····	(216)	荷包花·····	(251)
露兜子(槽罟子、野菠萝)·····	(217)	臭茉莉·····	(252)
水晶兰(梦兰花)·····	(218)	三百棒(山枇杷、三台花)·····	(253)
鹿衔草(鹿蹄草、鹿含草)·····	(219)	臭梧桐·····	(254)
罗汉松实·····	(220)	臭梧桐根·····	(255)
罗汉松根皮·····	(221)	五色梅(马缨丹)·····	(256)
落葵·····	(222)	五色梅叶·····	(257)
藤三七·····	(223)	臭黄荆·····	(258)
马利筋(草木棉)·····	(224)	腐婢(斑鸠窝)·····	(259)
吊灯花·····	(225)	斑鸠占(臭树)·····	(260)
白薇·····	(226)	马鞭草·····	(261)
牛皮消(白首乌)·····	(227)	黄荆子·····	(262)
白前·····	(228)	黄荆叶·····	(263)
竹林消(川白薇、老君须)·····	(229)	牡荆子·····	(264)
青羊参(牛尾七)·····	(230)	牡荆叶·····	(265)
徐长卿(对月莲)·····	(231)	牡荆根·····	(266)
柳叶白前·····	(232)	蔓荆子·····	(267)
隔山消·····	(233)	午时花(太阳花)·····	(268)
球兰·····	(234)	马齿苋·····	(269)
白杜仲(三百银)·····	(235)	土人參(栝兰)·····	(270)

马兜铃·····	(271)	美人蕉·····	(297)
青木香·····	(272)	猕猴桃·····	(298)
天仙藤 (青木香藤) ·····	(273)	毛花猕猴桃 (毛花杨桃、毛冬瓜) ·····	(299)
木防己·····	(274)	木天蓼·····	(300)
汉中防己·····	(275)	蘑菇·····	(301)
大白解薯·····	(276)	木耳·····	(302)
关木通·····	(277)	南五味子 (五味子) ·····	(303)
绵毛马兜铃 (寻骨风) ·····	(278)	五香血藤·····	(304)
大青木香·····	(279)	北五味子 (五味子) ·····	(305)
莒叶细辛 (接气草) ·····	(280)	厚朴·····	(306)
尾花细辛·····	(281)	凹叶厚朴·····	(307)
杜衡 (土细辛) ·····	(282)	峨嵋含笑·····	(308)
细辛·····	(283)	黑老虎 (饭团藤、饭团根) ·····	(309)
大乌金草·····	(284)	莽草·····	(310)
花脸细辛 (翻天印) ·····	(285)	玉兰 (辛夷) ·····	(311)
密蒙花·····	(286)	辛夷·····	(312)
钩吻 (断肠草) ·····	(287)	八角 (八角茴香、大茴香) ·····	(313)
马钱子·····	(288)	血藤 (紫金藤) ·····	(314)
马桑叶·····	(289)	缅桂·····	(315)
马桑根·····	(290)	黄角兰 (黄兰、黄缅桂) ·····	(316)
满江红·····	(291)	鹅掌楸 (双飘树、马褂木) ·····	(317)
老鹳草·····	(292)	木棉花·····	(318)
生扯拢 (破铜钱) ·····	(293)	木棉根·····	(319)
香叶·····	(294)	中文名笔画索引·····	(320)
石蜡红·····	(295)	拉丁学名索引·····	(327)
茅膏菜·····	(296)		

蓍 草（一枝蒿）

【来源及药用部位】菊科植物蓍 *Achillea alpina* L.的全草。

【本草论述】《本草纲目》：“蓍叶主治疟疾。”

【形态特征】多年生草本，高50~100cm。具短根茎。茎直立，有棱条，上部分枝。叶互生，叶片长线状披针形，栉齿状羽状深裂或浅裂，裂片线形，排列稀疏，半抱茎，两面生长柔毛。头状花序多数，集成伞房状；总苞钟状，3层，覆瓦状排列，绿色；边缘舌状花雌性，5~11朵，白色，中心管状花两性，白色；花药黄色，伸出花冠。瘦果扁平。花期7~9月。

生于向阳山坡、草地、林缘，有栽培。分布于东北、华北、西南及宁夏、甘肃、河南等地。

【性味功效】辛、苦，微温；有小毒。祛风止痛，活血，解毒。

【常用配方】**1.治跌打伤痛** 一枝蒿30g，泡酒涂搽伤处。**2.治闭经腹痛** 一枝蒿茎叶10~15g，水煎服。**3.治风湿痹筋骨疼痛** 一枝蒿3g，五香血藤、黑骨藤各15g，见血飞6g，排风藤12g，红牛膝9g，泡酒1000ml，每次服15~30ml。

4.治牙痛 一枝蒿鲜茎叶适量，捣绒，揉搽太阳穴。

【主要化学成分】含蓍素，兰香油萜，乌头酸，菊糖和桉叶素等。

【现代研究】药理研究显示有抗炎，抗菌，解热，镇静和镇痛等作用。现代临床用于治疗感冒发热，跌打损伤，风湿病筋骨疼痛，牙痛，外伤疼痛和月经不调等。



洋蓍草（千叶蓍、蜈蚣蒿）

【来源及药用部位】菊科植物千叶蓍*Achillea millefolium* L.的全草。

【本草论述】《陕西中草药》：“清热解毒，凉血消肿，止血，调经。”

【形态特征】多年生草本，高40~100cm。具匍匐根茎。茎直立，有细条纹，生白色长柔毛。叶互生，叶片长圆状披针形或近条形，2~3回羽状全裂，裂片多数、细小，先端尖。头状花序多数，集成伞房状；总苞倒卵形，总苞片3层，覆瓦状排列；各头状花序有边花5朵，舌片近圆形，白色、粉红色或淡紫色；盘花两性，管状，黄色，5齿裂。瘦果宽卵圆形，淡绿色。花、果期7~9月。

生于草地、荒地及道路沿线。分布于东北及内蒙古、新疆等地。

【性味功效】辛、苦，凉；有毒。祛风，活血，止痛，解毒。

【常用配方】**1.治跌打损伤、疮疡肿毒** 千叶蓍15g，土当归9g，水煎服；并取千叶蓍适量，水煎熏洗患处。**2.治风湿痹痛** 千叶蓍、骆驼蓬各等份，水煎熏洗患处。**3.治痔疮出血、痛经** 千叶蓍9g，紫参6g，水煎服。

【主要化学成分】含愈创木内酯类，蒿属种萜，墨西哥蒿素，千叶蓍内酯和胆甾醇等。

【现代研究】药理研究显示有抗炎，止血和降血压等作用。现代临床用于治疗跌打损伤，风湿病筋骨疼痛，痈肿疮毒，痔疮出血和痛经等。



土一枝蒿（飞天蜈蚣）

【来源及药用部位】菊科植物云南蓍*Achillea wilsoniana* Heimerl ex Hand.-Mazz.的全草。

【本草论述】《文山中草药》：“祛风除湿，消肿止血。”

【形态特征】多年生草本，高30~100cm。茎有纵皱纹。叶互生，线形，2~3回羽状深裂，裂片线形，基部半抱茎。头状花序排列成伞房状，簇生于枝端；边缘舌状花雌性，白色或淡粉红色，中央管状花两性，浅黄色。瘦果。花期6~7月。

生于高山草丛及山坡阴凉处，有栽培。分布于西南各地。

【性味功效】辛、苦，平；有小毒。活血止痛，消肿解毒。

【常用配方】1.治跌打伤痛 土一枝蒿、铁筷子、见血飞、大血藤各20g，泡酒服。

2.治胃寒痛 土一枝蒿0.6~0.9g，嚼服。3.治肢体末端疼痛 土一枝蒿、白花刺根各10g，酒水各半煎服，取药液外搽痛处。4.治狗咬伤 土一枝蒿、野烟叶鲜品各适量，捣烂外敷。5.治蛇咬伤 土一枝蒿、独脚莲、八角莲各10g，水煎服；药渣捣烂外敷。

【主要化学成分】含挥发油，鞣质和有机酸等。

【现代研究】现代临床用于治疗急性乳腺炎，急性扁桃体炎，跌打损伤，风湿病筋骨疼痛，脉管炎，牙痛，狗咬伤和痛经等。



水葫芦根

【来源及药用部位】菊科植物和尚菜 *Adenocaulon himalaicum* Edgew.的全草。

【本草论述】《贵州民间药物》：“调气，逐瘀。”

【形态特征】多年生草本，高30~100cm。根茎匍匐。茎直立，多分枝，粗壮。叶互生，有宽窄不等的翅；下部茎生叶肾形或圆肾形，先端急尖或钝，基部心形，边缘有不等的波壮大牙齿，齿端有突尖；中部叶三角状卵形，向上叶渐小。头状花序排列成圆锥状；花梗短，生白色柔毛；总苞半球形，总苞片5~7个，宽卵形；雌性白色，两性花淡白色。瘦果棍棒状，生多数带柄腺毛。花期7~8月。

生于林下、林缘、路旁及河谷阴湿处。分布于全国各地。

【性味功效】辛、苦，温。宣肺平喘，利水消肿，散瘀止痛。

【常用配方】**1.治气喘水肿** 水葫芦根500g，煮绿壳鸭蛋20个，半熟时敲碎蛋壳，再煮熟，每天早晚各吃鸭蛋2个。**2.治产后腹痛** 水葫芦根15g，水煎服。**3.治骨折伤处疼痛** 水葫芦根鲜品适量，捣烂外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗咳嗽气喘，水肿小便不利，跌打损伤和产后腹痛等。



风气草

【来源及药用部位】菊科植物下田菊*Adenostemma lawenia* (L.) O. Kuntze的全草。

【本草论述】《贵州民间药物》：“除风湿，解表。”

【形态特征】多年生草本，高30~100cm。茎直立，多单生，上部叉状分枝，具白色短柔毛，下部光滑无毛。叶对生，有狭翼；基生叶小，花期凋落，中部叶卵圆形或卵状椭圆形，先端锐尖或圆钝，基部圆楔形或楔形，边缘有圆锯齿，两面疏被柔毛。头状花序小，总苞半球形，总苞片2层，近等长，狭长椭圆形；管状花5齿裂；花柱分枝伸出。瘦果倒椭圆形，有腺点或细瘤。花、果期9~10月。

生于水边、路旁沼泽地及林下阴湿处。分布于全国大部分地区。

【性味功效】辛、微苦，凉。清热解毒，祛风除湿。

【常用配方】**1.治感冒发热** 风气草、姨妈菜、生姜各9g，水煎服。**2.治湿热黄疸、胁痛** 风气草鲜品90~120g，或干品30~60g，水煎服。**3.治风湿筋骨疼痛** 风气草120g，泡酒500ml，早晚饮服30ml。

【主要化学成分】全草含多种贝壳杉烷型二萜类等。

【现代研究】现代临床用于治疗感冒发热，肺热咳嗽，咽喉肿痛，风湿病发热、筋骨疼痛和痈肿疮疖等。



胜红蓟

【来源及药用部位】菊科植物藿香蓟 *Ageratum conyzoides* L.的全草。

【本草论述】《泉州本草》：“清热解毒，利咽喉，为喉科专药。治一切咽喉症状，痈疽肿毒。”

【形态特征】一年生草本，高50~100cm。茎直立，多分枝，淡红色或稍带紫色，具白色尘状短柔毛。叶对生，上部互生；叶片卵形，先端急尖，基部钝或宽楔形，边缘有钝齿；叶柄生白色短柔毛和黄色腺点。头状花序小，聚集为稠密、顶生的伞房花序；花冠淡紫色，全部管状，先端5裂。瘦果黑褐色，具芒状鳞片形冠毛。花、果期全年。

生于山坡、荒地。分布于福建、广东、广西、云南和贵州等地。

【性味功效】辛、微苦，凉。清热解毒，利咽消肿，止血，止痛。

【常用配方】**1. 治咽喉肿痛** 胜红蓟鲜叶30~60g，洗净绞汁，加适量冰糖调服。**2. 治痈疽肿毒** 胜红蓟全草洗净，和饭粒、盐适量，共捣烂外敷患处。**3. 治筋伤骨扭疼痛** 胜红蓟干品适量，置炉火中烧烟熏之。**4. 治外伤出血** 胜红蓟适量，捣烂外敷患处。

【主要化学成分】含黄酮苷，氨基酸，有机酸，甾醇，氯化钾和挥发油等。

【现代研究】药理研究显示有抗菌活性。现代临床用于治疗疟疾，感冒，风湿病关节疼痛，跌打损伤，皮肤痈疖和急性咽喉炎肿痛等。



金边兔耳

【来源及药用部位】菊科植物杏香兔耳风*Ainsliaea fragrans* Champ.的全草。

【本草论述】《本草纲目拾遗》：“治虚劳吐血。”

【形态特征】多年生草本，根茎较短，茎直立，高30~50cm，具棕色长毛，不分枝。叶片5~6枚，着生茎下部，近乎轮生；卵状长椭圆形，基部心形，上面绿色无毛，下面具棕色长柔毛，有时下面呈紫红色。头状花序，花白色。瘦果。花期9~10月。

生于山坡背阴处。分布于长江流域以南地区。

【性味功效】甘，寒。润肺止咳，除湿利水。

【常用配方】**1.治咳嗽吐血** 金边兔耳15g，水煎服。**2.治水肿** 金边兔耳、水白菜各10g，水煎服。**3.治跌打劳伤** 金边兔耳、地胡椒各15g，水煎服。**4.治九子疮** 金边兔耳适量，捣烂外敷。

【主要化学成分】

全草含无羁萜，表无羁萜醇，精烯醇，正三十二酸，正二十六醇和 β -谷甾醇等；地上部分含倍半萜内酯等。

【现代研究】药理

研究显示有明显抑制金黄色葡萄球菌的作用。现代临床用于治疗感冒头痛，咳嗽咯血，黄疸型肝炎，淋巴结核，外伤出血和小儿消化不良等。

