

黔版中草药彩色图谱系列

XINBIAN ZHONGCAOYAO TUPU JI JINGDIAN PEIFANG 1

新编 中草药 1 图谱及经典配方

主 编：杨卫平 夏同珩 副主编：李朝斗 陈谦海



新编中草药图谱及经典配方

1

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海

编辑委员（按姓氏笔画顺序排列）

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨佐东	周 静	周惟桢
		珩	梅 颖
		瑛	

贵州出版集团
贵州科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中草药图谱及经典配方. 1 / 杨卫平, 夏同珩主编. — 贵阳: 贵州科技出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5532-0191-7

I. ①新… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图谱
②中草药—验方 IV. ①R282.7-64②R289.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第056818号

出版发行	贵州出版集团 贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路289号 (邮政编码: 550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	福建彩色印刷有限公司
版 次	2014年5月第1版
印 次	2014年5月第1次
字 数	302千字
印 张	10.5
开 本	880 mm × 1 230 mm 1/32
印 数	3 000册
书 号	ISBN 978-7-5532-0191-7
定 价	44.00元

前 言

当前，环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题，世界各国民众普遍关注，各国政府也高度重视，积极投入人力、物力，努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业，也是环境问题的一个重要方面，一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品，需要耗费大量的人力、物力、财力，也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展，使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中，遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激，再加上工作紧张，难免身心疲惫，渴求返璞归真，回到农耕田园生活之中；与此同时，也对防病治病提出了新的要求，希望能更多地使用天然药物，以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求，并不过分，同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年，在从事诊病治病的医疗实践中，历代医药人员努力工作，积累了丰富的诊病用药经验，使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验，可供世界各国借鉴和参考，这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势，本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片，并从中挑选出近1800种常用中草药的照片，为其撰写相关文字，编著成了《新编中草药图谱及经典配方》一书，分六册出版。

全书编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论

述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编杨卫平和编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘冬、梅颖、冷丽、何前松、吴筱枫系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

目 录

安息香····· (1)	芦笋(石刁柏、小百合) ····· (30)
白客妈叶····· (2)	文竹 ····· (31)
野茉莉····· (3)	蜘蛛抱蛋 ····· (32)
八角枫(八角风、白金条) ····· (4)	大百合 ····· (33)
小花八角枫(狭叶八角枫) ····· (5)	吊兰 ····· (34)
芭蕉····· (6)	玉竹 ····· (35)
地涌金莲····· (7)	万寿竹 ····· (37)
紫金标(小蓝雪) ····· (8)	宝铎草 ····· (38)
紫金莲(转子莲) ····· (9)	川贝母(川贝) ····· (39)
白花丹 ····· (10)	浙贝母 ····· (40)
马槟榔 ····· (11)	平贝母 ····· (41)
雷丸 ····· (12)	金针菜(黄花菜) ····· (42)
侧耳(平菇) ····· (13)	萱草根 ····· (43)
百部 ····· (14)	玉簪花 ····· (44)
粉条儿菜(小肺筋草) ····· (15)	紫萼(紫玉簪) ····· (45)
细香葱(冻葱、香葱) ····· (16)	岩百合 ····· (46)
洋葱(玉葱) ····· (17)	卷丹 ····· (47)
大葱 ····· (18)	细叶百合(山丹、岩百合) ····· (48)
小蒜(薤白) ····· (19)	山麦冬(土麦冬) ····· (49)
藠头 ····· (20)	麦冬 ····· (50)
野葱(苦蒜、小蒜) ····· (21)	沿阶草(麦门冬、麦冬) ····· (51)
大蒜 ····· (22)	蚤休(独脚莲、重楼) ····· (52)
韭菜 ····· (23)	云南重楼(蚤休) ····· (54)
山韭菜 ····· (24)	七叶一枝花(蚤休) ····· (55)
芦荟 ····· (25)	黄精 ····· (56)
知母 ····· (27)	吉祥草(观音草) ····· (58)
天冬(天门冬) ····· (28)	万年青 ····· (59)
羊齿天冬 ····· (29)	鹿药 ····· (60)

金刚藤	(61)	车前草	(94)
土茯苓	(62)	车前子	(95)
牛尾菜	(63)	平车前 (车前草、车前子)	(96)
黑点草	(64)	香菇 (香蕈)	(97)
藜芦	(65)	猴头菇 (猴头)	(98)
延龄草 (头顶一颗珠)	(66)	昆布 (海带)	(100)
郁金香	(67)	西河柳 (怪柳、三春柳)	(101)
桧柏 (圆柏)	(68)	川续断 (续断)	(102)
侧柏叶	(69)	藿香 (土藿香)	(104)
柏子仁	(70)	筋骨草	(105)
甘松	(71)	白毛夏枯草 (筋骨草)	(106)
墓头回	(72)	风轮菜 (断血流)	(107)
败酱	(73)	剪刀草 (细风轮菜)	(108)
白花败酱 (败酱草)	(74)	断血流 (山藿香)	(109)
蜘蛛香	(75)	沙虫药 (鸡肝散、四方蒿)	(110)
缬草	(76)	野草香 (木姜花)	(111)
点地梅 (喉咙草、清明草)	(77)	咳嗽草 (土香薷 野香薷)	(112)
虎尾草 (狼尾巴草)	(78)	连钱草 (活血丹)	(113)
香排草	(79)	佛座草 (宝盖草)	(114)
金钱草 (过路黄、大金钱草)	(80)	益母草 (坤草)	(115)
珍珠菜	(81)	茺蔚子	(116)
过路黄 (风寒草、金爪儿)	(82)	簪菜 (白花茺蔚)	(117)
痲子草	(83)	泽兰 (地笋叶)	(118)
小寸金黄 (小茄)	(84)	地笋	(119)
灵香草	(85)	华西龙头草	(120)
大田基黄 (红根草、星宿草)	(86)	薄荷	(121)
金爪儿 (小救驾、枪伤药)	(87)	鱼香菜 (圆叶薄荷)	(122)
花被单	(88)	留兰香	(123)
四块瓦 (落地梅、重楼排草)	(89)	姜味草	(124)
追风伞 (一把伞、狭叶落地梅)	(90)	香薷	(125)
报春花	(91)	石芥苧 (野香薷)	(126)
狗脊 (金毛狗脊、金毛狗)	(92)	罗勒	(127)
定心藤	(93)	牛至 (土香薷、满坡香)	(128)

十二槐花(金槐)·····	(129)	大飞扬草·····	(163)
白苏子(荏子)·····	(130)	地锦·····	(164)
紫苏(紫苏叶、苏叶)·····	(131)	甘遂·····	(165)
紫苏梗(苏梗)·····	(132)	千金子(看园佬)·····	(166)
紫苏子(苏子)·····	(133)	银边翠(高山积雪)·····	(167)
广藿香(藿香)·····	(134)	万年刺(铁海棠)·····	(168)
夏枯草·····	(135)	大戟·····	(169)
冬凌草·····	(136)	猩猩木(一品红)·····	(170)
溪黄草·····	(137)	霸王鞭·····	(171)
反背红(血盆草)·····	(138)	绿玉树·····	(172)
石打穿(紫参、小丹参)·····	(139)	草沉香(刮筋板)·····	(173)
丹参·····	(140)	漆大姑·····	(174)
滇丹参(紫丹参)·····	(142)	算盘子·····	(175)
蜜蜂花(鼻血草、滇荆芥)·····	(143)	算盘子根·····	(176)
荆芥·····	(144)	麻疯树(臭油桐、青桐木)·····	(177)
黄芩·····	(145)	大毛桐·····	(178)
半枝莲(溪边黄芩、牙刷草)·····	(146)	粗糠柴(红果果毛)·····	(179)
韩信草(牙刷草)·····	(147)	石岩枫(杠香藤)·····	(180)
水苏·····	(148)	木薯·····	(181)
野油麻·····	(149)	余甘子·····	(182)
草石蚕(甘露子)·····	(150)	叶下珠·····	(183)
大风子·····	(151)	蓖麻·····	(184)
柞木·····	(152)	乌柏(木蜡树、桅子树)·····	(185)
铁苋菜(海蚌含珠)·····	(153)	龙利叶·····	(186)
山麻杆·····	(154)	一叶萩·····	(187)
重阳木·····	(155)	油桐·····	(188)
黑面神(黑面叶)·····	(156)	油桐根·····	(189)
土沉香·····	(157)	野灯芯草·····	(190)
巴豆·····	(158)	灯芯草·····	(191)
火秧筋·····	(159)	枸骨叶(枸骨冬青、功劳叶)·····	(192)
水黄花(括金板)·····	(160)	枸骨根·····	(193)
乳浆大戟(猫眼草)·····	(161)	山枇杷(野枇杷)·····	(194)
泽漆·····	(162)	苦丁茶·····	(195)

老鼠刺·····	(196)	紫荆皮 (紫荆花) ·····	(229)
毛冬青·····	(197)	响铃草·····	(230)
冬青 (四季青、紫花冬青) ·····	(198)	化金丹·····	(231)
铁冬青 (山冬青、救必应) ·····	(199)	黄檀·····	(232)
三花冬青 (小冬青) ·····	(200)	降香 (降真香) ·····	(233)
鸡骨草·····	(201)	凤凰木·····	(234)
儿茶·····	(202)	小槐花 (清酒缸、路边青) ·····	(235)
蛇藤·····	(203)	独摇草·····	(236)
合萌·····	(204)	碎米柴·····	(237)
合欢皮·····	(205)	饿蚂蝗·····	(238)
合欢花·····	(206)	粘人花·····	(239)
山合欢 (夜合欢) ·····	(207)	千斤拔·····	(240)
土圞儿 (土欒儿) ·····	(208)	三点金草·····	(241)
花生 (落花生) ·····	(209)	白扁豆 (扁豆) ·····	(242)
沙苑子·····	(210)	槁藤子·····	(243)
黄芪·····	(211)	象牙红·····	(244)
紫云英 (红花菜) ·····	(212)	海桐皮 (刺桐) ·····	(245)
夜合叶·····	(213)	猪牙皂 (小皂、眉皂) ·····	(246)
龙须藤 (九龙藤) ·····	(214)	皂角·····	(247)
双肾藤 (夜关门) ·····	(215)	天丁 (皂角刺) ·····	(248)
大夜关门根·····	(216)	黑大豆·····	(249)
苏木·····	(217)	稽豆衣·····	(250)
云实 (阎王刺) ·····	(218)	黄豆芽 (大豆黄卷) ·····	(251)
木豆·····	(219)	甘草·····	(252)
锈钉子·····	(220)	野绿豆 (铁扫竹) ·····	(253)
壮筋草·····	(221)	血人参 (雪人参) ·····	(254)
爬山豆根 (大发表) ·····	(222)	鸡眼草·····	(255)
刀豆·····	(223)	胡枝子·····	(256)
阳雀花 (黄雀花) ·····	(224)	小夜关门·····	(257)
番泻叶·····	(225)	马扫帚·····	(258)
水皂角 (山扁豆) ·····	(226)	百脉根 (金花草) ·····	(259)
决明子·····	(227)	苜蓿·····	(260)
望江南·····	(228)	辟汗草·····	(261)

昆明鸡血藤(岩豆藤)·····	(263)
亮叶崖豆藤·····	(264)
苦檀·····	(265)
含羞草·····	(266)
大果油麻藤·····	(267)
油麻血藤(油麻藤)·····	(268)
红豆·····	(269)
凉薯(地瓜、地萝卜)·····	(270)
金雀花(蓝雀花)·····	(271)
绿豆·····	(272)
赤豆·····	(273)
豌豆·····	(274)
补骨脂·····	(275)
倒钩藤(老虎刺)·····	(276)
雪茶·····	(277)
苦葛(苦葛根)·····	(278)
甘葛(葛根)·····	(279)
鹿藿·····	(280)
洋槐花·····	(281)
山豆根(小黄连、苦豆根)·····	(282)
苦参·····	(283)
槐花(中国槐)·····	(284)
槐角(槐实)·····	(285)
白刺花(白花刺)·····	(286)
鸡血藤·····	(287)
石莲藤(苦石莲子、南蛇勒)·····	(288)

红三叶草(红车轴草)·····	(289)
三消草(花生草、螃蟹花、和蓝翘摇)·····	(290)
蚕豆·····	(291)
野豌豆(大巢菜)·····	(292)
歪头草(三玲子)·····	(293)
豇豆·····	(294)
紫藤·····	(295)
人字草·····	(296)
透骨香(滇白珠)·····	(297)
小米柴·····	(298)
小果珍珠花(緞木)·····	(299)
马醉木·····	(300)
小叶杜鹃(头花杜鹃)·····	(301)
满山红·····	(302)
马缨花(马缨杜鹃)·····	(303)
紫杜鹃(紫花杜鹃)·····	(296)
酒瓶花·····	(305)
闹羊花(黄花杜鹃)·····	(306)
白花杜鹃(白花映山红)·····	(307)
映山红(杜鹃花)·····	(308)
杜鹃根·····	(309)
南烛子(乌饭果)·····	(310)
越橘·····	(311)
中文名笔画索引·····	(312)
拉丁学名索引·····	(318)

安息香

【来源及药用部位】安息香科植物安息香 *Styrax benzoin* Dryand或云南安息香 *Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hartw.的树脂。

【本草论述】《新修本草》：“治心腹恶气。”

【形态特征】**云南安息香**：乔木，高5~20m。树皮灰褐色，有不规则纵裂纹；枝稍偏，被褐色长茸毛。叶互生，叶片椭圆形、椭圆状卵形，先端短渐尖，基部楔形或圆形，上面无毛或嫩叶脉上被星状毛，全缘，侧脉5~6对。顶生圆锥花序；苞片小；花萼杯状，5齿裂；花白色，5深裂，花萼及花冠被白色星状毛；雄蕊10，花丝扁平；子房上位，密被白色茸毛。果实近球形，外被星状柔毛。种子坚果状，栗褐色，被小瘤状突起和星状毛。

生于山坡、山谷疏林或林缘。分布于华南和西南等地。

【性味功效】辛、苦，平。开窍，祛痰，行气活血。

【常用配方】**1.治热闭神昏、或中风痰厥** 安息香、麝香、冰片、石菖蒲等适量，制成安息香丸内服。**2.治气滞血瘀，心腹疼痛** 安息香单用研末，2~3g，开水吞服；

或用木香、丁香各3~6g，水煎送服。**3.治痹证腰痛** 猪瘦肉120g，切片，裹安息香60g，置盛有灰的瓶中，隔火烧，将瓶口对准痛处熏。

【主要化学成分】含树脂约90%，其中有总苯甲酸和总桂酸等。

【现代研究】药理研究显示能刺激呼吸道黏膜分泌，具有祛痰作用。现代临床用于治疗慢性上呼吸道炎症，急性传染病或发热性疾病的高热引起的神昏、谵语、惊厥，脑血管意外和肝昏迷等。



白客妈叶

【来源及药用部位】安息香科植物垂珠花 *Styrax dasyanthus* Perk.的叶。

【本草论述】《贵州民间药物》：“润肺止咳。”

【形态特征】乔木，高3~20m。树皮暗灰色，嫩枝密被黄色星状毛，成长后脱落。叶互生；叶柄密被星状短毛；叶片倒卵形、倒卵状椭圆形，先端急尖或钝或渐尖，基部楔形或阔楔形，两面密被星状柔毛，边缘有细锯齿，侧脉5~7对。顶生或腋生圆锥花序；苞片小，钻形；花萼杯状，5齿裂；花白色，5裂，裂片外被白色星状柔毛；雄蕊10，花丝扁平；子房密被白色星状毛。果实卵形或球形，外被灰黄色星状柔毛。种子近

长圆形，褐色。花期5~6月，果熟期7~9月。

生于丘陵、山坡及溪边杂木林缘。分布于华东、华南和西南等地。

【性味功效】苦、甘，微寒。润肺，生津，止咳。

【常用配方】1. 治肺燥咳嗽 白客妈叶12~15g，研末，用开水吞；或水煎服。2. 治咽痛 白客妈叶10g，苦葛根15g，水煎液慢咽。

【现代研究】现代临床用于治疗慢性咽炎咳嗽和慢性支气管炎等。



野茉莉

【来源及药用部位】安息香科植物野茉莉 *Syrax japonicus* Sieb.et Zucc.的叶或果实。

【本草论述】《贵州草药》：“祛风除湿。”

【形态特征】灌木或小乔木，高4~8m。树皮灰褐色或黑褐色。叶互生；叶片椭圆形或长圆状椭圆形，先端急尖或渐尖，基部楔形或宽楔形，全缘或上半部具疏齿；侧脉5~7对。花单生叶腋或2~5朵成总状花序；花梗纤细，无毛；小苞片线形或线状披针形；花萼杯状；花白色，花冠5裂；雄蕊10。果实近球形至卵形，外面密被白色星状茸毛。种子褐色，表面具深皱纹。花期4~7月，果熟期7~11月。

生于海拔400~1800m的林下。分布于山



东、福建、云南、贵州、四川、广东、广西、台湾等地。

【性味功效】甘、淡，微寒。清热利湿，解毒活血。

【常用配方】1.治关节肿痛 野茉莉24g，木瓜15g，水煎服。2.治乳痈 野茉莉叶研末，酒调外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿关节炎和乳腺炎肿痛等。

八角枫（八角风、白金条）



【来源及药用部位】八角枫科植物八角枫 *Alangium chinense* (Lour.) Harms.的根或叶。

【本草论述】《本草从新》：“治麻痹风毒，打仆瘀血停积。”

【形态特征】落叶小乔木或灌木，高3~5m。小枝略呈“之”字形，幼枝紫绿色。叶互生，叶柄长2.5~3.5cm；叶纸质，近圆形或椭圆形，先端渐尖或锐尖，基部阔楔形

或截形，两侧不对称，有角或3~7分裂，叶上面无毛，下面脉腋内有丝毛。聚伞花序腋生，花7~30，小苞片线形；花萼先端分裂；花瓣6~8，初白色，后变为黄色；雄蕊6~8；子房2室。核果卵圆形，熟时黑色。花期5~7月，果熟期7~10月。

生于山野或林边。分布于长江流域以南各地。

【性味功效】辛、苦，微温；有毒。祛风除湿，活血止痛。

【常用配方】1.治风湿性关节炎 八角枫10g，透骨香30g，泡酒内服又外搽。2.治跌打损伤、四肢麻木 八角枫10g，酒水各半煎服。3.治咳嗽 八角枫10g，山蚂蝗根30g，水煎服。4.治疔疖肿痛 八角枫叶适量，捣烂外敷。

【主要化学成分】须根及根皮含生物碱，酚类，氨基酸，有机酸和树脂等。须根还含糖苷，强心苷等。

【现代研究】药理研究显示有肌肉松弛作用，能抑制心脏使血压下降，调节呼吸。现代临床用于治疗风湿性关节炎麻木，跌打损伤，劳累后腰痛，喘咳和肺结核咳嗽等。



小花八角枫（狭叶八角枫）

【来源及药用部位】八角枫科植物小花八角枫 *Alangium faberi* Oliv. 的根或叶。

【本草论述】《湖南药物志》：“祛风除湿，通经活络，行气止痛。”

【形态特征】落叶灌木。高1~4m。树皮平滑，灰褐色或深褐色；小枝纤细，近圆柱形。叶互生，叶柄长1~1.5cm；叶片纸质，不裂或掌状3裂，不分裂者长圆形或披针形，先端渐尖或尾状渐尖，基部倾斜，上面绿色，下面淡绿色，幼时被粗伏毛，后几无毛；主脉和侧脉在下面明显。聚伞花序腋生，花5~10朵，苞片三角形；花萼近钟形；花瓣5~6，线形；雄蕊5~6；子房1室。核果近卵圆形，熟时淡紫色。花期6月，果熟期9月。

生于1600m以下的疏林边。分布于湖北、湖南、广东、海南、广西、四川和贵州等地。

【性味功效】辛、苦，微温。祛风除湿，活血止痛。

【常用配方】**1.治风湿性腰、腿、臂等关节痛** 小花八角枫根30g，丹参15g，水煎服。**2.治胃痛** 小花八角枫12~15g，水煎服。**3.治跌打损伤** 小花八角枫叶适量，捣烂外敷患处。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿病关节麻木，跌打损伤和胃痛等。



芭蕉

【来源及药用部位】芭蕉科植物芭蕉 *Musa basjoo* Sieb. et Zucc. 的根或花。

【本草论述】《本草从新》：“泻热解毒。治一切肿毒，发背欲死，赤游风疹，风热头痛……”

【形态特征】多年生草本。茎短，通常为叶鞘包围而形成高大的假茎，高约4m。叶长2~3m，基部圆形或不对称，先端钝，表面鲜绿色，有光泽，中脉明显粗大，侧脉平行；叶柄粗壮，长达30cm。穗状花序顶生，下垂，苞片佛焰苞状，红褐色或紫色。花单性，通常雄花生于花束上部，雌花在下部；花冠近唇形，先端5齿裂；雄蕊5，离生，生出花冠；雌花子房下位3室，花柱1。浆果三棱状长圆形。种子多数。

多栽培于庭院及农舍附近。分布于山东至长江流域以南地区。

【性味功效】甘、淡，寒。解毒，利水，化瘀。

【常用配方】**1.治心悸** 芭蕉花、小贯众各15g，水煎服。**2.治消渴病** 芭蕉根、胖血藤、红禾麻根各20g，水煎服。**3.治水肿** 芭蕉根、毛蜡烛根、川木通各10g，水煎服。**4.治瘰癧** 芭蕉根捣烂外敷。

【主要化学成分】含水分，灰分，盐酸可溶物，粗蛋白质和粗纤维素等。

【现代研究】现代临床用于治疗头晕目眩，丹毒，疔疮，乳糜尿和带下等。



地涌金莲

【来源及药用部位】芭蕉科植物地涌金莲 *Musella lasiocarpa* (Franch.) C. Y. Wu ex H. W. Li 的根。

【本草论述】《滇南本草》：“治妇人白带，红崩日久，大肠下血。”

【形态特征】多年生草本。丛生，具假茎和匍匐茎，高约60cm，基部有宿存的叶鞘；叶长椭圆形，长达50cm，宽20cm，有白粉，具短柄。花序直立，密集，苞片黄色，由多枚苞片形成莲状花序，是观赏的重点；每苞片内有花2列，每列4~5个花，在花序的下部为雌花，上部为雄花。

【性味功效】苦、涩，寒。清热解毒，止带止血。

【常用配方】1.治崩漏带下 地涌金莲15g，水煎服。2.治肠风下血 地涌金莲、鹿仙草各20g，水煎服。3.治疮痈肿毒 地涌金莲鲜品适量，捣烂外敷。

【现代研究】现代临床用于治疗丹毒，痈疮，便血，月经不调和带下等。

