

十堰市蔬菜品种志

十堰市人民政府蔬菜办公室

十堰市蔬菜品种志

十堰市人民政府蔬菜办公室

《十堰市蔬菜品种志》编辑人员

编辑顾问：吴先金

编辑组长：乔启伦 副组长：何日先 瞿光涇

主 编：瞿光涇

编 委：瞿光涇 段锡云 何日先 官守勇

夏温澍 徐远明 王克成 梁正合

涂世安 顾善建 李经阶 刘修纯

王世民

摄 影：瞿光涇

前 言

十堰市地处鄂西北山区,位于北纬 $32^{\circ}23'$ 至 $32^{\circ}47'$,东经 $110^{\circ}26'$ 至 $110^{\circ}57'$,总面积1193.42平方公里。全市人口三十八万,其中城市人口二十七万,是一座以汽车工业为主的新兴工业城市。

我市地貌复杂,南高北低,山峦起伏,沟壑纵横,最高海拔1730米,最低海拔160米。我市属亚热带季风气候,由于地理位置和大气环流的影响,具有“南北兼有”的气候特点,气候温和,光照充足,年平均气温 15.3°C ,日照时数1889.3小时,无霜期246天,降水量884.9毫米,适宜多种蔬菜生长。

建市二十年来,我市蔬菜生产发展很快,目前有市郊常年菜地13500亩,郧县柳陂特约基地3000亩,一季园1000亩,另有蔬菜良种繁育基地1500亩。我市蔬菜栽培品种较多,但有近三分之二是从外地引进的。为了挖掘品种资源,普及良种知识,推广、应用新品种、新技术,充分发挥良种在蔬菜生产中的作用,逐步形成高产、优质、多品种、周年生产,均衡上市的蔬菜生产格局,我们编写了这本《十堰市蔬菜品

种志》。

本书收集、介绍了我市目前种植的192个品种，并各附彩色实物照片一幅，文字介绍力求简明，准确。由于我市目前栽培的许多品种系从外地引进，资料收集不全，加之水平有限，虽经多次补充、修改，难免有不妥或错误之处，敬请指正。

本书在整个编写过程中，承蒙省农牧厅、省种子公司等具体指导和华中农业大学肖春英教授、郑世发副教授、武汉市蔬菜研究所肖斯全高级农艺师及省农牧厅、省种子公司、襄樊市、沙市市的有关专家望作文、邓姣娥、杨政、徐华义等多次审稿，在此一并表示感谢。

十堰市人民政府蔬菜办公室
一九八九年十二月

目 录

一、根菜类

萝卜:	1
青岛大青皮	2
露头青	4
国光萝卜	6
汉中萝卜	8
心里美	3
大青头	5
鲁卜一号	7
胭脂红	9
胡萝卜:	10
武昌红	11
三寸长	12
芜菁甘兰: 土荃兰	13

二、白菜类

结球白菜:	14
小白口	15
83—2	17
青杂三号	19
鲁白三号	21
山东七号	23
绿 宝	25
青杂五号	16
核桃纹	18
80—7	20
山东四号	22
青麻叶	24
普通白菜:	26
上海青	27
四月慢	29
五月慢	31
矮脚黄	33
勺白	28
四月齐	30
菊花心	32
塌菜:	34
乌塌菜	35
黑油菜	36
紫菜苔:	37
大股子	38
十月红	39

三、甘 菜 类

结球甘兰:	40
大平头	41
晚丰	43
夏光	45
花椰菜:	46
60天花菜	47
瑞士雪球	49
120天花菜	51
京丰一号	42
牛心包	44
80天花菜	48
100天花菜	50
240天花菜	52

四、芥 菜 类

雪里蕻:	53
花叶雪里蕻	54
花叶芥菜:	55
花叶春菜	55
大 叶 芥:	56
青腊菜	57
紫腊菜	58

五、绿 叶 菜 类

茎用莴苣:	59
北京紫叶	60
罗汉莴笋	62
挂丝红	64
圆叶二白皮	66
孝感莴笋	61
花叶莴笋	63
昆明莴笋	65
八斤棒	67
芹 菜:	68
青杆芹菜	69
意大利冬芹	71
白杆芹菜	70
菠 菜:	72
圆叶菠菜	73
尖叶菠菜	74
蕹 菜:	75
尖叶竹叶菜	75
圆叶竹叶菜	76
苋 菜:	77
尖叶红苋	77
圆叶红苋	78
红苋	79

	尖叶青苋	80	
茼蒿	蒿: 鸡脚茼蒿	81	
叶用莧菜	牛皮菜	82	红牛皮菜 83
芥菜	大叶芥菜	84	花叶芥菜 85
茼蒿	茼蒿	86	
茼蒿	香: 小茼蒿	87	
落葵	落葵	88	
罗勒	荆芥	89	

六、葱蒜类

韭菜		90	
	汉中韭菜	91	本地韭菜 92
	犀浦韭菜	93	
大蒜		94	
	红皮大蒜	95	白皮大蒜 96
	成都二水早	97	印度大蒜 98
洋葱	红皮洋葱	99	
	黄皮洋葱	100	
大葱		101	
	章丘梧桐葱	102	本地大葱 103
分葱		104	
	分葱	105	
胡葱		106	
	蒜头葱	107	

七、茄果类

番茄		108	
	强力米寿	109	加八 110
	武昌大红	111	早丰 112
	早魁	113	
辣椒		114	
	牛角椒	115	伏地尖椒 116

早丰一号	117	华椒一号	118
华椒二号	119	华椒十七号	120
线椒	121		
茄 子:	122		
成都墨茄	123	大圆茄	124
六叶茄	125	线茄	126
紫长茄	127		

八、瓜 类

黄 瓜:	128		
长春密刺	129	津研四号	130
津研五号	131	津研六号	132
津研七号	133	本地黄瓜	134
津杂一号	135	津杂二号	136
金丝黄瓜	137		
冬 瓜:	138		
粉皮冬瓜	139	青皮冬瓜	140
南 瓜:	141		
枕头南瓜	142	柿饼南瓜	143
黄狼南瓜	144	金瓜	145
白皮笋瓜	146	白皮西葫芦	147
茭瓜	148		
丝 瓜:	149		
棒锤丝瓜	150	线丝瓜	151
肉丝瓜	152		
苦 瓜:	153	本地苦瓜	154
瓠 瓜:	155		
长瓠子	156	短瓠子	157
白皮葫芦	158	花皮葫芦	159
菜 瓜:	160	黑皮酸菜瓜	161
黄皮酸菜瓜	160		
花皮菜瓜	162		

西	瓜:新澄杂一代	163
甜	瓜:黄金瓜	164

九、豆 类

菜	豆:	165
	西宁架豆	166
	肉豆一号	168
	冷豆	170
	九籽鞭架豆	167
	肉豆二号	169
	鸡窝豆	171
豇	豆:	172
	红咀燕	173
	燕带豇	175
	青豇豆	177
	紫豇豆	179
	之豇28—2	174
	襄豇133	176
	五月豇	178
毛	豆:	180
	牛毛黄豆	181
	鲁豆二号	183
	大盖儿豆	182
扁	豆:	184
	猪血眉豆	185
	红筋眉豆	187
	大青荚眉豆	189
	白玉簪眉豆	191
	獠牙眉豆	193
	大紫眉豆	186
	小紫眉豆	188
	小青荚眉豆	190
	小白眉豆	192
蚕	豆:白皮蚕豆	194
碗	豆:麻豌豆	196
	青皮蚕豆	195

十、薯 芋 类

马 铃 薯:	197
克新一号	198
红毛眼	199
芋:	200
紫杆芋	201
青杆芋	202
魔 芋:	203
花魔芋	204

菊芋:	菊芋	205
姜:		206
	红芽姜	207
豆薯:		208
	湖南凉薯	209
草石蚕:	草石蚕	210

十一、水生蔬菜类

莲藕:		211
	白莲藕	212
	红莲藕	213
	湖南泡子	214
茭白:	本地茭白	215
荸荠:	本地荸荠	216

十二、多年生蔬菜及杂菜类

竹筍:	山竹筍	217
金针菜:	金针菜	218
香椿:	香椿	219
囊荷:	延荷	220
百合:	野百合	221
紫苏:	紫苏	222
藿香:	藿香	223
蕨菜:	拳菜	224

十三、食用菌类

平菇:		225
	404平菇	226
	453风尾菇	227
黑木耳:		228
	耳片85	229
香菇:		231
	7925香菇	232

萝卜

学名: *Raphanus sativus* L. 十字花科

萝卜在本市郊区栽培很普遍, 种植面积2450余亩。萝卜富含碳水化合物、维生素及磷、铁、硫等矿物质, 食用萝卜可增进消化, 萝卜作鲜菜、加工腌制用, 又耐运输贮藏, 为我市主要蔬菜之一。本市萝卜品种共有8个, 按收获期可分三类:

(一)冬萝卜: 多属晚熟种, 产量高, 品质好, 供应期长, 秋季播种, 11月上旬开始收获, 能延续供应至翌年2—3月, 栽培面积大。品种有: 青岛大青皮、心里美、露头青、大青头、国光、鲁卜一号。

(二)春萝卜: 生长期短, 肉质根小, 多作春季栽培, 4—6月收获, 栽培面积小, 品种有汉中萝卜。

(三)夏秋萝卜: 夏季播种, 9—10月收获, 耐热, 肉质根大小中等, 品质较差。品种有胭脂红。



品种名称：青島大青皮

别名：青島萝卜

栽培历史：1974年由青島引进，栽培已14年。

分布地区：郊区均有栽培，种植面积900余亩。

特 征：叶簇半直立，株高45厘米，开展度54厘米，露肩前，叶簇塌地生长，中后期半直立生长。叶倒卵形，长46厘米，宽14厘米，叶色深绿茸毛较多，全裂，裂叶6—7对，叶柄白绿色，成株有18—20片叶。肉质根圆柱形，稍弯，尾部略尖，纵径17—22厘米，横径5—6厘米，3/4露出地面，上部皮灰绿色，下部皮白色，肉白绿色。单株肉质根重0.4—0.5公斤。

特 性：晚熟，生长期105天，较耐寒，耐热性及耐旱性差，抗黑腐病力强，抗病毒病力较弱，耐贮藏，不易糠心。质地紧脆，水分中等，生食带有甜味，品质好。适宜秋播。

栽培要点：8月中旬播种，11—12月收获，每亩施基肥2000公斤，1.6米开沟整畦，行距33厘米，株距25厘米。间苗、露肩、封行各追一次肥，每亩用人类尿40担。主要防治蚜虫、菜螟、病毒病、霜霉病。一般亩产2000—2500公斤。留种隔离半径1公里以上，于收获前选优良植株，切除外叶，留心叶，按行距60厘米，株距40厘米栽培，6月上旬收获种子，亩产种约40公斤。



品种名称：心里美

栽培历史：1972年由北京引进，栽培已16年。

分布地区：郊区均有栽培，种植面积150余亩。

特 征：叶簇半直立生长，株高38厘米，开展度42厘米。叶片深绿色，有裂叶及板叶两种类型，裂叶形有裂片6—8对，板叶型较直立，板叶长36厘米，宽15厘米，浅绿色，有茸毛。肉质根近圆球形，纵径10厘米，横径8厘米，约1/2露出地面，浅绿色，入土部白绿色，吸收根皮红白色，肉色血红色或淡紫红色。单株肉质根重0.2—0.3公斤。

特 性：中熟，生长期90天，耐寒性较强，抗病，耐贮藏，不易糠心，肉质爽脆，味甜，水分多，品质佳，以生食为主，适宜秋播栽培。

栽培要点：8月中旬播种，11月份收获。行距30厘米，株距25厘米。其余参照青岛大青皮。一般亩产1500公斤。



品种名称：露头青

栽培历史：本地区农家品种，栽培历史久。

分布地区：郊区均有栽培，种植面积200余亩。

特 征：叶簇半直立，株高45厘米，开展度55厘米。叶多而大，有叶25片，叶长42厘米，宽14厘米，浅绿色，有少量皱褶，茸毛多，全裂，裂片4—6对，叶柄较长，白绿色。肉质根圆柱形，稍弯，尾部较粗，纵径30—35厘米，横径6—7厘米，肉质根3/5露出地面，地上部淡绿色，地下部白色，表皮光滑，肉黄绿色，单株肉质根重0.5—0.7公斤，大者1.5公斤。

特 性：晚熟，生长期100天，生长势强，耐寒，耐肥，抗热性差，抗病性较强，易感染病毒病，耐贮藏。肉质根质脆，含水量中等，品质好，适宜秋播栽培。

栽培要点：8月中旬播种，11—12月收获，亩施基肥2500公斤，N、P、K配合使用，1.6米开沟整畦，行距35厘米，株距26厘米。追肥3次，每亩用人粪尿2000公斤，防治病虫害与留种参照青岛大青皮，一般亩产2000—2500公斤。



品种名称：大青头

栽培历史：1976年由河南引进，栽培已12年。

分布地区：市郊部分地区栽培，种植面积100余亩。

特 征：叶簇半直立，略开张，株高40厘米，开展度45厘米，缨头较小，有叶16—18片，叶倒卵形，全裂，叶深绿色，长38厘米，宽14厘米，叶柄与叶脉浅绿色。肉质根短圆柱形，尾部近圆形，纵径12—14厘米，横径8—10厘米，约3/4露出地面，上部皮绿色，入土部分白色，单株肉质根重0.4—0.5公斤。

特 性：晚熟，生长期100天。宜密植，抗寒力强，耐肥，耐贮藏，不易糠心，较抗黑腐病和霜霉病，肉质紧脆，水分中等，生食带有甜味，品质好，适宜秋季栽培。

栽培要点：8月中旬播种，行距33厘米，株距25厘米，其余参照青岛大青皮。一般亩产1500—2000公斤。



品种名称：国光萝卜

栽培历史：1973年由陕西西安引进，栽培已15年。

分布地区：市郊部分地区栽培，种植面积200余亩。

特 征：叶簇直立生长，株高52厘米，开展度60厘米，成株有叶22片。叶深绿色，长倒卵形，叶长48厘米，宽17厘米，叶全裂，有裂片9—10对，茸毛多，叶柄长8厘米，白绿色。肉质根长圆柱形，纵径37厘米，横径7厘米，约1/2露出地面，上部灰白绿色，下部白色，肉白色，单株肉质根重0.7—1公斤，大者2.5公斤。

特 性：晚熟，生长期105天，适应性强，产量高，较抗病毒病，易感黑腐病，不耐贮藏，易糠心。肉质粗而松，含水量大，略带苦味，品质较差，适宜秋季栽培。

栽培要点：8月10—18日播种，行距40厘米，株距28厘米，其余参照青岛大青皮。一般亩产2500公斤以上。