

諸君愛兒女乎
非讀此書不可

痴子調護法

惲鐵樵 著

版 權



民國十九年四月初版

(定價每本實洋一角)

著 者

惲 鐵 樵

發 行 處

上海雲南路會樂里
二百七十八號惲寓

代 銷 處

商務印書館



南京中医药大学图书馆版权所有

原书缺页

原书缺页

藥通大便。大便一瀉。已見的紅點就會隱沒不見。同時就會五指尖發冷。而本來的高熱也就變做陰陽怪氣。這病從此就一天一天的重了。這個就是內陷。此時尙勉強可救。病家若誤認熱陷爲熱退。不思變計。那就糟了。

第二衣被寒暖要當心。痧子要溫保。衣被常要帶暖。病孩不可吹風。這是大家都知道的。但也不是一句籠統話。須知溫保。只能適可而止。若過於蓋得暖。着得多。病孩大汗淋漓。已出的痧子亦能隱沒。而且受熱變病。較之受涼更是難救。大汗淋漓。汗腺啓閉失職。就會亡陽。此種是漏汗。最是危險的。然則如何而可。這問題的答案很簡單的。就是衣着被蓋的多寡。須以病孩渾身蒸蒸有汗爲標準。最好用三層薄覆。汗多則去一層。汗少則加一層。尤其不可不知的是季候。冬天可以用毛織物。春夏只能用綿織物。若在清明以後。用皮或是駝毛毯子。那就逼熱向裏。渾身無汗。嘆熱。只消幾點鐘工夫。就會使得小孩起驚。各種熱病的調護都是如此。不但是痧子。

第三病孩的面孔不可露在外邊。痧子有特例。紅點要見得多固然。但是要面部見得多是順的。若是面部甚少。胸背臀部。臂腿手脚各處。無論如何多。都是逆的。若是面部見得多。身上各部見得很少。或竟無有。亦是順的。逆的有險順的無險。痧子又有第二個特例。熱即出。涼即隱。例如正在出痧之時。一手露在被外。那手上定不出。面孔露在被外。面孔定不出。若全身受風着涼。全身都不出。此所以痧子貴溫保。不過溫保過當。至於漏汗。那更是危險。因為漏汗僅能致虛。並不能透達痧子。人家不懂調護之法。往往將病孩重重厚覆。却將面部露在外面。於是面部則因冷而不出。其餘各部分則因過熱而汗多。雖痧點甚多。亦無益於病。竟有因此致命者。故衣被當適可而止。而面部則須注意不可露在被外。大約此層在冬令最為緊要。春寒時尤甚。

第四不可吃葷。內經謂熱病不可吃肉。原是凡發熱都應守此禁。而痧子為尤甚。若犯此禁例。危險非常。而且難救。不但是吃葷。即豬油氣味亦不可聞嗅。又

茶食中有豬油者。如杏仁、酥米、花糖之類。皆在禁忌之列。其乳孩出痧。乳母亦須吃素。

第五藥禁。用藥本是醫生的職務。不是病家的事情。然而有病家不可不知者數條。茲爲簡單說明如下。

(甲)回春丹不可吃。前四年我著保赤新書。亦曾有此聲明。證以近年閱歷。此話益發證明不錯。凡是痧疹流行之時。小孩見傷風咳嗽。便須防是痧疹。立刻要屏除葷腥。予以疏解藥。若見發熱。須解肌藥。若熱盛神昏。或指頭自動。或寐中驚悸。此時是有驚意。驚尙未成。可以涼解。於涼透藥中加消導藥最好。不必忙著吃各種驚藥。亦不必推拿。尤其不可的是回春丹。按回春丹的藥味。是犀黃、腰黃、麝香、冰片、辰砂、天竺黃、胆星、川貝、防風、羌活、天麻、僵蠶、全蠍、白附子、蛇含石。論這十五味藥。可說得有五個作用。其一是清血熱。開閉。前五味是也。其二化痰。天竺黃等三味是也。其三是疏散外風。防風等三味是也。其四是祛內

風。疆蠶全蠍是也。其五溫化行藥。白附子是也。其蛇含石一味。只是鎮驚。綜觀各藥。亦甚尋常。然服此丹者。往往下青色糞。痰從大便出。此蓋由於天竺黃蛇含石胆星犀黃並用之故。凡小兒皆不知吐痰。此丹能使痰從大便出。故病家信之。其實各種熱病。以熱爲主。能退得熱。痰自不爲患。不能退熱。徒化痰無益。而下青色糞最是不妥。須知青色是胆汁。是人體中消化要素之一。胆汁從大便出。便是消化失職。若是服藥之後而見青糞。便是不當攻下而誤攻之證據。這是極顯明的理論。而切合於事實的。拙著驚風詳說論之最詳惟其如此。所以痧子初起誤服回春丹。是無有不陷的。如何是陷。就是本來面色紅的。藥後發青。本來大便實的。藥後泄瀉。(乙)不可吃葶藶。痧子無有不欬嗽的。雖亦有例外。不過千份之一。當痧疹流行時。總是傷風欬嗽起頭。以後逐步加重。至於無時不欬。又欬不出。因而氣急鼻扇。須知這是肺閉。不是肺實。古人用葶藶。分量極輕。而且炒過製過。今人往往一錢八分。並不炒。古人用此的標準。是胸中有飲。喘滿不得。

原书缺页

血毒。但他的路徑是使病毒從大小便出去的。可以施之於他種疾病。不能施之於痧子（丁）不可服遠志。遠志照古方的效用看來。是心腎藥。痧子是肺風胃熱。可謂與遠志絲毫無關。且此物是溫性。與痧子當清涼透達的公例不合。（戊）不得妄用麻黃石膏。麻黃石膏是當用之藥。痧子當初起時。欬嗽不爽。壯熱無汗。非麻黃不解。若復煩躁引飲口渴。更非用石膏不可。若當此之時。僅用麻黃。不用石膏。可以雖用多量麻黃。竟不出汗。况痧子當壯熱無汗煩躁大渴之時。不用麻黃石膏。更有何藥可用。不過用此二味。須有兩個條件。其一。須壯熱無汗而喘煩躁大渴引飲。四種見症皆具。其二。藥量與病候宜相得。嘗謂凡用傷寒方而憤事者。小半是見證未能膈含之故。大半是藥量不中肯之故。吾用麻黃以三分至四分爲止。石膏一錢半至三錢爲止。如其藥力不能及穀。則繼進一劑。此從傷寒論及聖濟總錄方後悟得。傷寒方後常云。水若干。煎若干。分三服。得汗後止。後服。聖濟則一方研末。取四五錢匙煎服者。比比是也。吾留

分三服。尋千變上後。服星屑引一。甚至吾之被開除學徒某。甲亦以此爲口實。又陸九芝章太炎兩先生。均著有藥量考。考據真確。自是讀書人所當致力者。然醫家之最要條件。仍在實驗。能愈病卽是真確。近見有妄人用細辛至一錢半。乃至三錢者。病人渙汗失神。不過尙未遽絕。而彼妄人且引以自豪。謂膽識邁越古人。吁。用藥顧可意氣用事哉。近見日本人渡邊熙著和漢醫學實驗一書。謂「漢醫之秘。不告人者卽在藥量。傷寒金匱中所記。有一日之藥量。亦有一劑之藥量。總之不可盡信。」是則經驗之談也。近見痧子夾驚風而發者甚多。所以有此蓋因腦症流行之故。此病極難治。絕非麻黃石膏可以濟事。昧者不察。往往以重量膏麻予之。上文所謂病症不脗合。藥量不中肯。兩皆犯之。病何由治。吾於本年三月中一個月。治痧子與流行性腦炎及急性支氣管炎。三病併發之險症。凡二十餘人。吾大孫兒亦罹此重症。吾用清透藥與腦炎藥。加無價散救治。全愈無後患者十餘。

人凡曾服葶藶遠志回春丹。與大劑不合病症之麻黃石膏者。均不能挽救。吾今祖白言之。毫無隱秘。願吾同業稍加注意也。

第六救治急性肺炎法。肺炎之症狀。即是欬不爽。氣急鼻扇。醫多用葶藶遠志。祇能增病。若以無價散予之。則爲效甚良。此物只能用一次。且多不過一分。最好先予半分。不瘥。再予半分。用清透藥沖服。痧透欬爽。鼻孔可以不扇。是卽病機轉變之好現象。若不出痧。子氣急鼻扇欬嗽。亦能減退。通常用此治痧子。余屢次經驗。審其治肺之功效。先自服驗其藥性。然後施之於人。爲效良佳。惟限於肺爲風束。氣急鼻扇之支氣管炎症。其他尋常傷風欬嗽。非險症。無需乎此。其慢性欬嗽。肺燥肺萎等。當然不合用也。無價散。內地藥店恆不備。此物係用鴈月中健全小兒之糞。入煬成罐內。鹽泥封固。炭火煨赤。令成灰。加麝香冰片少許。同研而成。吐血用童便。痧不得出。用無價散。均極效。眞可謂道在矢溺矣。

第七芫花湯。最爲穩當有效之法。此法人多知之。然苦於不知其詳。用之不得法。卽無效。故雖知之。無多用處。茲爲詳細說明如下。芫花卽香菜。此物長老

第七芫荽燙熨

最爲隱當有效之法。此法古人經說。然苦於芫荽即其非明也。前得法即無效。故雖知之無多用處。茲爲詳細說明。然苦於芫荽一撮以爲藥。透發痧子。然而並非當藥吃。可以透發痧子。曾屢見醫者用芫荽一撮。以爲藥引。却絲毫於病無益。凡藥順的病症用他不着。逆的症病不能救險。都是無用之物。芫荽之效力不在內服。全在燙熨。燙熨之法。於病孩欬嗽發熱。身上已見紅點之時行之。用芫荽菜一斤。分兩次。先用半斤。沸水一大壺。大盆一個。入芫荽盆中。以沸水泡之。切不可煎。亦不可用火燉。泡則香。燉則臭也。泡時須將房間中門窗皆關閉。使香菜氣味充滿室中。最爲合法。既泡之後。卻乘熱用潔淨毛巾。醮透絞乾（巾須甚熱絞須極乾）用此熱巾向病孩面部輕輕熨之。頻頻熨之。巾須著肉。即起。不可揷緊在面上。又不可揩。揷則燙痛。揩則皮破也。須連續不已。使病孩面部之肉紅紅。則痧透故也。巾不須攤開。只須總把握在手中。以一部份著小孩之面巾之一部份冷。則翻轉用較熱之一面。一巾冷則更換一巾。盆水冷則更換一盆（即泡第二個半斤）燙熨之主要部份在病兒之鼻

旁口脣之上。頰肉之微近中部處。此處在醫書上謂之人王之部。凡病孩痧子內陷。或欲出未得。人王之部必白而不紅。且微隱青色。於此處熨之。其痧即出。乃陷者舉之之最穩捷有效之方法也。凡燙熨。當專注力於人王之部。他處可以不問。手脚固不必燙。胸背兩部尤不可。因解衣則著涼。反添病也。燙熨之間。以藥後五分或十分鐘時開始行之。最爲適當。既熨之後。卽行溫保。勿使面部外露。如此。則病機必轉。若翌日熱尙未退。痧尙不多。欬尙不爽。可再如法燙熨之。

以上七條雖甚淺而易懂。然卻是痧子極緊要關鍵。皆從實地經驗得來。絲毫無疑義者。余固以此告病家。然醫家正未可因其淺易而忽之。今之小孩患痧子之險症。無一非由小事化爲大事者。豈盡病家之咎哉。

本醫室出版書籍廣告

保赤新書

一本

一元

脉學發微

一本

六角

溫病明理

一本

六角

生理新語

一本

六角

以上爲甲組連史紙六開本

傷寒論輯義按

十本

初版連史紙八元
再版有光紙五元

以上爲乙組此兩組均已出版照碼八折出售

人生意味

一本

已出版

藥盒己已醫案

十本

尙未付印

演講錄

一本

驚風詳說

一本

尙未付印

內經綱要

此即羣經見智錄已修改過

三本

現已出版

定價六角

湯本氏古方新解預約

此書爲鐵樵先生託徐柏生君移譯就中參考材料極爲豐富湯本所著皇漢醫學及東醫吉益東洞等著名著作精華均包括在內六開本新聞紙印計十二冊每冊定價兩角全書兩元四角預約實收壹元四角四分預約期從公布之日起截至陽歷四月十五號爲止准陽歷四月底出書外埠加郵費六分國外加郵費一角預約款須一次頓付郵票代錢九五計算

另憚著傷寒研究兩本已出版兩元八折出售

本醫室監製藥品廣告

安腦丸說明

此丸所治各症列下

(一) 小孩發熱指頭自動寐中驚跳脣紅而乾口渴無淚服丸一粒薄荷一錢

煎湯化服

(二)手脚抽搐兩日上視角弓反張其發作陣一日二三次發作發時面青種種惡候並見不發時略如平常無病光景此是驚風已成不必慌亂俟其發過用薄荷葉一錢酒炒龍胆草二分煎湯二三羹匙用此丸一粒化服即安隔六點鐘再服一粒仍用薄荷一錢龍胆草一分煎湯化服即不再發驚風最利害者一天可發二三十次亦只照樣煎服無有不愈

丸不入煎

(三)有一種驚發作時手脚痙攣抽搐面色發青兩日上視不發作時面色不轉目光不正兩眸或微闔或一眼向前一眼旁視此是驚風已經入腦之症據而且兼虛病候較深切勿亂藥各種發汗攻積方法只能添病不能愈病只有此丸非常靈驗服法用歸身一錢細生地一錢清炙甘草四分酒炒龍胆草二分以上藥爲一服煎湯約三羹匙將此丸一粒化開灌入病兒口中再將餘葯徐徐灌入撫之安眠不可驚動三點鐘後再服一次照前配藥分量同第三次須隔六點鐘葯量亦照前共服藥三服丸三粒