

醫藥顧問

民衆實驗



上海中央書店
印書行



南京中医药大学图书馆版权所有

S 501
232

民衆醫藥顧問細目

第三冊

婦科門

【一】經病 經病總說

經水不調	一
經水不利	五
經來腹痛	六
經水先期	九
經水後期	〇
經水過多	〇
經水過期	一
血崩不止	二
室女閉經	四
經中攝生	六
【二】帶病 帶病總說	

【三】不孕 不孕總說

【四】胎病 胎病總說

赤色帶下	一七
赤帶通治	一八
白色帶下	一八
白帶通治	一九
經亂不孕	二〇
肥盛不孕	二一
妊娠惡阻	二二
胎動不安	二四
胎動通治	二五
胎上通心	二五
妊娠胎漏	二六
跌仆傷胎	二七
妊娠心痛	二八
妊娠腰痛	二八

胎水腫滿	二九
腹內子鳴	三〇
妊娠中惡	三一
妊娠中風	三一
妊娠吐血	三二
妊娠咳嗽	三三
妊娠瘧病	三四
妊娠霍亂	三五
大小便秘	三五
妊娠便淋	三七
小便不禁	三七
妊娠溺血	三八
妊娠半產	三九
孕婦鼻血	四一
孕婦口渴	四一
孕婦痢疾	四一

2851

胎痛欲產	四一
毒藥傷胎	四一
因驚胎動	四一
房事胎動	四一
婦人鬼胎	四一

【五】臨產 臨產總說

備生方法	四二
難產通治	四三
橫生逆產	四四
盤腸難產	四五
交骨不開	四五
死胎不下	四六
胎衣不下	四七

【六】產後 產後總說

產後血暈	四八
血暈通治	五〇
惡露不下	五〇
惡露不止	五一
產後心痛	五二

產後腹痛	五三
產後脅痛	五五
產後腰痛	五六
產後頭痛	五七
產後身痛	五七
產後中風	五八
產後拘攣	五九
產後不語	六〇
產後譫語	六〇
產後顛狂	六二
產後驚悸	六三
產後自汗	六四
產後發熱	六五
往來寒熱	六六
產後瘧症	六八
產後勞瘵	六八
產後虛羸	七〇
產後痞悶	七〇
產後腹脹	七一

產後水腫	七二
產後霍亂	七三
產後嘔吐	七四
產後咳嗽	七五
大便秘澀	七六
便秘通治	七六
大小便秘	七六
產後便數	七七
小便血出	七七
赤白痢下	七八
產後血崩	七九
產後鼻衄	八〇
產後喘促	八〇
產後精聚	八一
產後血滯	八二
產後血竭	八二
產後血悶	八二
產後血痛	八二
產後舌出	八三

產後嘔水.....八三

產後虛汗.....八三

【七】乳陰病 乳陰病總說

乳汁過多.....八三

乳汁自出.....八六

乳汁患多.....八六

產後吹乳.....八六

妬乳脹痛.....八七

婦人乳巖.....八八

乳癰通治.....八九

乳瘡通治.....八九

乳頭破裂.....八九

婦人回乳.....八九

產門不開.....八九

陰脫不收.....九〇

陰蝕痛癢.....九一

婦人陰冷.....九二

陰吹有聲.....九三

婦人陰挺.....九四

婦人陰痛.....九五

婦人陰癢.....九五

婦人陰腫.....九五

婦人陰瘡.....九五

婦人陰爛.....九六

陰傷出血.....九六

初生無陰.....九六

婦人陰寬.....九六

小戶嫁痛.....九七

兒科門

【一】初生病 初生病總說

初生不啼.....二

眼不能開.....三

初生不乳.....三

不得小便.....四

不得大便.....五

嘔吐不止.....五

瘳風不語.....六

瘳風通治.....七

撮口不啼.....七

瘳風腫脹.....八

瘳風通治.....九

瘳濕不乾.....九

瘳溼通治.....〇

胎驚急症.....〇

內釣搖逆.....一

胎熱驚煩.....一

胎熱通治.....二

胎寒口瘳.....三

胎寒通治.....三

濕熱胎黃.....四

胎赤如丹.....四

喝乳不食.....五

喝乳通治.....六

夜啼不止.....六

【二】痘症 痘症總說

痘瘡初起	一七
痘瘡瀰漿	二一
痘瘡收靨	二五
痘瘡落痂	三二
痘瘡發熱	三五
痘兼口渴	三八
痘兼煩燥	四〇
痘兼譫妄	四三
痘兼驚搐	四五
痘兼自汗	四七
痘兼失血	四九
痘兼咳嗽	五一
痘兼涕唾	五四
痘兼眼病	五四
痘兼喉症	五五
陷伏倒靨	五八
小兒水痘	六〇
小兒麻疹	六一

【三】驚風 驚風總說

急驚風症	六四
慢驚風症	六六
驚悸怔忡	六七
五種癇症	六九
天釣抽掣	七三
小兒中風	七四

【四】疳症 疳症總說


肝臟疳積	七九
心臟疳積	八〇
脾臟疳積	八一
肺臟疳積	八二
腎臟疳積	八三
無辜疳積	八四
蛔蟲疳積	八五
脊蝕疳積	八五
腦生疳瘡	八六
走馬疳症	八七
口齒疳瘡	八九
眼疳癢澀	九〇

疳痢濕瀉	九〇
疳瘡浸毒	九二
疳病發熱	九二
疳積泄瀉	九三
丁奚疳症	九四

【五】雜症 雜症總說

虛羸不足	九九
癖病羸瘦	一〇一
癖症通治	一〇二
食積不消	一〇二
赤白痢症	一〇四
咳嗽感冒	一〇五
咳嗽通治	一〇五
霍亂吐瀉	一〇六
陰腫腹痛	一〇七
肛癢不止	一〇七
小兒語遲	一〇八
悲哭夜啼	一〇九
涎滯頤下	一一〇

顛陷如坑	一一
小兒五軟	一二
小兒五癰	一三
卒然無聲	一三
小兒不寐	一四
鵝膝風症	一六
咽喉腫痛	一七
目赤腫痛	一八
小兒鼻病	一〇
小兒耳病	一一
小兒卵腫	一二
小兒血尿	一三
小兒遺尿	一三
小兒斷乳	一三
小兒髮禿	一三
小兒風寒	一三
小兒卒死	一三



民衆醫藥顧問

茹十眉醫士編著
門人鄺素玲恭校

婦科

〔經病〕

【說總】

上古天真論曰。女子二七天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故有子。言後天之陰氣。陰氣足而月事通。是即所謂月經也。良以女體屬陰。其氣應月。月以三旬而一盈。經以三旬而一至。月月如斯。經常不變。故謂之月經。又謂之月信。一有不調。則失其常度而諸病見矣。衝爲血海。月經之本。任主胞胎。二脈流通。經月漸盈。應時而下。然陽明胃氣。又爲衝脈之本。故月經之本。所重在衝脈。所重在胃氣。所重在心脾。以皆爲生化之源耳。他如七情六任。飲宜起居之失宜者。無非心脾胃氣之賊。何者當顧。何者當去。讀者於此。當知所從矣。

一 經水不調

病固婦人經候不調其因有三。一曰脾虛。二曰衝

任損傷。三曰脂痰凝塞。治病之工。不可不審。脾胃虛弱者。經曰二陽之病發心脾。女子不月。夫二陽者。陽明胃也。胃主受納五穀。長養

血氣灌漑臟腑。流行經隧。乃水穀之海。血氣之母也。惟憂愁思慮。則傷心。心氣受傷。脾氣失養。鬱結不通。腐化不行。胃雖能受。而所謂長養灌漑流行者。皆失其令矣。故脾胃虛弱。飲食減少。氣日漸耗。血日漸少。斯有血枯血閉。及血少色淡。過期始行之病。衝任損傷者。經曰。氣以噓之。血以濡之。故氣行則血行。氣止則血止也。女子之性。執拗偏急。忿怒妬忌。以傷肝氣。肝爲血海。衝任之系。衝任失守。血氣妄行也。又褚氏曰。女子向未行而強合。以動其血。則他日有難名之疾。故女未及二七天癸之期。而男子強與之合。或於月事適來未斷之時。而男子縱慾不已。衝任內傷。血海不固。由斯二者。爲崩爲漏。有一月再行。不及

期而行者矣。脂痰凝塞者。蓋婦女之身。內而腸胃開通。無所阻塞。外而經隧流利。無所凝滯。則血氣和暢。經水應期。惟彼肥碩者。膏脂通漏。元室之戶不開。挾痰者。痰涎壅滯。血海之波不流。故有過期而經始行。或數月而經一行。及爲濁爲帶。爲經閉。爲無子之病。

漏經水或先或後。或多或少。寸口脈微而濇。微則衛氣不足。濇則血氣無餘。衛不足。其息短。其形燥。血不足。其形逆。榮衛俱虛。言語謬誤。跌陽脈浮而濇。濇則胃氣虛。虛則短氣。咽燥而口苦。胃氣濇則失液。少陰脈微而遲。微則無精。遲則陰中寒。濇則血不來。此爲居經。三月方至。脂痰凝塞者。則多屬於肥胖飲食過度之人。

廣注

衝任虛損。月候不調。或來多不已。或過期不行者。宜服大溫經湯。衝任衰弱。月候愆期。行時頭眩。飲食或少。氣滿心怯。肌肉不澤者。宜服加味吳茱萸湯。衝任虛損。下焦久冷。月事不調。不成孕育者。宜服暖宮丸。衝任虛損。又為風寒所乘。尺脈微小甚者。宜服鹿茸丸。肝脾血虛有熱者。宜服加味逍遙散。脾胃傷損。惡寒發熱。煩躁作渴者。宜服八珍湯。鬱傷氣滯。胸隔痞悶。肚腹膨脹。飲食少思。吞酸噯腐者。宜服越鞠丸。肥人痰多。占住血海。月經因而不調者。宜服清海蒼莎丸。經事久不調。變成瘵疾。宜多服益氣養營湯。

【大溫經湯】

吳茱萸湯

泡

牡丹皮

白芍藥

肉桂 去粗皮

人參

當歸 去蘆

芎藭

阿

膠炒

甘草 一錢

麥冬 二錢

去心

半夏 二錢

半

夏

二錢

右作一服。用水二鍾。煎至一鍾。食前服。

【加味吳茱萸湯】

半夏 二錢

吳茱萸

當

歸 錢各一

麥門冬 去心

乾薑

白茯苓

苦梗

南木香

防風

牡丹皮

甘草 各一

錢

官桂

北細辛

錢各半

右作一服。水二鍾。生薑三片。紅棗一枚。煎至一鍾。食前服。

【暖宮丸】

生硫黃 一兩

赤石脂

火煨

海

螵蛸

附子 炮去皮臍

各半兩

禹餘糧

兩半火

煨醋滓

右為細末。醋糊為丸。如桐子大。每服三十九。

空心。用溫酒或醋湯送下。

【鹿茸丸】

鹿茸 炙

赤石脂

禹餘糧

各一

續斷 二兩

柏葉

附子 炮

熟地黃

當

歸酒 艾葉 各七錢半

右爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒下。

【加味道遙散】 柴胡 丹皮 山梔 炒五分

甘草 炙 當歸 炒 芍藥 酒炒 茯苓 白

朮 炒各一錢

右水煎服。

【八珍湯】 當歸 酒拌 芍藥 炙甘草 川

芎 各一錢 人參 白朮 茯苓 各三錢 熟地

三錢

右水煎服。

【越鞠丸】 香附 蒼朮 炒 川芎 梔子 炒

神麴 炒 山楂 各等分

右爲末。用神麴糊丸。菉豆大。每服三十丸至

六十丸。食遠。白湯送下。

【清海蒼莎丸】 南星 蒼朮 川芎 香附

右等分爲末。蜜丸。梧子大。每服二十九。白湯下。

【益氣養榮湯】 白朮 炒二錢 人參 茯苓

陳皮 貝丹 香附 當歸 酒拌 川芎

黃芪 鹽水拌炒 熟地 蒸 芍藥 炒各一錢 甘草 炙

桔梗 各五分

右薑水煎服。

【月經不調通治單方】 ①香附一味。末。醋吸服。

效。（崔氏方） ②月經不調。氣血乖和。不

能受孕。或生過一胎。停隔多年者。全當歸五

兩。切片。遠志肉五兩。甘草湯洗。用稀夏布袋

盛酒十斤。浸之。蓋好。浸七日。後晚溫服。隨量

飲之勿間斷（千金方）

二 水經不利

病因 女人經水不利。多由勞傷氣血。體虛而風冷容於胞中。傷於衝任之脈。或則寡婦悶鬱百端。慕夫不能頓忘。或因醉飽入房。

病狀 月經來而不利。若寸脈弦。關脈沉。是肝病也。兼之腹痛。孔竅生瘡。尺脈滑。血氣實。經絡不利。或尺脈絕不至。兼主小腹引腰痛。氣攻胸膈。此由衝任先傷也。悶鬱而致者。則肝脈弦長。

療法 經水不利。臍腹作痛者。宜服牛膝散。因勞動而致臟腑衝任氣虛。不能約制經血。以致崩中。或下鮮血。或下五色。連日不止。淋漓不斷。

形羸血虧。月水閉絕者。宜服滋血湯。女人從小至大。月經未嘗來。顏色痿黃。氣力衰少。飲食無味者。宜服黃芩牡丹湯。月經不通。百療不瘥者。可試服乾漆丸。

【牛膝散】

牛膝酒製一兩

桂心

赤芍藥

桃

仁

去皮尖

元胡索炒

當歸酒浸

牡丹皮

木香

各七錢半

右爲末。每服一錢。空心溫酒調下。

【滋血湯】

馬鞭草

牛膝

荊芥穗

各二錢

當歸

肉桂

牡丹皮

赤芍藥

川芎各一錢

錢

右用烏梅一個。水二盞。煎一盞。食前服。服至半月或一月。經脈自通。以上統治汚血有寒而經閉者。

【黃芩牡丹湯】 黃芩 丹皮 桃仁 瞿麥

芍藥 枳實 射干 海藻

大黃 錢各一 蝨蟲 七枚 水蛭 五枚 蟬蟪 十枚

右咀。以水二碗。煮一碗。溫服。

【乾漆丸】 乾漆 土瓜根 射干 芍藥 各一

半兩 麤蟲 蟬蟪 十枚 水蛭 蝨蟲 各七枚

桃仁 鼈甲 兩各二 丹皮 牛膝 黃芩

吳茱萸 大黃 桂心 柴胡 各一 火

麻仁 合四 亂髮 二枚 雞子大 菴蘭子 合二

右爲末。以蜜和丸。每日酒下十五丸。梧子大。

漸加至三十丸。

三 經來腹痛

【病因】皆由風冷容於胞絡衝任。或因寒血凝滯。

【病狀】但遇經期。則必作痛。或食則嘔吐。肢體困倦。

或兼寒熱。

【療法】因憂思氣鬱而血滯者。宜服桂枝桃仁湯。若

血結而成塊。服萬痛丸。經候過而作痛者。乃

虛中有熱。所以作痛。經水將來作疼者。服四

物湯。加桃仁黃連香附各一錢。臨行時腰疼

腹痛。乃是鬱滯有瘀血。宜服四物湯。加紅花

桃花莪朮延胡索香附木香各一錢左右。發

熱加黃芩柴胡。紫色成塊者。熱也。亦用四物

湯。加黃連柴胡之類。時行時止。淋瀝不斷。腹

中作痛。乃寒熱邪氣容於胞中。留滯血海外

疼也。如有積。下利不定。有所去則愈。臍下逆

氣。上攻胸膈欲嘔者。服桃仁散。如腰臍腹痛

者服牛膝散。或行或止。心痛者。服失笑散。經水臨行時痛者。爲氣滯。服烏沉湯。氣滯血瘀者。服延胡索湯。經水將來。陣痛陣止者。血實也。宜用四物湯。加延胡索。木香。黃連。香附。腿腹痛者。服內補當歸丸。經後痛者。爲血虛。服八物湯。經前作痛。經後又痛。通生交加地黃丸。

【桂枝桃仁湯】 桂枝 芍藥 生地黃 各二錢

桃仁 四枚 甘草 一錢

右水二盞。薑三片。棗一枚。同煎。去滓溫服。

【萬痛丸】 乾漆 碎炒 牛膝 酒浸一宿焙 乾盡 各一兩

右爲末。以生地黄汁一升入。二味藥末。銀器內。慢火熬可丸。卽丸如桐子大。每服二十九。空心。米飲或溫酒下。

【四物湯】 當歸 熟地 各三錢 川芎 五分

白芍 二錢 酒炒

右水煎服

【桃仁散】 桃仁 半夏 當歸 川牛膝

桂心 人參 蒲黃 丹皮 川芎 澤蘭

葉 各一錢 赤芍藥 生地黃 各一錢 粉草 五分

右作一服。水二鍾。薑三片。煎至一鍾。食前服。

【牛膝散】 牛膝 酒製 桂心 赤芍藥 桃

仁 去皮 延胡索 炒 當歸 酒浸 丹皮

木香 各七分

右爲末。空心溫酒調下。或加川芎亦可。

【失笑散】 蒲黃 五靈脂 各等分

右爲末。每二錢。先以酢調成膏。入水一盞。煎

空心熱服。

【加味烏沉湯】 烏藥 縮砂 木香 元胡

索錢各一 香附炒去毛二錢 甘草一錢

右水一盞半。生薑二片。煎至七分。不拘時溫服。

【延胡索湯】 當歸酒浸炒 延胡索炒去皮 蒲

黃炒 赤芍藥 官桂不見火各二錢半 薑黃洗

乳香 沒藥 木香不見火各錢半 甘草炙一錢

右水一盞半。生薑三片。煎至七分。去滓。食煎溫服。

【內補當歸丸】 當歸炒 阿膠炒 白芷

續斷 乾薑炮 芎藭 甘草炙各二兩 熟地

黃二錢半焙 芍藥 附子炮去皮臍 肉桂各一兩

吳茱萸湯泡 白朮各兩半 蒲黃四錢

右爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十

九。空心。用溫酒送下。

【八物湯】 川芎錢二 當歸 芍藥 熟地黃

錢各二 木香 檳榔 延胡索 苦楝碎炒各

錢一 右作一服。水二鍾。煎至一鍾。食前服。

【交加地黃丸】 生地黃搗汁 老生薑搗汁

各一斤 延胡索 當歸 川芎 芍藥各一兩

沒藥 木香各半兩 桃仁去皮尖研 人參各二錢半

香附四兩

右爲末。先以生薑汁浸地黃滓。以地黃汁浸

生薑滓。晒乾。皆以汁盡爲度。共十一味。作一

處。晒乾。研爲末。酢糊爲丸。空心。以薑湯下。

〔經來腹痛單方〕 ①香附炒四兩 橘紅二兩 茯

苓炙草各一兩。爲末。每二錢。沸湯下。婦人

良方）○歸尾川芎赤芍丹皮製香附元胡索各一錢。生地紅花各五分。桃仁二十五枚。水煎服。（醫方捷徑）

四 經水先期

病因經水先期而來。或因血熱。或因腎中水火太旺。亦有因肝經怒火者。

病狀血熱當以通身臟象論。勿以素多不調。而偶見先期者爲早。一切又應以脈爲憑。並參望其症狀。

療法不辨其因者可先服清經散或兩地湯。稟受素弱者恐其血氣虛損。宜服人參養血丸。心腹疼痛者宜服增損四物湯。

【清經散】

丹皮 錢三
地骨皮 錢五
白芍 三錢
酒炒

大熟地 二錢
九蒸 青蒿 錢二
白茯苓 錢一
黃柏 五分
水浸炒
右水煎服。

【兩地湯】 大生地 一兩
酒炒 元參 一兩
白芍藥 五錢
麥冬肉 錢五
地骨皮 阿膠 各三
酒炒
右水煎服。

【人參養血丸】 烏梅肉 三兩
熟地黃 五兩
當歸 二兩
人參 川芎 赤芍藥 蒲

黃 炒各一兩

右爲細末。煉蜜丸梧子大。每服八十九。溫酒米飲任下。

【增損四物湯】 川芎 當歸 芍藥 熟地

黃 牡丹皮 白朮 各一錢
錢半 地骨皮 一錢

右作一服。用水二鍾。煎至一鍾。食前服。

五 經水後期

病因血寒者。經必後期而至。然血何以寒。亦惟陽

氣不足。則寒從中生。而生化失期。是即所謂

寒也。至於陰寒由外而入。生冷由內而傷。

病狀經水來遲。色多不鮮。或色見沉黑。或澀滯而

少。其脈或微或細。或沉遲弦澀。惡寒喜煖。

療法宜服通經四物湯治之。

【通經四物湯】

當歸半錢

熟地黃 白芍

藥 香附子

蓬朮

蘇木各一錢 木通八分

川芎

肉桂 甘草

紅花二分

桃仁二十個

右剉作一貼。空心水煎服。

六 經水過多

病因多因勞損氣血而傷衝任。或因經行而合陰

陽。以致外邪客於胞內。滯於血海故也。

病狀婦人月水不斷。淋漓腹痛。

療法勞傷血氣。衝任虛損者。宜服膠艾湯。口渴心

煩。四肢羸乏。飲食減少者。宜服續斷丸。心腹

急痛者。宜服黃藥子散。

【膠艾湯】

阿膠炒 川芎

甘草炙各錢二 當

歸 艾葉

炒各錢三

熟地黃

白芍藥各錢四

右水煎服。或加黃耆亦可。

【續斷丸】

川續斷 當歸

烏賊骨 黃耆

牛角鰓燒

五味子

甘草 龍骨煨研

赤石脂

熟地黃各一兩

地榆半兩 艾葉

附子 乾薑

川芎各七錢半

右爲末。煉蜜丸。梧子大。每服三十九。空心溫