

正校  
明  
醫  
指  
掌

上海廣益書局  
發行

1847

訂補明醫指掌卷之六

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯校訂  
子繩山邵達參補

○頭痛症一眉校痛附

歌頭痛先須辨厥真。濕痰風火挾邪侵。氣虛血少兼寒濕。識者尤當審六經。更有眉眶顫作痛。風痰風熱客於絡。  
論如太陽頭痛者。惡風寒。脈浮緊。痛在巔頂兩額角。少陽頭痛者。往來寒熱。脈弦痛連耳根。陽明頭痛者。發熱自汗。脈浮長大。痛連目眦頰齒。太陰頭痛者。必有痰體重。或腹痛。脈沈頭重。少陰頭痛者。足寒氣逆。為寒厥。脈沈細。厥陰頭痛者。吐痰沫厥冷。脈浮緩。痛引目系。此六經頭痛多挾外邪也。血虛頭痛者。自魚尾上攻頭痛也。氣虛頭痛者。耳鳴九竅不利。腸胃之所生濕熱頭痛者。心煩重痛。病在膈中。過在手太陽少陰。寒濕頭痛者。氣上而不下。頭痛巔疾。下虛上逆。過在手少陰巨陽。甚則入腎。偏頭痛者。頭半寒痛。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。厥頭痛者。所犯大寒至骨髓。髓以腦為主。腦逆故頭痛齒亦痛。真頭痛者。痛甚入連于腦。手足寒至節。旦發夕死。夕發旦死也。丹溪云。頭痛多主于痰甚者。火多有可吐者。有可下者。又若眉眶痛者。屬風熱與痰。有肝虛而痛者。繞見光明。則眶痛甚。有眉稜骨痛者。眼不可開。晝寢夜劇。屬痰。凡此之類。種種不同。視其所挾。究其所因。定其經絡。參以脈理。而施以補瀉宣通汗利之法。斯無一偏之弊也。

六經痛

太陽。川芎羌活藁本麻黃。少陽。小柴胡湯。陽明。升麻葛根湯加石膏白芷蔥白。太陰。蒼朮半夏南星川芎蔓荊子。少陰。麻黃附子細辛湯。厥陰。吳茱萸湯加柴胡。

小柴胡湯方見痰厥條下

升麻葛根湯

治陽明經頭痛。

○升麻

葛根

白芍藥

甘草

煎服

麻黃附子細辛湯

治少陰頭痛。

○麻黃

細辛

附子

水二盞煎溫服

吳茱萸湯

治厥陰頭痛。或痰涎厥冷。脈浮而緩。

○麻黃

羌活

吳茱萸

藁本

升麻

黃芪

分三 黃芩錢一 當歸酒洗一錢 黃蘗炒一錢 川芎錢一 蔓荊子分三 細辛分三 柴胡分三 黃連分三 半夏分三  
紅花分三 蒼朮米泔炒一錢 〇劉一劑水二盞煎八分服

血虛痛

血虛痛。芎歸湯。或四物加酒。芩羌活柴胡蔓荊子。氣虛痛。四君子湯。氣血兩虛。調中益氣湯。加川芎蔓荊子細辛。巔

項痛

項痛。必用藥本柴胡防風。芎歸湯。治血虛頭痛。一名芎藭湯。〇川芎錢三 當歸酒洗三錢 〇水二盞煎八分。食遠熱服。

四物湯

四物湯。方見血症條下。四君子湯。方見脾胃條下。調中益氣湯。方見內傷條下。

風溼寒熱痛

風熱與溼上壅。清室膏。風熱甚者。徹清膏。瘦人頭痛是火。酒茶為主。加引上藥。風熱上攻頭痛者。防風透聖散。或芎

芷散

芷散。大寒犯腦。令人頭痛齒亦痛。羌活黑附湯。風熱感者。酒茶天麻川芎防風薄荷。或茶調散。清室膏。治偏正頭疼。及風溼熱上壅作痛。〇細梃子黃芩三兩一半酒 防風一兩 羌活一兩 甘草五錢

末之

末之。每服三錢。湯調膏下。徹清膏。治風熱上攻頭痛。〇蔓荊子錢一 細辛錢一 薄荷分三 川芎分三 甘草半生半 藥本錢一 〇末之。茶調下錢二。

防風通聖散

防風通聖散。方見中風條下。芎芷散。治風邪入於頭腦作疼痛。〇白芷錢一 石菖蒲錢一 陳皮分八 蒼朮乾炒八分 細辛分八 厚朴姜炒七分 半夏泡

紫蘇

紫蘇。治風邪入於頭腦作疼痛。〇白芷錢一 石菖蒲錢一 陳皮分八 蒼朮乾炒八分 細辛分八 厚朴姜炒七分 半夏泡

羌活黑附湯

羌活黑附湯。治冬月大寒犯腦。令人頭痛齒亦痛。〇麻黃三分 羌活錢一 黃蘗炒三 黑附子炮三 羌活去

茶調散

茶調散。治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞及偏頭疼。〇薄荷葉二 川芎窮兩 羌活五錢 甘草錢五 荊芥穗一

白芷

白芷。治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞及偏頭疼。〇薄荷葉二 川芎窮兩 羌活五錢 甘草錢五 荊芥穗一

細辛

細辛。治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞及偏頭疼。〇薄荷葉二 川芎窮兩 羌活五錢 甘草錢五 荊芥穗一

防風

防風。治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞及偏頭疼。〇薄荷葉二 川芎窮兩 羌活五錢 甘草錢五 荊芥穗一

右為細末

右為細末。每服二錢。食後茶湯調下。

疾痛

疾痛。治諸風上攻頭痛。目昏鼻塞及偏頭疼。〇薄荷葉二 川芎窮兩 羌活五錢 甘草錢五 荊芥穗一

痰飲頭痛。二陳湯加蒼朮、荊子、南星、防風。肥人頭痛是濕痰。半夏、蒼朮為主。加引經導藥。痰厥頭痛。痰唾稠粘。頭旋眼黑。頭苦痛如裂者。半夏、白朮、天麻湯。風痰上攻頭痛。白芷、芽茶、川芎、防風、南星、半夏、細辛。或青州白丸子。風痰上感。三生散。

二陳湯 方見痰症條

半夏、白朮、天麻湯 治眼黑頭旋。頭苦疼痛。吐逆。○白朮炒一錢 神曲炒一錢 陳皮一錢 半夏湯泡五分 麥芽一錢 白茯苓五分

天麻五分 黃芪五分 人參五分 蒼朮五分 澤瀉五分 乾姜三錢 黃蘗三錢 ○右剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心熱服。

青州白丸子 治風痰壅盛。癰瘰驚風。嘔痰涎沫。○白附子二兩 半夏二兩 南星二兩 川烏兩半 兩俱生用。○右搗為末。以生絹

袋盛之。于井花水中攪出。約不更以手捏。令出。以粗渣再搗。仍入絹袋。攪盡為度。貯磁器中。日晒夜露。每日一換新水。攪而復澄。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水晒乾。再研。以糯米粉糊丸。如菜豆大。常服二十九。生薑泡湯送下。

三生散 治風上攻頭腦。痰滯不行。以致偏正苦疼。○烏頭錢一 白附子錢一 南星錢二 姜三片。水煎服。

必眉眶痛

肝虛羞明。眉眶痛者。熟地黃丸。風熱感。眉眶痛。運奇羌防散。或芩芷散。風痰攻上。眉棱痛者。導痰湯。寒濕上攻。眉棱

痛者。芩辛散。風痰風熱感。二烏散。

熟地黃丸 治肝血虛少。眉眶疼痛。羞明畏日之症。○生地黃兩一 熟地黃兩一 玄參兩一 金釵石斛兩一 ○右末之。蜜丸。梧桐

子大。每服三錢。空心白湯送下。

運奇羌防散 治風熱上壅。眉棱疼痛。不可忍之症。○羌活二錢 防風二錢 甘草二錢 黃芩二錢 酒炒煎服

芩芷散 治風熱上感。眉眶疼痛。目不能視物者。○黃芩酒炒一兩 白芷兩一 ○末之。每服二錢。茶清調下。

導痰湯 方見痰症條

芩辛散 治頭痛因寒濕上攻。或眉棱作痛。並治之。○烏頭生用一兩 附子生用一兩 天南星兩一 乾姜兩一 甘草五錢 川芎一兩

細辛五錢 每服四錢。姜棗煎。

二烏散 治風熱。二氣攻於太陽等經。頭腦作痛。○川烏重便浸炒五錢 草烏重便浸炒五錢 細辛五錢 羌活五錢 黃芩酒炒五錢 甘草五錢

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook

錢三 ○右末之。每服二錢。食後茶清調下。

○頭風症二

歌頭風素有熱寒痰。忽冒風寒。腦髓間。何故。女人多病此。為無巾幘禦風寒。

論天頭風。即首風也。孫思邈云。新沐浴竟。取風為首風。經云。首風之狀。頭面多汗。惡寒。當先風一日。則病甚。頭痛不可出內。至其風日。則病稍愈。又云。頭風者。本于風寒入于腦髓也。蓋頭為諸陽之會。其人素有痰火。風寒客之。則熱鬱而悶痛。故婦人多患此者。無巾幘以禦風寒故也。但有偏有正耳。丹溪云。頭風屬痰者多。有熱有風有血虛。在左屬風與血虛。在右屬痰與熱。善治者。究此病情。全在活法。出入加減。無不奏效也。

必風與血虛

頭風在左。屬風與血虛。風者。荊芥薄荷之類。風熱者。消風散。茶調散。血虛者。芎歸湯。或四物湯。加荊芥防風白芷酒。荊薄荷蔓荊子之類。以上諸方俱見頭痛症下

必痰

頭風在右者。屬痰。蒼朮半夏之類。濕痰頭風。用酒荊三錢。蒼朮四錢。川芎細辛各二錢。甘草一錢。末之。姜茶搗勻調服。或二陳湯。方見痰症加酒荊薄荷川芎細辛。或導痰湯。方見痰症加酒荊蒼朮。

必火

頭風屬火者。酒荊為主。或二陳湯加酒荊薄荷川芎細辛。方見痰症或防風通聖散。方見頭痛症或消風百解散。凡用荊連。須用酒炒。以其上行頭角故也。

消風百解散

治半邊頭風作痛。因火熱上沖之症。○荊芥一錢。白芷一錢。陳皮八分。麻黃一錢。蒼朮一錢。末之。姜茶搗勻調服。或二陳湯加酒荊薄荷川芎細辛。或導痰湯加酒荊蒼朮。

甘草

分八。○右剉一劑。水二盞。煎八分。食遠服。

附方

治偏頭疼至妙之藥。○羌活一錢。獨活一錢。川芎一錢。白芷一錢。細辛一錢。薑本一錢。防風一錢。黃芩一錢。酒炒。○右剉一劑。水二盞。煎八分。食後熱服。

又方

治半邊頭痛極效。○香白芷一錢。天南星一錢。川烏八分。半夏八分。○右為末。每服一錢。水調服。婦人加甘草錢。

○頭眩症三

歌痰火令人頭轉旋。氣虛血失每頭眩。風寒暑濕乘虛致。識得其机可望痊。

論眩者。目花黑暗旋倒也。其狀頭眩目閉。身轉耳聾。如立舟車之上。起則欲倒。虛極乘寒得之。故風則有汗。寒則掣痛。暑則煩悶。溼則重滯。此四氣乘虛而眩暈也。或七情鬱而生痰動火。隨氣上厥。此七情致虛而眩暈也。酒色過度。腎虛不能納氣歸元。使氣逆奔而上。氣虛而眩暈也。吐血崩漏。或產後失血。脾虛不能收攝營氣。使諸血失道妄行。此血虛眩暈也。丹溪云。頭眩多挾痰氣虛併火。及溼痰火痰。蓋無度不能作眩。痰因火動也。凡此之症。要參以脈症治之。隨機應變。不可以一途而取軌也。謹按經曰。諸風掉眩皆屬肝木。肝木為風所撼。必鼓動其肺。肺金不能制木。風捲痰而上升。故目無定視。上下反覆。甚則嘔吐。飲食罕御。大法平其風降其痰而已。婦人患崩淋頭眩。以血虛治。為少血不能養肝。肝木根虛。不能不動搖故眩。治崩淋則眩自止。所以培其根也。

脈風寒暑溼。氣鬱生涎。下虛上寔。皆頭眩暈。風浮寒擊。溼細暑虛。痰則滑弦。痰花而澀。數大火邪。虛大極。先理氣痰。次隨脈。

○外感眩暈

風熱虛眩。川芎茶調散。方見頭痛症風寒上厥眩暈。芎朮除眩散。暑火眩暈。二陳湯。方見痰症加人參白朮山梔黃連川芎。傷

溼腎着湯。方見腰痛症

芎朮除眩散。治風寒上厥眩暈。○附子。生半兩白朮。半兩川芎。半兩桂枝。二錢甘草。錢半○每服三錢。姜三片。水二盞。煎一服。

○虛眩

氣虛眩暈。因相火感。治痰為先。半夏白朮天麻湯。方見頭痛症或用香橘飲。氣虛眩暈。四君子湯。方見脾胃加天麻防風。血虛

眩暈。芎歸湯。方見頭痛症失血眩暈。四物湯。方見血症加焦姜。產後血虛眩暈。清魂散。方見婦科

香橘飲。治氣虛眩暈。如治血虛者。加芎歸肉桂。○木香。一錢白朮。一錢半夏。一錢橘皮。一錢茯苓。一錢砂仁。一錢丁香。一錢

甘草。八分○右剉一貼。生姜三片。水二盞。煎一盞。食遠熱服。

○痰火眩暈

溼痰眩暈。二陳湯加酒芩白朮南星天麻蒼朮。方見痰症或青州白丸子。方見頭痛症或白朮半夏天麻湯。方見頭痛症火動其痰者。二

陳湯加黃芩黃連蒼朮羌活

方見  
痼症

火盛者。酒炒大黃末。茶調下。

一方用大黃酒浸。九蒸九晒為末。水丸如菰豆大。每服百丸。食後臨卧清茶送下。神效。○一方用半夏白茯苓川芎甘草羌活白芷枳實南星防風細辛酒黃芩。氣虛加參朮。血虛加芎歸。熱加黃連。各等分。姜三片。水煎服。以此作丸。每日下二三錢。極效。

### ○心痛症四

歌心痛當分久與新。暴嬰寒氣必須溫。若還稍久多成鬱。積鬱因而作熱蒸。大寒痛時難以按。按之痛定作虛論。蛇虫痛止偏能食。脈澀須知死血肉。真痛在心無藥療。厥疼胃脘正當心。

論天心痛者。有真有厥。真者邪中心。君手足青至節即死。非約可療。厥者邪客于心胞絡胃脘之間。當心之分。非真心受病。故可治也。又有寒厥熱厥之分。大寒大虛之別。古人又有九種之名。曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰曰去來痛。若此者皆可究其因而施治也。其如陳無擇云。有五臟及諸經諸府心痛。雖言之詳。而無治例。反使後學有惑于心。故不具載。蓋亦不過寒熱表裏虛實之候也。丹溪云。心脾痛須分新久。若明知身受寒氣。口食寒物。于初病之時。當以溫散溫利之劑。若使稍久而成鬱。鬱則蒸熱。熱久必生火。若欲行溫劑。寧無助火添病乎。故古方多以山梔為熱藥嚮導。則邪易伏。病易退。又審平昔喜食熱物。以致死血留於胃脘。或因痰氣食積。鬱滯于胃作痛者。如此等例。皆前人之所未發。後學當遵而行之。斯活法也。

謹按世人患真心痛者極少。真心痛者。平素有痰。卒然大痛如割。入于無聲。汗出不休。舌強無言。手足厥冷。此疾一作死。在旦夕。針灸之所不施。藥力之所未及。患之者十無一生。蓋寒邪直中心經。君火不能抗敵故也。今之患心痛者。乃胃脘與心胞絡耳。若痛極如絞。時吐清水。面青白。少光彩者。為虫頭上攻。痛時如有物阻碍。疊疊不得下。為胃脘停食。痛時嘈雜不寧。如飢如飽。怏怏欲吐。吐即稍寬。為痰飲停積。痛時隱隱悶結。胸膈相引。得暖覺寬。為憂鬱所致。痛時欲近煖處。飲熱酒即解。為寒客心胞絡。痛時自上而下。自聞唧唧有聲。搔之則消。為火所熾。不可認為虫而投以虫劑也。

脈心痛微急。痛甚伏入。陽微陰弦。或短又數。緊寔便難。滑寔痰積。心痛刺背。脈微而大。寸沈而遲。關緊脈無措。眠坐不

穩。心下如刮。上連胸臆。乃積血不數鏡。

必虛痛

虛弱人心痛。錢氏云。心虛痛者。炒鹽補之。以物按之其痛止者。挾虛也。二陳湯加炮姜末和之。方見若久病元氣虛弱。肢體怯薄。脈虛。手欲按者。六君子湯加砂仁香附。方見

必寔痛

因氣怒而飲食。卒痛便閉。心胸高起。手不可按者。大寔痛也。煮黃丸。後服藜蘆湯去其餘邪。胃脘溼熱痛。小胃丹。方見

症

煮黃丸

治大寔心痛。○雄黃一兩巴豆五錢細研入白麴二兩。研勻。水丸。梧子大。每用水下數丸。如得利不可再服。宜

服藜蘆湯以去餘邪。

藜蘆湯

治心痛後脹。○藜蘆半蒼朮一兩沒炒作一帖煎服。

必熱厥心痛

熱厥心痛者。其人必縱酒蓄熱在胃。偶遇寒鬱而發。故身熱足冷。痛甚則煩躁而吐。額上有汗。脈洪大。當灸大谿穴。崑崙。表裏俱瀉之內服金鈴子散。痛止。服枳朮丸。方見以去餘邪。初痛以鹽湯探吐。得吐就發散。心脾痛日久。則非寒也。縱有寒亦鬱而為熱。二陳湯加山梔炒黑川芎香附。痛甚者加炮姜反佐之。方見或以山梔一味入姜汁煎服。

大便不通。大承氣大陷胸之類下之。傷食

金鈴子散。○金鈴子一兩玄胡索一兩末二錢。溫酒下。

必寒厥心痛

寒厥心痛者。手足厥逆。偏身冷汗。甚則手足甲青黑。下便清白不渴。氣微力薄。脈沈細微。未附湯。大寒厥暴痛。非久痛者。若久則非寒也。丹溪云。明和身受寒氣。口食寒物。初病當以溫散溫利之藥。

未附湯

治寒厥。○白朮二錢甘草一錢黑附子一錢半草豆蔻丸。大便閉結不通者。元戎厚朴丸。○右三味。剉作一帖。姜

三片。棗二枚。水二鍾煎溫服。

草豆蔻丸 治寒厥心痛。○草豆蔻一錢益智仁八分陳皮八分人參去苗黃芪八分吳茱萸洗去鹽八分當歸酒洗

青皮炒六分神麴炒四分姜黃四分柴胡四分半夏一錢澤瀉去毛桃仁七分麥芽錢甘草炙三分○右為細末湯浸蒸

餅丸如梧桐子大每服三十丸

元戎厚朴丸○厚朴三兩黃連二兩吳茱萸湯泡七乾姜炮二巴豆另研人參去苗川烏炮一○末之入豆霜勻蜜和

丸桐子大每三丸以利益為度

必痰積食積心痛

痰飲積滯于胃脫當心而痛。牆上陳螺蛳殼煨存性炒蒼朮海石山梔香附南星各二兩枳殼青皮木香半夏砂仁

各半兩糊丸姜湯送下食積保和丸方見

必血痛

平昔喜食熱物致死血留於胃口作痛者脈沈而芤澀在上者四物湯加桃仁紅花丹皮枳殼玄胡索方見韭

汁桔梗開之重者桃仁承氣湯下之方見

必蟲痛症痛

蛇虫攻入心膈作痛者痛定便能食面上有白斑唇紅治以苦練錫灰或烏梅丸或集效丸蛇虫攻噉心痛惡心而

吐川椒湯下烏梅丸症心痛者十症病皆心痛化虫丸辣蓼草煎湯飲之

烏梅丸治蛇虫烏梅七十五錢細辛一兩附子炮一兩人參五錢黃柏五錢桂枝五錢乾姜五錢黃連四兩川椒五錢當歸五錢

末之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸爛搗成膏少加蜜和丸如梧桐子大每十九加至二十九食前服

集效丸 治蛇厥心痛○木香五分鶴虱錢半乾姜炮五分訶子二錢蕪荑炒二錢附子炮二錢檳榔五分大黃一兩半

烏梅肉二兩○末之蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心時陳皮湯送下

化蟲丸服之虫○胡粉炒五錢鶴虱三錢白礬錢五枳榔錢五苦練根錢五○右為細末糊丸梧桐子大每服五十丸溫漿水入

芝蔴油一二點打勻下之米飲亦可不拘時候其虫小者化為水大者自下

○腹痛症五

寒痛綿綿無減增時疼時止熱為根血瘀痛處無移動食積便通便見輕寒者不能將手近痛時能按作虛論濕痰痛者沒便秘體認其形見病情

蓋夫寒痛者常痛而無增減也成無己云陰寒為邪則腹痛而吐利熱痛者時作時止原病式云熱鬱于內而腹滿堅結痛勿以為寒死血痛者每痛不移其處成無己云邪氣聚于下焦津液不得通氣血不得行或溺或血惡滯于下是生脹鞭小便不利也食積痛者利後即痛減淫痰痛者凡痛大小便俱不利丹溪云清痰多作腹痛脈滑痰因氣滯而聚凝其道路不得通故也腸癰痛者身甲錯小便便如淋腹皮急按之濡如腫狀脈洪數也積聚腹中痛者腹中原有積左右上下當積而痛也寒疝入腹痛者少腹痛引睪丸陰毒痛者四肢厥逆痛甚咽嗝不利或心下脹滿結燥虛汗狂言面色俱青陰積于下陽消於上實痛者腹堅不可按虛痛者雖痛不脹滿手可按若此霄壤不侔可一藥而盡之乎○謹按腹痛為脾家受病蓋脾或受有形而痛者或受無形而痛者若暴傷飲食則胃脘先痛而後入腹暴觸怒氣則兩脇先痛而後入腹血積上焦脾火薰蒸則痛從腹而上于胸臆血積下部胃氣下行則痛從腹而入于少腹傷于寒者寒必痛得熱則緩傷于飢者飢即痛得食即止吞酸腹痛為痰鬱中焦復傷飲食而黃腹痛為宿食不消蛻虫攻咬氣虛腹痛腹必虛豁呼吸短淺血虛腹痛者痛如芒刺牽引不寧醫者當審其因以處治大要以甘溫為上惟傷酒作痛者方可涼劑而必佐之以甘溫也

熱痛

脈沈弦細動皆是痛症心痛在寸腹痛在關下部在尺脈象顯然

胸中有熱胃中有邪腹痛欲嘔黃連湯腹痛脈洪熱也黃芩芍藥湯寒邪變熱傳裏腹痛便秘而厥四逆散腹滿時

痛桂枝加大黃湯腹痛便秘脈實大者大承氣湯傷食

黃連湯治熱邪腹痛○黃連三錢甘草三錢乾姜三錢桂枝三錢人參二錢半夏半兩○每服七錢棗煎服

黃芩芍藥湯○黃芩錢二芍藥錢半甘草錢一煎服

四逆散治陽邪傳裏腹痛○甘草錢一枳殼錢一芍藥錢一柴胡一兩○末之每服二錢白湯調下桂枝加大黃湯治太陰脹滿時痛○桂枝錢一芍藥錢一甘草錢二大黃錢二姜棗煎入錫一合微煖服

寒痛

傷寒下利腹痛。四逆湯。

方見中寒

腹痛厥冷欲死者。霹靂散。腹痛下利。四肢沈重。真武湯。或理中湯。

方見中寒

霹靂散

治中寒腹痛。

○附子

炮一枚

入真臘茶一大盞。同研勻。更分二劑。水二鍾。煎八分。入熟白蜜一匙。涼服。

真武湯

治少陰腹痛。

○茯苓

五錢

芍藥

五錢

生薑

七片

附子

炮二錢

○水

二大盞

煎至一盞

冷服。

疾痛食積痛

清痰多作腹痛。台芎蒼朮木香白芷香附末之。姜湯調服。肥人腹痛。乃氣虛溼痰也。二朮半夏陳皮芎藭之類。飲食

過傷腹痛。保和丸。木香檳榔丸。

見傷食

虛人飲食傷腹。時痛。六君子湯加麴蘖。

方見脾胃

虛痛

素弱人全不思食。腹冷痛。養胃湯加肉桂茱萸木香。或小建中湯。

方俱見脾胃

或理中湯。

方見中寒

腹痛欲以手按。按之痛止

者。屬虛。參朮姜桂之類。血虛腹痛。須用白芍之酸補以和之。或四物湯加焦炒乾姜炒芍藥倍用。

方見血症

寔痛

凡痛脹滿者不可按。大寔也。大承氣湯。

方見傷食

初得腹痛。元氣未虛。宜推蕩之。此通因通用。痛隨利減也。桂枝加大黃

湯

方見前熱

或木香檳榔丸。

方見傷食

血痛

因跌撲瘀血腹痛。脈芤。桃仁承氣湯加蘇木紅花。

方見血症

女人經閉。血積滯。腹中痛。玉燭散。

即大承氣湯

合四物湯

二方一見傷食一見血症

或失笑散。

方見女科

或通經散。

通經散

活血定痛。

○陳皮

而甘遂

煨一兩

當歸尾

五錢

川芎

一兩

紅花

一兩

酒洗

桃仁

一百片

○右剉

每服七錢

水二鍾

酒一

鍾

煎至八分

空心服。

積聚痛

腹中上下左右有積聚。當積而痛。三聖膏。或木香檳榔丸。保和丸。

二方俱見傷食

丁香脾積丸。

食積痞塊作痛。阿魏丸。

三聖膏。

末化石灰半斤。

為細末。

瓦器中炒。

令淡紅色。

提出火。

候熱稍減。次下大黃末一兩。

微炒。又提出候溫。下桂心

三聖膏。末化石灰半斤。為細末。瓦器中炒。令淡紅色。提出火。候熱稍減。次下大黃末一兩。微炒。又提出候溫。下桂心

末半兩。略炒。入陳米醋熬攪。成黑膏。厚紙攤貼患處。其痛自減。塊漸消矣。

丁香脾積丸。○丁香半兩木香半兩巴豆去心膜良姜醋煎蓬莪朮三兩京三棱三兩皂莢三條去皮青皮一兩○末之。入百草霜三

錢。糊丸。麻子大。每服十丸。空心時白沸湯下。

阿魏丸。治肉積腹痛。○連翹半兩山查去核阿魏一兩黃連六錢末之。用阿魏醋煮作糊丸。如梧桐子大。每服五六十丸。

清晨白滾湯送下。

### 腸癰痛

腸癰痛者。腹大痛。身甲錯。小便加淋。脈花。或攢臍有瘡。積冷。以附子溫之。積熱。以大黄下之。膿大出。以參芪補之。

### 陰毒痛

陰毒厥逆腹痛。陰寒欲絕。脈沈。爪中手指唇面青黑者。回陽丹。或真武湯。方見前急灸關元氣海。各五七十壯。

回陽丹。治陰毒厥冷腹痛。○牡蠣錢良姜錢一不灰木錢川烏錢白芍藥錢射香錢末之。每用一錢。男用女

津調塗外腎。女用男津調塗兩乳。

### 痧症痛

忽然腹中大痛。嘔吐脈沈。痧症也。正氣散加香附砂仁。方見前手足厥冷。舉體轉筋。理中湯。方見前少腹引牽九痛。疝氣

入腹中痛。脈沈弦。補腎湯。餘詳疝症本條。

補腎湯。治疝氣入腹痛。○人參錢白茯苓錢黃芪錢附子錢白朮錢沈香錢木瓜錢羌活錢川芎

紫蘇錢甘草錢○右剉一劑。姜三片。棗二枚。水二盞。煎八分。空心服。

### 脇痛症六

歌脇肋疼時統屬肝。或虛或寔或因痰。脈沈氣鬱須開導。孔澀原來死血干。食積一條常梗起。肝虛痛在脇梢間。若然

痛甚肝經火乾脇之疼療最難。

論足厥陰之絡。令人脇痛。皆肝胆經之所主也。丹溪云。木氣寔。肝火盛。死血痰飲。氣滯食積。溼熱。皆入人脇痛。亦有肝

虛血少而痛者。有因酒色勞損太過。脇下一點痛不止。名乾脇痛。甚危。當大補氣血尚難為也。若此虛寔之不同也。

必以脈症參之。斯得其受感之情。而用藥無差忒也。

○謹按左脇痛者。肝經受邪也。右脇痛者。肝邪入肺也。左右脇俱痛者。肝火盛而木氣寔也。兩脇走注痛而有聲者。痰飲也。左脇下有塊作痛不移者。死血也。右脇下有塊作痛飽悶者。食積也。咳嗽氣急發熱者。痰結痛也。久而不治。則成肺癰。勞傷身熱。脇痛者。脈必虛也。宜詳究之。

〔脈〕兩脇疼痛。脈必双弦。緊細弦者。多怒氣偏。沈澀而急。痰瘀之愆。

△肝火盛

脇痛甚者。肝火太旺也。當歸龍薈丸。輕者小柴胡湯加黃連龍胆草白芍藥醋炒青皮。方見火盛者。宜伐火。左金丸。

當歸龍薈丸。○膽草去一兩當歸酒洗一兩山梔子仁炒黑一兩黃連炒一兩黃芩炒一兩黃蘗炒一兩大黃兩半蘆薈兩半木香半錢射香半錢

為丸。淡姜湯下。

左金丸。治肝火太盛。○黃連六兩吳茱萸湯一兩末之為丸。白湯下。

△木氣寔

脇痛脈弦數。木氣寔也。醋炒青皮蒼朮川芎當歸白芍藥胡。或用小柴胡湯加醋炒青皮川芎胆草。方見或抑青丸。

抑青丸。治肝火○黃連不拘多少。姜汁炒為丸。每百丸。白湯下。

△死血痛

脇痛日輕夜重。或午後發熱。脈沉而澀。瘀血也。四物湯加柴胡青皮桃仁紅花。行氣藥中加破血藥。

△食積痛

脇下一條扛起作痛者。食積也。保和丸。方見或吳茱萸炒黃連神曲麥芽山查蓬朮青皮。或當歸龍薈丸。方見前肝

△濕熱

濕熱盛而兩脇痛者。先以琥珀膏貼痛處。後以生姜湯吞當歸龍薈丸。方見或小柴胡湯加蒼朮青皮黃連。方見痰疾

△痰積

痰積脇下作痛。控涎丹。或十棗湯。或二陳湯加南星蒼朮川芎柴胡白芥子炒山梔仁醋炒青皮。方見痰疾

控涎丹 治兩脇痰痛。乾蓬錢大戟錢製白芥子錢炒各錢○右末。丸如梧子大。每五七丸。漸加至十丸。姜湯下。十棗湯 治痰積脇痛。○甘遂錢大戟錢製一先花蜜棗子十枚。水二盞。煎八分服。

氣滯

氣滯 治兩脇下作痛。推氣散。或復元通氣散。控涎丹。方見前痰積治一身氣痛。氣鬱者。詳鬱症條內。推氣散 治右脇疼痛。○枳殼錢桂心錢片子姜黃錢甘草錢末之。每服二錢。姜棗湯調下。復元通氣散。○木香錢丁香錢青皮錢穿山甲錢陳皮錢白芷錢甘草錢末之。每服五錢。水二鍾。煎八分。空心服。或作末。每服二錢。空心酒調下。

虛痛

肝血不足。悠悠痛不止者。四物湯加柴胡稍。方見血症若脇下一點痛不止。此因酒色太過所致。名乾脇痛。難治。肥白人脇痛。參朮入小柴胡湯。方見痰積枳朮散 治左脇痛。○枳實錢川芎錢粉草錢○右為細末。每服二錢。姜棗湯。或酒調下。木香調氣散 治氣怒傷于肝。兩脇大痛難忍。○丁香錢檀香錢白豆蔻仁錢藿香葉錢甘草錢砂仁錢○右末之。每服二錢。入鹽少許。沸湯調服。

腰痛症七

歌 腰痛多由腎氣虛。衝風鬱熱總因之。天陰痛作知歸濕。寒濕疼時見熱陰。閃挫板疼難俯仰。日輕夜重血多瘀。或因腎者并勞役。水積仍兼氣不舒。

論 夫腰者。腎之府。身之大關節也。血氣不行。風寒暑濕之氣相干。則沈痛不能轉側。然老人腎虛多腰痛。亦有寒濕者。挫閃者。氣滯者。瘀血者。腎者。衝風蓄熱者。水積者。勞傷者。之不同也。

脈 腰痛之脈。必沈而弦。沈微氣滯。弦損腎元。或浮而緊。風寒所纏。濕傷濡細。寔挫閃然。濕必瘀血。滑痰火煎。或引背痛。沈滑易痊。

必腎虛腰痛

腰痛悠悠不已。腎虛也。青娥丸。或摩腰膏。獨活寄生湯。丹溪補陰丸。安腎丸。立安丸。選而用之。

青娥丸 治腎虛腰痛。杜仲一片 姜炒半 破故紙半 胡桃肉二十 末之。大蒜四兩。搗為膏。和丸。如梧桐子大。每三十九。

空心溫酒送下。或用酒糊為丸。

摩腰膏 治腰痛虛寒症。附子二錢 炙五分 烏頭二錢 天南星二錢 硃砂一錢 乾姜一錢 雄黃一錢 樟腦一錢 丁香一錢 射香一錢 末之。姜汁調。烘熱摩腰上。

獨活寄生湯 獨活一錢 桑寄生一錢 杜仲一錢 牛膝一錢 細辛一錢 秦艽一錢 白茯苓一錢 桂心一錢 川芎一錢 防風一錢 白芍藥一錢 甘草一錢 人參一錢 當歸一錢 熟地黃一錢 熟地黃一錢 右剉一劑。水二鍾。煎至八分。空心熱服。

丹溪補陰丸 黃蘗四兩 龜版四兩 知母四兩 熟地黃六兩 右末之。蜜為丸。如梧桐子大。空心淡鹽湯下。

安腎丸 治腎虛腰痛。茴香三兩 川練子三兩 破故紙三兩 續斷三兩 胡蘆巴三兩 桃仁二兩 杏仁二兩 乾山藥二兩 白茯苓二兩 末之。蜜丸。桐子大。鹽湯下。

立安丸 補腎。止腰疼。牛膝四兩 杜仲四兩 破故紙四兩 黃柏二兩 大茴香二兩 末之。蜜丸。淡鹽湯送下。

腎着者。腰冷重痛。如帶五千錢者。其飲食如故。是也。宜流其濕熱。腎着湯。不已。服牛膝酒最妙。

三因腎着湯 白茯苓四兩 白朮四兩 乾姜二兩 甘草二兩 每剉四錢。水二盞。空心煎服。

牛膝酒 治腎着腰痛。地骨皮兩五 加皮兩五 薏苡仁兩五 川芎兩五 甘草兩五 生地黃兩五 海桐皮兩五 川牛膝兩五 羌活兩五 右剉一大劑。浸酒。日飲三次。

寒濕腰痛者。遇陰寒即作。或久雨陰濕所得。晴暖即減。五積散加吳茱萸。杜仲。中寒。

濕熱腰痛。板疼不能俯仰。小便赤。大便泄。或走注痛。二妙丸。或健步丸。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

濕熱腰痛。板疼不能俯仰。小便赤。大便泄。或走注痛。二妙丸。或健步丸。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

二妙丸 治濕熱腰痛。川黃柏四兩 蒼朮四兩 末之。酒調下。或為丸。白湯送下。二三錢。

健步丸 治濕熱腰痛。○羌活半兩 柴胡半兩 滑石炒半兩 甘草炙半兩 瓜蒌根兩半 防風去蘆三錢 澤瀉三錢 防己酒洗一兩 川烏三錢

苦參酒洗五錢 肉桂錢 末之酒糊丸如桐子大每七十九煎愈風湯吞下

○閉挫腰痛

閉挫腰痛者板疼復元通氣散方見或五積散加牽牛頭末桃仁方見或濟生菴蘭丸

濟生菴蘭丸○菴蘭子兩半沒藥二錢乳香二錢補骨脂錢五歲時靈仙兩半杜仲兩半當歸酒洗兩錢○末之酒糊丸如梧桐子大

每七十九空心淡鹽湯下

○勞役腰痛

腰痛由勞役而得者獨活寄生湯方見瘀血腰痛四物湯加桃仁紅花蘇木方見

○風熱腰痛

因風腰痛者小續命湯方見或獨活寄生湯方見風濕腰痛牛膝酒方見

○氣滯腰痛

氣滯腰痛木香調氣散方見因鬱怒憂思氣不舒而痛枳殼湯或小七香丸

枳殼湯 順氣餅醫止痛○枳殼炒五兩甘草生用二兩○末之蔥白湯下

小七香丸 氣滿腰痛○丁香二錢香附兩錢甘草兩錢蓬義木錢二砂仁炒二錢甘松八錢益智仁六錢○末之蒸餅糊丸如菜

豆大每二三十九米飲下

○症症八

○寒水瀰血氣孤筋先哲空留七疝名蓋是肝經原有熱外邊却被淫寒侵或因元血并痰飲鬱在囊中氣不行控引

畢丸生腫痛或如瓜飽或蛙聲要將標本分寒熱感受仍評重與輕勿指膀胱心腎氣當知正屬厥陰經

論古有七疝之名不按七疝而治概用局方辛熱燥劑是泥標而忘本也或指為小腸氣腎與膀胱氣皆非也殊不知

厥陰之脈循陰器然其地位皆肝經所主與小腸膀胱腎子無相干至戴人始辨之詳也丹溪云疝痛甚者畢丸連

少腹急痛也或有形或無形或有聲或無聲自素問以下皆以為寒蓋經絡得寒則收引不行所以作痛世有得寒